

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ АРМЕНИИ СЕМ. FABACEAE

И. Г. АРЕВШАТЯН

Приводятся новые местонахождения для 13 представителей из сем. Бобовых, собранные в Армении.

Ключевые слова: флора, находки, Fabaceae.

В процессе определения гербарного материала из сем. Fabaceae обнаружены интересные флористические находки, дополняющие наше предыдущее сообщение [1]. Ниже приводится список этих растений, гербарные образцы которых хранятся в Институте ботаники АН Арм. ССР (ERE) под соответствующими номерами.

Securigera securidaca (L.) Degen. et Dérfl. Новый монотипный род флоры Армении, ареал которого охватывает Средиземноморье, Крым, Кавказ (Восточный Кавказ, Карабах, Восточное Закавказье, Шекинское нагорье, Талыш и Зуванд), Иран, Сирию. Собран на территории Кафанского р-на, примыкающей к Азербайджанской ССР, где данный вид имеет относительно широкое распространение: Кафанский р-он, в 2-х км ниже с. Неркин Анд, левый борт р. Цав, южный склон, шибляк; 6.VII.79, Н. Ханджян (№ 112039); там же, между сс. Неркин Анд и Раздере, южный шибляковый склон, по левому борту р. Шикахох, у места слияния с р. Цав, 7.VII.79, Э. Габриэлян (№ 111966, 111967, 111968); там же, 7.VII.79, И. Аревшатян (№ 111952, 111953, 111954).

Trifolium retusum L. (= *T. parviflorum*). Новый вид для флоры Армении. Его ареал охватывает Южную и Центральную Европу, Крым и Кавказ. На Кавказе встречается в ряде флористических районов, спорадически. В Армении собран дважды: Мегринский р-н, окр. с. Айгедзор, 9.VII.78, Э. Габриэлян (№ 111571); Кафанский р-он, с. Цав, перед школой, 1100 м над ур. м., 3.VII.79, И. Аревшатян (№ 112152, 112153).

Trifolium scabrum L. Новость для флоры Зангезура. Широко известный вид из Западной Европы, Средиземноморья, а также из северных районов Ирана и Ирака. На Кавказе, как и предыдущий вид, встречается спорадически. Этот редкий вид в Армении до настоящего времени был известен из Мегри. Нами наблюдался в шибляке в большом количестве: Горисский р-он, шибляковые склоны Тасского (Шур-

нухского) перевала, 3.VII.79, Э. Габриэлян (№ 112155); там же, 3.VII.79, И. Аревшатын (112156); Кафанский р-он, в 2-х км ниже с. Неркин Анд, левый борт р. Цав, южный склон, шибляк, 6.VII.79, Н. Ханджян (№ 112154).

Melilotus neapolitanus Ten. Новинка для флоры Зангезура. Ареал этого вида—Южная Европа, Крым, Кавказ, Иран. В Армении до последнего времени был известен только из Мегринского района по единственному экземпляру, собранному А. А. Гроссгеймом (1923). Новые местонахождения: Горисский р-он, правый борт р. Воротан, шибляковые склоны Тасского (Шурнухского) перевала, 3.VII.79, И. Аревшатын (№ 112110); Горисский р-он, окр. Татевгэса, сухие шибляковые склоны, 9.VII.79, И. Аревшатын (№ 112109, 112111). Во «Флоре Армении» [6], на основании неправильно определенного гербарного образца (№ 15045 [ERE] *Melilotus officinalis* (L.) Desr.) ошибочно указывается для Апаранского флористического района.

Coronilla cretica L. Новость для флоры Зангезура. Средиземноморский элемент, редкий вид флоры Кавказа, встречающийся на Восточном Кавказе, в Центральном и Южном Закавказье, Карабахе и Талыше. В Армении ранее был известен лишь из Мегри. Новые сборы: Кафанский р-он, между сс. Неркин Анд и Раздере, левый борт р. Шикахох, у места впадения в р. Цав, южный склон, шибляк, 7.VII.79, И. Аревшатын (№ 112112, 112114); там же, 7.VII.79, Э. Габриэлян (№ 112113).

Hippocrepis unisiliquosa L. (= *H. biflora* Spreng.). Ареал этого вида охватывает Средиземноморье и Западную часть Ирано-Туранской флористической области. На Кавказе распространен во многих районах Азербайджанской ССР. Ранее в Армении собирался в Мегри. В Зангезуре собран впервые: Кафанский р-он, между обогатительной фабрикой и пос. Шаумян, юго-восточный склон, 7.V.67, В. Манакян (№108735), там же, в 2-х км ниже с. Неркин Анд, левый борт р. Цав, южный склон, шибляк, 6.VII.79, Н. Ханджян (№ 112102), там же, между сс. Неркин Анд и Раздере, левый борт р. Шикахох, у места впадения в р. Цав, южный склон, шибляк, 7.VII.79, Э. Габриэлян (№ 112103). Горисский р-он, окр. Татевгэса, сухие шибляковые склоны, 9.VII.79, И. Аревшатын (№112127).

Lathyrus choloranthus Boiss. Ирано-Туранский элемент. На Кавказе имеет довольно ограниченное распространение—лишь в Южном Закавказье, откуда была известна из Апаранского, Ереванского, Дарелегисского флористических районов Армении и Нах.АССР. Новый пункт произрастания: Зангезур, Сисианский р-он, между г. Сисиан и с. Ашотаван, горная степь, 10.VII.79, И. Аревшатын (№ 112087, 112088).

Lathyrus inconspicuus L. Новость для флоры Дарелегиса. Этот вид распространен в Средиземноморье и Западной части Ирано-Туранской области. На Кавказе он довольно редок, встречается в Восточном и Южном Закавказье и Талыше. В пределах Армении был известен из Иджевана, Ереванской котловины и Зангезура. Новое местонахождение

ние: Ехегнадзорский р-он, между сс. Шатын и Гетап, восточный сухой каменистый склон, 18.VI.57, В. Аветисян (№ 111633).

Vicia hyrcanica Fisch. et C. A. Mey. Ирано-Туранский элемент, редкий вид флоры Армении. На Кавказе встречается в Южном Закавказье и Талыше. В пределах республики этот вид собирался лишь в окрестностях Еревана. Ныне обнаружен в сборах из Дарелегисского, Зангезурского и Мегринского флористических районов: Мегринский р-он, левый борт ущ. Гёрун-дара, северо-западный склон, 1000—1300 м над ур. м., 28.IV.58, Э. Габриэлян, Ш. Асланян (№ 67437); Сисианский р-он, выгон выше перегонов, 9.VI.67, Э. Шур (№ 111703); Ехегнадзорский р-он, в 3-х км от с. Чива к с. Арени, слева от дороги, 6.VI.77, А. Тахтаджян, Э. Габриэлян (№ 111704); Сисианский р-он, между г. Сисиан и с. Ашотаван, горная степь, 3.VII.77, И. Аревшатян (№ 112141); Азизбековский р-он, ущ. р. Терп, правый скалисто-осыпный борт между Воротанским перевалом и местом впадения р. Терп в Арпу, 10.VII.79, Н. Ханджян (№ 112140).

Vicia anatolica Turrill (= *V. hajastana* Grossh.). Новинка для флоры Дарелегиса и Мегри. Ирано-Туранский элемент. Редкий вид флоры Кавказа, известный до сих пор из Ереванской котловины и Нахичеванской АССР. Новые местонахождения: Азизбековский р-он, ущ. р. Арпа, близ моста, 22.VI.57, Э. Габриэлян (№ 67450); Мегринский р-он, северные склоны массива г. Гохтансар (Союх), верховья р. Вагравар, поляна в дубовом из *Quercus macranthera* лесу, 4.VII.67, Я. Мулкиджанян, В. Манамян (№ 111623, 111624).

Vicia alpestris Stev. Ирано-Туранский элемент. До последнего времени [4] данный вид приводился только для Большого Кавказа и Зангезурского хребта. Однако оказалось, что это далеко не редкое растение для высокогорий ряда флористических районов Армении (В. Ахурянский, Апаранский, Зангезурский): Сисианский р-он, Дарабасское ущ., между с. Лернашен и г. Арамазд, 22.VII.57, Я. Мулкиджанян, Ш. Асланян (№ 111631, 111632); Гукасянский р-он, с. Дзорашен, выше по течению реки, заросли осинника, южные склоны, 3.VI.62, Я. Мулкиджанян, В. Манамян (№ 111625, 111629); Разданский р-он, г. Алибек, вершина, 2600 м над ур. м., 2.VII.64, Ю. Мхитарян (№ 111628). Зангезур, Хуступ, близ вершины, 16.VII.69, Т. Попова, Н. Ханджян (№ 111627); Ахурянский р-он, окр. с. Джаджур, урочище Гзаз, не доезжая до Джаджурского перевала, на щебнистых склонах, 1900 м над ур. м., 4.VII.74, Э. Габриэлян (№ 111626, 111630).

Vicia hybrida L. Новинка для флоры Зангезура. Этот вид, встречающийся в разных флористических районах Кавказа, в основном сосредоточен в Восточном Закавказье. В Армении был известен из Иджевана и Мегри. Новые местонахождения расширяют ареал этого вида в Южном Закавказье: Кафанский р-он, Шикахохский заповедник, с. Неркин Анд, 7.V.60, М. Григорян (№ 111702); там же, юго-восточный склон, 730 м над ур. м., 2.VIII.62, М. Григорян (№ 82922); там же, между сс. Неркин Анд и Раздере, левый борт р. Шикахох, у места впадения в

р. Цав, южный скалистый склон, шибляк, 7.VII.79, И. Аревшатян (№ 112135).

Vicia peregrina L. Новинка для Дарелегисского и Зангезурского флористических районов. Ареал—Средиземноморье, Крым, Центральная, Восточная и Южная Азия. Данный вид широко распространен в Закавказье. В пределах Армении был известен из Иджевана, Еревана и Мегри. Новые местонахождения: Кафанский р-он, Шикахохский заповедник, с. Неркин Анд, 730 м над ур. м., 27.VI.60, М. Григорян (№ 111687); там же, левый борт р. Басут чай, юго-восточный скалистый склон, 5.V.61, М. Григорян (№ 111695); Ехегнадзорский р-он, окр. с. Хачик, 3.VII.66, В. Аветисян (№ 86838); Азизбековский р-он, окр. с. Мартирос, 2000 м над ур. м., 18.VII.72, Т. Попова, Н. Гохтун (№ 111694); там же, ущ. р. Терп, правый скалисто-осыльный борт между Воротанским перевалом и местом впадения р. Терп в Арпу, 10.VII.79, Н. Ханджян (№ 112129); Сисианский р-он, между г. Сиснан и с. Ашотаван, горная степь, 11.VII.79, И. Аревшатян (№ 112130).

Институт ботаники АН АрмССР

Поступило 20.III 1980 г.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՄԻ ՔԱՆԻ ՆՈՐ ԵՎ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՑ ՏԵՍԱԿՆԵՐ FABACEAE ԸՆՏԱՆԻՔԻՑ

Ի. Գ. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ

Հոդվածում նշվում են Հայաստանի ֆլորայի համար նոր և քիչ հանդիպող Fabaceae ընտանիքի 13 տեսակների աճման նոր վայրեր:

SOME NEW AND RARE SPECIES OF *FABACEAE* FAMILY IN ARMENIAN FLORA

I. G. AREVSCHATIAN

New locations for 13 representatives of *Fabaceae* family gathered in Armenia are presented in the paper.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аревшатян И. Г. Биолог. ж. Армении, 32, 6, 1979.
2. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа. 5, Л., 1952.
3. Еленевский А. Г. Канд. дисс. М., 1964.
4. Раджи А. Д. Новости сист. высш. раст., 228—240, 1970.
5. Флора Азербайджана. 8, Баку, 1954.
6. Флора Армении. 4, Ереван, 1962.
7. Флора Грузии. 5, Тбилиси, 1949.
8. Флора Еревана. Л., 1972.
9. Flora of Turkey. 3, Edinburgh, 1970.