

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.998.2

О ДВУХ НОВЫХ ДЛЯ ФЛОРЫ АРМЯНСКОЙ ССР
ВИДАХ РОДА *CENTAUREA* L.

Ц. Р. ТОНЯН

Нами собран большой гербарный материал по роду *Centaurea* L., при определении которого обнаружены два новых вида для флоры Армении.



Карта. Распространение *Centaurea bella* Trautv. и *Centaurea cyanus* L. в Армении.

Гербарные образцы новых видов рода *Centaurea* хранятся в гербарии отдела систематики и географии растений Института ботаники АН АрмССР (ERE) под соответствующими номерами.

Centaurea bella Trautv. — Впервые нами собран на территории АрмССР, в Ереванском флористическом районе, в окр. с. Ерасх (с. Араздаян) на сухих каменистых склонах, 7.VII.66 г., Ц. Тонян (№ 112045, 112046). Произрастает среди фриганондной растительности.

Это высокодекоративное многолетнее растение, до 30—40 см высоты, стебли обычно простые, одностолбчатые, с розовыми цветками. Дольки листьев эллиптические. Нижние листья на черешках, перисторассеченные, с яйцевидно-продолговатым верхним сегментом. Во «Флоре СССР» [3] этот вид приводится для Зап.-Закавказья (юго-вост. ч.) и Вост.-Закавказья (зап. ч.), описан из Грузии (р-он гор. Боржом). Нахождение *Centaurea bella* в Армении расширяет границы этого эндемика (карта).

Centaurea cyanus L. Впервые собран в Апаранском флористическом районе, около с. Агавнадзор, на сухих каменистых склонах, 18/VII 67 г., Ц. Тонян (№ 112160, 112161, 112162) и вторично собран там же, 30/VIII 79 г., (№ 112215, 112216, 112217).

Однолетнее или двулетнее растение, стеблевые листья ланцетнолинейные, слабоопушенные, корзинки собраны в метельчатое соцветие, 5—9 мм ширины, венчик срединных цветков сине-фиолетовый или фиолетово-лиловый, краевых — синий или голубой, пяти- восьмираздельный.

Согласно данным «Флоры СССР» [3], в пределах Кавказа этот вид распространен в Предкавказье, Дагестане, Западном и Восточном Закавказье, Талыше. Несмотря на широкое распространение, он до сих пор не был обнаружен в Армении. Новое местонахождение несколько расширяет и уточняет его ареал.

Институт ботаники АН АрмССР

Поступило 20 III 1980 г.

CENTAUREA L. ԾԵՂԻ ԵՐԿՈՒ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՅՆՈՐԱՅԻ ԶՍԴԱՐ

Յ. Ռ. ՏՈՆՅԱՆ

Հոդվածում բերվում են *Centaurea ցեղի երկու նոր տեսակներ*, որոնք նոր են Հայաստանի ֆլորայի համար: Պրանք հավաքվել են երկու տարբեր ֆլորիստական շրջաններից: Այդ տեսակներն են՝ *Centaurea bella* Trautv. երևանի ֆլորիստական շրջան՝ Երասխ: *Centaurea cyanus* L. — Ապարանի ֆլորիստական շրջան՝ Աղավնաձոր:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, 4, 1934.
2. Гроссгейм А. А. Определитель растений Кавказа, М., 1949.
3. Цвелев Н. Н. В кн.: Флора СССР. 28, 1963.