

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕНДРОФЛОРЕ ВАЙКА

А. А. ГРИГОРЯН, Ж. А. ВАРДАНЯН

В статье приводятся некоторые новинки флоры Вайка (АрмССР, Даралагез), обнаруженные нами в процессе изучения дендрофлоры этого региона.

Salix wilhelmsiana Bieb. Новый вид для дендрофлоры Южной Армении и редкий для дендрофлоры Армении—Азизбековский р-он, между сс. Заритап и Хидзорут, по берегу речки Заритап 1600—1700 м над ур. м., 4.VII.1977 г.; 31.VIII.1977 г., вторично—окрестности с. Гетап по берегу р. Ехегис 1100 м над ур. м., 2.IX.1977 г. (ERE: 113239, 113240, 113262). Во флоре Армении приводится Скворцовым [3, 4] только для Северной Армении (Алавердский район, берега р. Дебед) и Аштаракского р-она (берега р. Азат). По Скворцову, ива Вильгельмса не встречается выше 1500 м над ур. м. Однако нами обнаружена, как отмечено выше, на высоте 1600—1700 м. Ива Вильгельмса весьма перспективна в озеленении городов и населенных пунктов Армении.

Populus alba L. Новый вид для дендрофлоры Центральной Армении—Ехегнадзорский р-он, ущелье Аяр, в смешанных лиственных редколесьях, 1300 м над ур. м., 3.IX. 1977 г. (ERE: 113253). В пределах Армении известен из Зангезура, из предгорного пояса, до высоты 800 м [1]. Перспективен в озеленении.

Rhus coriaria L. Новый вид для дендрофлоры Центральной Армении—Ехегнадзорский р-он, бассейн р. Ехегис, между сс. Алаяз и Кавушуг, на южных сухих каменистых склонах, 1600—2100 м над ур. м., 12.VIII.1976 г. и в окр. с. Горс, 1400—1450 м над ур. м., 29.VI.1976 г. (ERE: 113238, 113263). В условиях Вайка, особенно на высоте 2100 м, где данный вид встречается в виде зарослей кустарников высотой до 40—60 см, верхние части растений ежегодно страдают от морозов. В пределах Армении известен из Северной Армении, Зангезура и Мегри с песчаных каменистых осыпей, до 1000 м над ур. м. [2]. Сумах дубильный перспективен для облесения сухих каменистых, сильноэродированных склонов Вайка и других районов Южной Армении.

Pirrophrae rhamnoides L. Новый вид для дендрофлоры Вайка—Азизбековский р-он, северный склон Вайкского хребта, между сс. Азатек и Зейта, по берегу горной речки, среди лиственных редколесий,

1600—1650 м над ур. м., 8.VI 1977 г. (ERE: 113254). В пределах Армении распространен в Северной Армении, бассейне оз. Севан и в Зангезуре [2]. Является компонентом лиственных редколесий и весьма перспективен в озеленении населенных пунктов.

Институт ботаники АН АрмССР

Поступило 21.IV 1980 г.

ՆՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՎԱՅԻ ԴԵՆԴՐՈՖԼՈՐԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա. Ա. ԳՐԻԴՈՐՅԱՆ, Ժ. Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Վայքի դենդրոֆլորայի տեսակային կազմի ուսումնասիրությունների ընթացքում հայտնաբերվել է ծառերի ու թփերի նոր ու հազվագյուտ տեսակներ՝ ուռենի Վիլհելմսի—*Salix wilhelmsiana* M. Bieb., բարդի սպիտակ—*Populus alba* L., աղտոր դաբաղային—*Rhus coriaria* L., չիչխան դժնիկանման—*Hippophae rhamnoides* L.: Հայտնաբերված նոր օջախները բացահայտում են նշված տեսակների տարածման ուղղությունը Հայկական ՍՍՀ-ում:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Мулкиджанян Я. И. Флора Армении, 5, Ереван, 1966
2. Мулкиджанян Я. И. Флора Армении, 6, Ереван, 1973.
3. Скворцов А. К. Тр. БИНа АН АрмССР, 15, 1965.
4. Скворцов А. К. Флора Армении, 5, Ереван, 1966.