

НОВЫЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В АРМЕНИИ

Ц. Р. ТОНЯН

Ключевые слова: *Centaurea*, *Serratula*, находки.

При исследовании обширного гербарного материала родов *Centaurea* L. и *Serratula* L. выявлен ряд редких и интересных видов для флоры Армении. Некоторые из них оказались новинками для флоры Еревана.

В статье приводятся новые местонахождения для семи редких видов родов *Centaurea* L. и *Serratula* L. Гербарные образцы хранятся в гербарии Института ботаники АН Армянской ССР (ERE) под соответствующими номерами.

Centaurea alexandri Bordz. подрод *Phalolepis* (Cuss.) Dobroc. секция *Phalolepis*. Новый для флоры Еревана и редкий для флоры Армении вид. Был известен из классического местонахождения: Мегринского р-на. Кроме того, собран оттуда же, между ст. Мегри и Шванцдор, фригана, слева от дороги, 650 м над ур. м., 10 VII 1938, Я. Мулкиджанян, (№ 90861, 90862, 90863, 90864, 90865). Определен нами. Новая находка, обнаруженная Э. Габриэлян и определенная нами из Ереванского флористического р-на между сс. Гарни и Гехадир, 25 V 1972, (№ 104123).

Это новое местонахождение, по-видимому, является северной границей вида. Закавказский эндемик, кроме Армении встречается в Восточном Закавказье [5, 8].

Centaurea asporhylla Boiss. (= *Centaurea zangezura* Grossh.) подрод *Cyanus* (Juss.) Hayek, подсекция *Variegatae* Stef. e Georg. Редкий вид для флоры Армении. Нами найдено новое местопроизрастание этого вида в бассейне оз. Севан, на Аргунийском побережье в окр. с. Дара, на каменистых склонах обгаженных грунтов, 11 VIII, 1975, Ц. Тонян, (№ 112534, 112535, 112536). В Армении ранее был собран из Мегринского р-на между сс. Варгавар и Личк, 17 VI, 1939, А. Гроссгейм (№ 27804); в окр. Джермука, с. Кечут, лес, 18 VII, 1964, Я. Мулкиджанян (№ 87307); Аштаракский р-н, между Нор-Амбертом и Амбертом, 11 VII, 1968, П. Гамбарян (№ 90397). Последние два сбора определены нами.

Новое местопроизрастание *C. astrophylla* расширяет наши представления о северной границе данного вида. Кроме Армении произрастает в Талыше и Иране [8].

Centaurea sevanensis Sosn. (= *Psephellus transcaucasicus* Sosn.). Подрод *Psephellus* (Cass.) Schmalh. Редкий, эндемичный для флоры Армении вид. Нами обнаружено новое местонахождение этого вида в Ширакском флористическом р-не, окр. г. Артик, в ущелье, 11 IX, 1970, Ц. Тонян, (№ 112220, 112221). Кроме классического местонахождения (окр. оз. Севан, с. Загалу), был собран А. Ахвердовым и Н. Мирзоевой в окрестностях г. Лениакана, 23 IX, 1952, (№ 112213), определен нами.

Встречается в предгорной зоне, на каменистых местах.

Centaurea phaeopappoides Bordz. Подрод *Odontolophopsis* Tzvel. Редкий и своеобразный вид для флоры Армении. Собран в Армении—Селимский перевал между сс. Каравансарай и Кархун, восточный каменистый, сухой склон, 1800—2050 м над ур. м., 2 VIII, 1955, Я. Мулкиджян, (№ 103302, 103303). В. Аветисян и Э. Габриэлян найдено новое местонахождение значительно южнее ранее известного—Микоянский р-н, с. Алаяз, у дороги, 14 VI 1957 (№ 90860); Микоянский р-н, правый берег р. Джаны-чай, между сс. Кавушук и Алаяз, восточный каменистый склон, 18 VI. 1957, В. Аветисян, Э. Габриэлян (№ 91054).

Во флоре СССР [6, 8] приводится для Южного Закавказья (между Даралагезским и Варденисским хребтами).

Этот редкий эндемичный для Даралагеза своеобразный вид, описанный и ранее известный из Ехегнадзорского р-на; каменистые склоны ущелья между сс. Ортакенд и Кяга, 8 VII 1957, Н. Цвелев и С. Черепанов (№ 81841).

Кроме известных экземпляров, нами определены новые сборы из различных местонахождений Даралагеза.

Centaurea arvensis (Cser.) Czer. Подрод *Sosnovskya* (Takht) Czer. Новинка для флоры Еревана, довольно редкий вид для флоры Армении. Впервые был собран на территории республики Э. Габриэлян [2] между Азизкендом и Дайназом, на щебнистых осыпях по правому берегу р. Веди, 27 V. 1960, (№ 87408). Новые местонахождения из Ереванского флористического р-на следующие: сс. Кярки и Советашен, 19 VI, 1977, А. Барсегян, (№ 109204, 109205, 109206); сс. Карабахляр и Азизкенд, 20 VII. 1977, А. Барсегян (№ 109203). Определили Э. Габриэлян и Ц. Тонян.

Эндемик Южного Закавказья, берег р. Арпа. Кроме Армении встречается в НахАССР.

Centaurea karabaghensis (Sosn.) Sosn. (= *Psephellus karabaghensis* Sosn.). Подрод *Psephellus* (Cass.) Schmalh., секция *Psephellus*.

Очень редкий вид для флоры Армении. Новый для Ереванского флористического р-на—Разданский р-н, между сс. Солак и Лусаван, вдоль железной дороги, 24 IX, 1972, Ц. Тонян (№ 112399, 112400, 112401). Определен нами.

Ранее был известен с г. Хуступ. 16 VIII, 1934. А. Тахтаджян. (№ 30235). Во Флоре СССР [8] приводится как эндемик Южного Закавказья.

Serratula erucifolia (L.) Boriss. (= *Serratula xeranthemoides* Bieb.) секция *Piplochaete* Boiss. Новый для флоры Еревана вид. Довольно редкий для Армении. Собиран из нового пункта произрастания в Араратском р-не, окр. с. Арарат. у железнодорожного переезда, 21. VIII 1968, Ц. Тонян. (№ 112213).

Этот вид был известен из Агинского р-на, в трех км к западу от с. Караберд. 1750 м над ур. м., 2 V, 1950, Ш. Асланян. (№ 55610); Спитакский р-н, г. Кур-тапа, 7 VII, 1962, Э. Шур-Багдасарян (№ 77781); из Зангезура между сс. Дарбас и Агуди, 21 VII, 1959, Я. Мулкиджанян. Все сборы определены нами.

Этот вид произрастает на солонцеватых почвах, на сухих склонах, сорных местах, на полях до среднего горного пояса.

Кроме Южного и Восточного Закавказья, *Serratula erucifolia*, встречается в Предкавказье, Дагестане, Европейской части СССР и Арало-Каспийском р-не Средней Азии [1, 9].

Институт ботаники АН Армянской ССР

Поступило 27.VI 1979 г.

ՖԼՈՐԻՍՏԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻՑ

Յ. Ռ. ՏՈՆՅԱՆ

Հոդվածում բերվում են *Centaurea* L. և *Serratula* L. ցեղերի հազվագյուտ 7 տեսակների աճման նոր վայրեր, դրանցից հրեքը նոր ևն Երևանի ֆլորայի համար:

ЛИТЕРАТУРА

1. Борисова А. Г. В кн.: Флора СССР, 28, М.—Л., 1963.
2. Габриэлян Э. Ц., Гамбарян П. П. Биолог. ж. Армении, 23, 1, 1970.
3. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, 4, 1934.
4. Гроссгейм А. А. Определитель растений Кавказа, М., 1949.
5. Клоков М. В. В кн.: Флора СССР, 28, М.—Л., 1963.
6. Цвелев Н. Н. В кн.: Флора СССР, 28, М.—Л., 1963.
7. Цвелев Н. Н. Бот. мат. герб. Бот. инст. АН СССР, 19, М.—Л., 1959.
8. Черепанов С. К. В кн.: Флора СССР, 28, М.—Л., 1963.
8. Davis P. H. and Kupicha F. K. Genus *Serratula* L. in Flora of Turkey ed. Davis P. H., Edinburgh, 1975.