ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ
XXXIV, 12, 1235—1238, 1981

УДК 599.742.1

О ЧИСЛЕННОСТИ ЗАКАВКАЗСКОГО ВОЛКА (CANIS LUPUS HAIASTANICUS DAHL) В АРМЯНСКОЙ ССР И НЕОБХОДИМОСТЬ УСИЛЕНИЯ БОРЬБЫ С НИМ

Ф. С. АГАДЖАНЯН

Приводятся данные о количестве волков, уничтоженных в Армении за период с 1949 по 1978 г. Исследования показали, что количество их за последние годы в Армянской ССР увеличилось. Учитывая вред, наносимый ими сельскому хозяйству и фауне позвоночных животных, в статье обосновывается необходимость усиления борьбы с ним.

Ключевые слова: волк, экология, динамика численности.

Биология закавказского волка в Армении вплоть до настоящего времени специально не изучалась, а между тем она представляет существенный интерес, тем более что условия обитания этого вида в нашей республике весьма своеобразны. Это своеобразие было отмечено еще Далем [7], который на основании анализа коллекционных материалов отнес волков из Закавказья к самостоятельному подвиду Canis lupus haiastanicus Dahl). К сожалению, сведения о закавказском волке, содержащиеся в работах Даля [3—8], сравнительно немногочисленны.

Так как за последние годы численность волка в Советском Союзе существенно увеличилась, изучению его биологии стали уделять серьезное внимание [9, 10]. Заметно активизировалась и борьба с волком, в особенности после публикации статей ряда ведущих териологов нашей страны [11—13].

Необходимость усиления борьбы с волком побудила нас опубликовать материалы о количестве добытых в Армении животных этого вида, собранные нами путем обобщения сводок, поступивших в райзаготконторы республики за период с 1949 по 1978 год (рис.). В статье приводятся также некоторые сведения о численности и поведении волка, собранные нами во время полевых работ в 1978 г.

Из приведенного графика (рис.) следует, что за тридцатилетний период в Армении в среднем в течение года добывали 230 волков. Всего за указанный период в республике было добыто 6922 волка, при этом минимальное количество (116)—в 1953, а максимальное (340)—в 1978 г. Приведенные сведения с достаточной полнотой отражают картину добычи волка в республике, так как почти все его шкуры из-за

высоких специальных премий сдаются охотниками в заготовительные пункты.

Материалы, отраженные в графике (рис.), дают наглядное представление о динамике численности волка в республике, весьма четко свидетельствуя о том, что поголовье этого хищника в Армении довольно значи-



Рис. Динамика заготовок шкур волка в Армении за период с 1949 по 1978 годы.

тельно. Заметное увеличение численности волка подтверждается и тем, что в Хосровском государственном заповеднике ими были полностью уничтожены уссурийские пятнистые олени, численность которых в 1968 г. достигала 180 голов. В связи с высокой численностью оленей волки, которые ранее заходили на территорию заповедника периодически, поселились здесь постоянно, и, судя по данным последующих лет, сыграли решающую роль в исчезновении оленей [1]. Приведенные сведения неоспоримо свидетельствуют о необходимости активизации борьбы с волком.

В Армении волк добывается в основном во время случайных встреч. Специальной охотой на волка занимаются лишь отдельные охотники. В последние годы у охотников возможность добычи волков несколько уменьшилась, так как, благодаря проведенным мероприятиям по защите фауны, в республике были установлены новые, более ограниченные сроки охоты. Несмотря на это, именно за указанный период количество добытых волков заметно увеличилось, что связано, очевидно, с ростом его численности в пределах Армении. Об увеличении численности волка свидетельствуют и сведения, полученные нами

при опросе сельского населения, а также наши непосредственные наблюдения (в декабре 1978 г.) в окрестностях поселка Джермук. В течение недели здесь регулярно регистрировались следы 10—12 волков, некоторые особи заходили на скотомогильник даже в дневные часы.

В условиях Армении волка едва ли можно отнести к «санитарам» природы, поскольку дикие животные, которыми он питается, обладают невысокой численностью. С другой стороны, известно, что волк является разносчиком ряда инфекционных и инвазионных заболеваний человека, а также диких и домашних животных. Весьма велик в Армении и непосредственный ущерб, который волк наносит поголовью домашнего скота и охотничьей фауне. Все это свидетельствует о том, что в Армении необходимо проводить постоянную борьбу с волком, которая при соответствующей организации позволит сократить его численность.

В районах развитого животноводства волка следует планомерно уничтожать, так как, не имея в Армении естественных врагов, он быстро размножается, и его численность ощутимо увеличивается за сравнительно короткий период.

Для успеха организованной борьбы с волком необходимо детально изучить его экологию. При этом важно установить его роль в тех или иных конкретных природных условиях, исследовать динамику численности и экологическую структуру отдельных его популяций, составить подробные карты его поселений применительно к каждому лесничеству и охотничьему хозяйству.

Все эти мероприятия значительно облегчат борьбу с волком в условиях нашей республики. В Армении при борьбе с волком целесообразно организовать облавные охоты, которые могут проводиться как на логовах, так и в других угодьях, где обнаружено их присутствие. Необходимо также шире практиковать отлов молодняка у логова и отстрел взрослых животных из засидок и скрадок. Существенный эффект должен оказать и капканный отлов волков, который лучше всего проводить у привад и при их постоянных переходах.

Институт зоологии АН Армянской ССР

Поступило 10.VI 1981 г.

ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԴԱՅԼԻ (CANIS LUPUS HAIASTAHICUS DAHL) ՔԱՆԱԿԻ ՀԱՐՑԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ՈՒՄ ԵՎ ՆՐԱ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ֆ. Ս. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

Հոդվածում բերվում են տվյալներ 1949 թվականից մինչև 1978 թվականը Հայաստանում որսված գայլերի քանակի վերաբերյալ։ Երեսուն տարվա ընթացքում հանրապետությունում ոչնչացվել է 6922 գայլ։ Յուրաքանչյուր տարի որսվել է միջին թվով 230 գայլ։ Ամենացածր քանակը նկատվել է 1953 թ. (116), իսկ ամենաբարձրը՝ 1978 թ. (340)։

Մեր կատարած դաշտային ուսումնասիրություններից, տեղական բնակչության վկայություններից և մթերման կայանների տվյալներից պարզվել է,

որ գայլերի քանակը մեր հանրապետությունում բարձրացել է։ Նկատի ունենալով նրանց հասցրած վնասը գյուղատնտեսությանը և որսարդյունաբերական տնտեսություններին, անհրաժեշտ է կազմակերպված պայքար տանել այդ գիշատիչների դեմ՝ նրանց քանակը բնության մեջ նվազեցնելու նպատակով։

ON THE PROBLEM OF THE NUMBER OF TRANSCAUCASIAN WOLF (CANIS LUPUS HAIASTANICUS DAHL) IN THE ARMENIAN SSR AND THE NECESSITY OF ITS CONTROL

F. S. AGHADJANIAN

Data on the number of hunted wolves in Armenia from 1949 to 1978 year are given. Studies have shown that the number of wolves increased in our republic for last years. The necessity of efficient control of the predator is stated in the paper.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Айрумян К. А., Гаспарян К. М.* Редкие млекопитающие фауны СССР. М., 1976.
2. *Бибиков Д. И.* Охота и охотничье хозяйство, 7, 1978.
3. *Даль С. К.* Зоол. сб., вып. 3, 1944.
4. *Даль С. К.* Зоол. сб., вып. 5, 1948.
5. *Даль С. К.* Зоол. сб., вып. 6, 1949.
6. *Даль С. К.* Зоол. сб., вып. 7, 1950.
7. *Даль С. К.* Докл. АН Армянской ССР, *14*, 3, 1951.
8. *Даль С. К.* Животный мир Армянской ССР. Ереван, 1954.
9. *Данилов П. И., Русаков О. С., Туманов И. Л.* Хищные звери Северо-Запада СССР. Л., 1979.
10. *Корытин С. А.* Поведение и обоняние хищных зверей. М., 1979.
11. *Наумов Н. П.* Охота и охотничье хозяйство, 9, 1978.
12. *Павлов М. П.* Охота и охотничье хозяйство, 8, 1978.
13. *Приклонский С. Г.* Охота и охотничье хозяйство, 8, 1978.