ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ
С МОДЕЛЬНЫМИ ЛИПИДНЫМИ МЕМБРАНАМИ

С. А. БАДЖИНЯН

Ключевые слова: модельные липидные мембраны, проницаемость, проводимость, нейромедиаторы.

В настоящее время изучение транспорта ионов, индуцированных разнообразными природными и синтетическими комплексами, представляет собой одно из актуальных направлений современной мембранологии. Такого рода исследования составляют часть широкого фронта работ по изучению биологически активных соединений, увеличивающих мембранную проницаемость. Важная роль в этих исследованиях принадлежит модельным липидным мембранам, которые близки по своим свойствам к биологическим мембранам, удобны для количественного изучения транспортных процессов и содержат в качестве компонента, ответственного за проницаемость, молекулы известного строения.

В данной работе применен указанный подход для изучения возможного взаимодействия модельных мембран из гликолипидов, фосфолипидов и их комплекса с некоторыми нейромедиаторами.

Материал и методика. Были использованы ганглиозиды, цереброзиды, сфингомиелины, полученные по методу, описанному ранее [2, 3, 5], лецитин и кардиолипин Харьковского завода бактериальных препаратов, растворы 0,1 М KCl, LiCl, NaCl, CsCl. Формирование модельных мембран из смеси гликолипидов с фосфолипидами, а также электрические измерения проводились по нашему методу [1]. Ионная избирательность мембран определялась по методу, предложенному Львом [4] на модельных липидных мембранах. В работе использовались также ацетилхолин бромистый фирмы «Хемапол», аспарагин фирмы «Реанал», норадреналин фирмы «Сигма».

Результаты и обсуждение. Модельные мембраны из гликолипидов обладают более высокой проводимостью к катионам, чем мембраны из фосфолипидов. Как видно из приведенных в таблице данных, проводимость мембран из ганглиозидов, цереброзидов и сфингомиелинов для ионов калия на 0,5—1,5 порядка выше таковой из фосфолипидных фракций. Мембраны, сформированные из комплексов лецитина с гликолипидами, также увеличивают проводимость как для ионов калия, так и для ряда исследуемых катионов. Обработка данных, полученных методом бионных потенциалов, выявила следующую закономерность в отношении проницаемости одновалентных катионов:

Таблица

Проводимость модельных мембран из лецитина, гликолипидов и смеси лецитина с гликолипидами, модифицированных нейромедиаторами в концентрации 10^{-5} М при рН 7,4 в растворе 0,1 М КСl (проводимость в $\text{Om}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$)

Модельные мембраны из:	М о д и ф и к а т о р ы			
	без модифика оров	аспарагин	ацетилхолин	норадреналин
Лецитинов,	$(2,3 \pm 0,2) \cdot 10^{-8}$	$(5,8 \pm 0,2) \cdot 10^{-8}$	$(6,2 \pm 0,2) \cdot 10^{-8}$	$(3,1 \pm 0,3) \cdot 10^{-8}$
Кардиолипидов,	$(1,2 \pm 0,2) \cdot 10^{-8}$	$(1,5 \pm 0,3) \cdot 10^{-8}$	$(1,8 \pm 0,2) \cdot 10^{-8}$	$(2,1 \pm 0,2) \cdot 10^{-8}$
Ганглиозидов,	$(6,3 \pm 0,3) \cdot 10^{-8}$	$(7,2 \pm 0,2) \cdot 10^{-5}$	$(6,4 \pm 0,2) \cdot 10^{-6}$	$(3,2 \pm 0,2) \cdot 10^{-6}$
Цереброзидов,	$(5,5 \pm 0,2) \cdot 10^{-7}$	$(2,6 \pm 0,3) \cdot 10^{-5}$	$(6,3 \pm 0,2) \cdot 10^{-5}$	$(2,1 \pm 0,2) \cdot 10^{-5}$
Сфингомиелинов,	$(1,3 \pm 0,3) \cdot 10^{-7}$	$(2,5 \pm 0,2) \cdot 10^{-6}$	$(1,8 \pm 0,3) \cdot 10^{-6}$	$(1,8 \pm 0,2) \cdot 10^{-6}$
Лецитинов с ганглиозидами,	$(2,3 \pm 0,2) \cdot 10^{-7}$	$(4,8 \pm 0,2) \cdot 10^{-6}$	$(5,1 \pm 0,2) \cdot 10^{-7}$	$(3,2 \pm 0,2) \cdot 10^{-6}$
Лецитинов с цереброзидами.	$(3,3 \pm 0,2) \cdot 10^{-7}$	$(3,2 \pm 0,2) \cdot 10^{-6}$	$(5,5 \pm 0,2) \cdot 10^{-5}$	$(3,1 \pm 0,2) \cdot 10^{-6}$
Лецитинов со сфингомиелинами	$(8,1 \pm 0,3) \cdot 10^{-8}$	$(3,2 \pm 0,3) \cdot 10^{-6}$	$(3,2 \pm 0,2) \cdot 10^{-6}$	$(2,5 \pm 0,3) \cdot 10^{-7}$

для ганглиозидных мембран $Li^+ = Na^+ > Cs^+ > K^+$; для цереброзидных мембран $Li^+ = Na^+ > K^+ > Cs^+$; для сфингомиелиновых мембран $Na^+ > Li^+ > K^+ > Cs^+$.

Аналогичную избирательность в отношении одновалентных катионов проявляют мембраны, сформированные из смеси фосфолипидов с гликолипидами. Свойство гликолипидов увеличивать проницаемость одновалентных катионов в фосфолипидных бислоях является доминирующим. В бислоиных мембранах из лецитина и кардиолипина проницаемость катионов убывает следующим образом:

Бислои из общих липидов создают аналогичный ряд [4], причем характер этой закономерности не зависит от соотношения индивидуальных фосфолипидов в мембранах из лецитинов и кардиолипидов.

Учитывая то обстоятельство, что гликолипиды представлены в мембранах нервных клеток (в частности, в значительном количестве они имеются в миелиновых оболочках нервных волокон), небезынтересно было исследовать проводимость рассматриваемых мембран при взаимодействии их с нейромедиаторами. В таблице приведены результаты исследований с аспарагином, ацетилхолином, норадреналином. Как видно из таблицы, нейромедиаторы увеличивают проницаемость мембран из гликолипидов и смеси их с фосфолипидами до 3 порядков. Фосфолипидные же бислои в этом отношении не чувствительны к нейромедиаторам. Приведенные данные дают основание предполагать, что гликолипиды играют специфическую роль в проницаемости клеточных мембран и проявляют определенную селективную чувствительность в отношении отдельных нейротрансмиттеров.

Сектор радиобиологии МЗ Армянской ССР

Поступило 29.V 1981 г.

ՈՐՈՇ ՆԵՅՐՈՄԵԴԻԱՏՈՐՆԵՐԻ ՓՈՆԱԶԳԻՅՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՈՒԵԼԱՅԻՆ
ԼԻՊԻԴԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ս. Ա. ԲԱԶԻՅԱՆ

Հետազոտված է գլիկոլիպիդներից և լեցիտինից ու կարդիոմիսին հետ նրանց խառնուրդներից մոդելային թաղանթները:

Նկատված է հետազոտվող թաղանթների առանձնահատկությունը միավալենտ կատիոնների թափանցելիության նկատմամբ, ինչպես նաև գլիկոլիպիդների հատկությունները՝ փոխազդել նեյրոմեդիատորների ասպարագինի, ացետիլխոլինի, նորադրենալինի հետ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Баджиян С. А. Биолог. ж. Армении, 26, 23, 1973.
2. Мхехян Э. Е., Акопов С. Э., Соцкий О. П., Баджиян С. А. Биофизика, 26, 1, 48, 1980.
3. Мхехян Э. Е., Соцкий О. П., Акопов С. Э., Баджиян С. А. Биофизика, 26, 1, 437, 1980.
4. Лев А. А. Моделирование ионной избирательности клеточных мембран, 30, Л., 1973.
5. Tumanova S., Badjinyan R., Nalbandyan R. Bioch. and Bioph. Res. comm., 84, 2, 520, 1978.