

ՀԱՐԱՐՈՒՄԻ ՇԱՐԽՈՒԹԻՄԱՆՈՒ

№ ДК 576.8.095+577.1.576.851.3

BAC. SUBTILIS-MESENTERICUS ԽՄԲԻ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻՆ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ-ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԵՇՆԵՐԸ

Ա. Մ. ՄԱՆԱՍՅԱՆ

Բանալի բառեր. *Bac. subtilis mesentericus*:

Աէրոբ սպորավոր բակտերիաները շատ տարածված են բնության մեջ և մեծ դեր են խաղում տարբեր բիոլոգիական և հողառաջացման պրոցեսներում:

Bac. subtilis-mesentericus խմբի բակտերիաները մեծ չափով տարածված են հողում, օժտված են ուժեղ արտահայտված անսազոնիստական հատկություններով և հանդիսանում են բազմաթիվ ֆիզիոլոգիական ակտիվ միացությունների պրոդուցենտներ [1]:

Մեր աշխատանքների հիմնական նպատակն է եղել, ելնելով *Bac. subtilis-mesentericus* խմբի բակտերիաների ֆիզիոլոգա-բիոքիմիական հատկանիշների ուսումնասիրությունից, հատուկ ուշադրություն դարձնել այդ տեսակի դիֆերենցիալ հատկանիշների մշակման վրա՝ նրանց ճիշտ տեսակավորելու համար:

Նյութ և մեթոդ. Ուսումնասիրվել է աէրոբ սպորավոր բակտերիաների *Bac. subtilis-mesentericus* խմբին պատկանող 45 շտամների ֆիզիոլոգա-բիոքիմիական առանձնահատկությունները: Օգտագործվել են սպորավոր բակտերիաների համաչափաչափ ենթակոմիտեի կողմից առաջարկված մեթոդները [2]:

Ուսումնասիրվել են հետևյալ տեսակներ՝ կուլտուրաների աճելու ունակությունը pH 5,7-ից 8,0-ի, 30°C-ի, սննդամիջավայրում 7% նատրիումի քլորիդի առկայության պայմաններում, դիֆերոօքսիդացիոն, ուրեազայի, էլյուտինազայի առաջացումը, տիրոզինի թայրայումը, կազինի և նատրիումի ցիտրատի յուրացումը, կաթի պեպտոնիկացիան, լիզին, օրնիտին և կարբոքսիլազաների, արգինինդեհիդրոլազայի առաջացումը, չեզոք պրոտեոլիզ, արտապրոկուունակությունը, նատրիումի պրոպիոնատի յուրացումը, նատրիումի հիպուրատի հիդրոլիզը:

Արդյունքներ և բնագրություն. *Bac. subtilis-mesentericus* տեսակի բակտերիաները մեկ տոկոս գլյուկոզ պարունակող ՄՊԱ սննդամիջավայրի պայմաններում լավ աճում են, առաջացնելով գորշավուն, սպիտակ-կրեմագույն, կրեմավարդագույն և գորշ գույնի պիգմենտավորում: Նրանց մակերեսը լինում է հարթ, մեծ և մանր կնճռավոր կամ ծալքավոր, անփայլ կամ խոնավանման փայլով, ոչ հարթ եզրերով: Փաղուկները հեշտ են վերցվում ազարի վրայից, աչսինքն՝ չեն ներաճում ազարի մեջ: Այս տեսակին պատկանող կուլտուրաների մի մասի արտադրած պիգմենտը թափանցում է ազարի մեջ, որը կարող է լինել գորշ և գորշանման գույնների:

Bac. subtilis-mesentericus խմբի կուլտուրաների ֆիզիոլոգա-բիոքիմիական առանձնահատկությունների ուսումնասիրություններից ստացված արդյունքները բերվել են աղյուսակում: Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից, ուսումնասիրված բոլոր 45 շտամները արտադրում են լիզինդեկարբոքսիլազա, աճում են սննդամիջավայրի pH 5,7 թթվություն և 7% նատրիումի քլորիդի առկայության պայմաններում, քայքայում են կազեինը, յուրացնում են նատրիումի ցիտրատը, իսկ կաթի լակտոսային ռեակցիան տեղի է ունենում պեպտոնիզացման կամ մակարդման միջոցով՝ տարբեր թթվության պայմաններում: Բացառությամբ 5 կուլտուրայի, մնացած 40 շտամներն արտադրում են օրնիտինդեկարբոքսիլազա և աճում 50°-ի պայմաններում: Ուսումնասիրված 45 բակտերիաներից 40-ը զուրկ են ադինինդեկարբոքսիլազային և չեզոք պրոտեազային ակտիվությունից: *Bac. subtilis-mesentericus* խմբի կուլտուրաների մոտ բացակայում են նատրիումի հիպուրատը հիդրոլիզելու, տիրոզինը քայքայելու, դիհիդրոօքսիացետոն և լիցիտինազա առաջացնելու ունակությունները: Քանի որ կուլտուրաների մի մասի մոտ ստացվել է դրական, իսկ մյուս մասի մոտ բացասական տվյալներ, հետևաբար նատրիումի պրոպիոնատը յուրացնելը և ուրեազային ակտիվություններն այս խմբի բակտերիաների մոտ պետք է համարել տատանվող հատկություն:

Աղյուսակ

Bac. subtilis-mesentericus խմբի բակտերիաների ֆիզիոլոգա-բիոքիմիական առանձնահատկությունները

Ուսումնասիրվող ռեակցիաները	Շտամների քանակը ըստ ռեակցիաների	
	դրական	բացասական
Լիզինդեկարբոքսիլազա	45	0
Օրնիտինդեկարբոքսիլազա	40	5
Արգինինդեհիդրոլազա	5	40
Չեզոք պրոտեազա	5	40
Լիցիտինազա	1	44
Ուրեազա	26	19
Կազեինի քայքայումը	45	0
Նատրիումի ցիտրատի յուրացումը	45	0
Կաթի պեպտոնիզացիա	45	0
Նատրիումի հիպուրատի հիդրոլիզը	0	45
Տիրոզինի քայքայումը	0	45
Դիհիդրոօքսիացետոնի առաջացումը	0	45
Նատրիումի պրոպիոնատի յուրացումը	27	18
Աճը 50°	40	5
Աճը pH 5,7	45	0
Աճը 7% NaCl	45	0

Bac. subtilis-mesentericus խմբի բակտերիաների ֆիզիոլոգա-բիոքիմիական հատկանիշները համեմատելով մեր ուսումնասիրած աչրոբ սպորավոր բակտերիաների այլ խմբերին պատկանող կուլտուրաների ֆիզիոլոգա-բիոքիմիական հատկանիշների հետ, պարզվել է, որ *Bac. subtilis-mesentericus*

խմբի բակտերիաներին յայտնաբերվեցին ֆերոլուզաբիոսինթետիկական հատկանիշներ, որոնք համարվում են բակտերիաների առաջատար առանձնահատկությունները: Այս հատկությունը հանդիսանում է համարվել արգինինգեֆերոլուզա առաջացնելու ունակության բացակայումը և կուլտուրաների աճելու ունակությունը սննդամիջավայրում 7% նատրիումի քլորիդի առկայության պայմաններում:

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ մանրէաբանության
ինստիտուտ

Ստացված է 9. IX. 1973

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КУЛЬТУР ГРУППЫ *BAC. SUBTILIS-MESENTERICUS*

А. М. МАЛХАСЯН

Изучены физиолого-биохимические признаки 45 штаммов бактерий группы *Bac. subtilis-mesentericus*.

Установлено, что важными дифференциальными признаками для культур группы *Bac. subtilis-mesentericus* являются рост при 7%-ном NaCl и отсутствие образования аргинин-дегидролазы.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Африкян Э. К. Бактерии-антагонисты и их применение. Ереван, 1959.
2. Gordon R. E., Haynes W. C., Tang C. H. The genus *Bacillus*. Washington D., 1973.