

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.9(479.25)

НОВЫЙ ЭНДЕМИЧНЫЙ ВИД РОДА ACANTHOLIMON BOISS.
 ИЗ АРМЕНИИ

Н. В. МИРЗОЕВА

Ключевые слова: *Acantholimon*, новый вид.

В процессе работы с видами рода *Acantholimon* для «Флоры Армении» (т. 2, 1956) изучение обширного материала выявило довольно своеобразную форму, четко отличающуюся от остальных видов. Исследования, проведенные в природе, а также находка П. П. Гамбаряном подобных растений в другом пункте дают возможность выделить самостоятельный вид, который является единственным представителем секции *Glumaria* Boiss. во флоре Армении.

Acantholimon gabrieljanii. Mirzoeva sp. nova (sect. *Glumaria* Boiss.) — Pulvini sat laxi. Folia aestivalia viridiusculo-glaucis, subplana, acinaciformi-linearia, rigida (l) 1,2—2,6 cm longa 1,5 mm lata, in acumen rigidissimum abeuntia, glabra, squamis calcareis tecta, margine breviter ciliolata, vernalia (basi ramorum hornotinorum) distincte breviora et vix latiora (ad 2 mm lata). Scapi ad 5—7 cm longi, folia vix superantes, simplices, itagillimi. In parte superiore squamis calcareis et pilis brevibus rigidis tecti, in parte inferiore glabri. Spiculae 10—12, alternae rhachide abbreviata, imbricatae, inflorescentiam (spicam disticham ad 4 cm longam) compactam, compressam formantes, e floribus duobus vel raro tribus bene evolutis et duobus-quattuor abortivis. Bractee 5 et plures (7—8) pro numero florum, glabrae, fere omnes manifeste carinatae (nervo medio prominente); inferior late ovata, abrupte longe acuminata breviter aristata ad 7—10 mm longa, parte herbacea sat lata, margine anguste membranacea; duae inter angustiores, parte herbacea sat angusta, apice plus minusve rotundatae, cuspidatae; intimae intermediis breviores sed in parte superiore eis latiores, vulgo membranaceae, nervo medio vix conspicuo in aristam abeunte. Calyx infundibuliformis 10—13 mm longus, tubo ad nervos et intereos omnino dense piloso, limbo albo 6 mm longo, secus nervos purpureo, nervis glabris marginem attingentibus, interdum eum vix superantibus. Corolla rosea. Fructus ignoti. Fl. Junio.

Habitatio. Transcaucasia Australis, Armenta, in regione montana superiore, ad saxa calcarea, 2000—2100 m. s. m. Species endemica.

Typus (holotypus et Isotypi): RSS Armenia, distr. Sevan, ripa australis lacus Sevan (Gjunej), inter pagus Dzhił et pagus Babadzhan; declivitas calcarea 2000 m. s. m. A. Achverdov et N. Mirzoeva, 17.VI.1954, ERE 116094 (holo), 116095—116098 (iso).

Paratypi: RSS Armenia, distr. Sevan, inter promontorium Tzamakaberd et locus Akhtamar, in saxosis, V. 1979, P. Hambarlan, ERE 116099.

Affinitas. Species haec ad sectionem *Glumaria* Boiss. pertinet sed a speciebus ceteris huius sectionis spiculis non solum e floribus 2—3 bene evolutis sed etiam e floribus 2—4 abortivis efformatis bene differt. Ad specie affini *A. lycopodioides* pulvinis laxioribus, inflorescentia 2.5—4 cm (nec 1.5—2) longis, 10—12 spiculis (nec 5—8), bractaeis exterloribus 7—10 mm (nec 4—5) longis manifeste differt.

Nomen speciei in honorem cl. Eleonora Gabrielljanil florum Armeniae exploratoris datum.

Подушки довольно рыхлые. Летние листья зеленовато-сизые, почти плоские, саблевидно-линейные, жесткие (1) 1,2—2,6 см дл. и 1,5 мм шир., с твердым острием, покрытые мелкими известковыми чешуйками, по краю мелко- и короткореснитчатые; весенние (в основании однолетних побегов) заметно короче и чуть шире (до 2 мм шир.). Цветоносы до 5—7 см дл., несколько превышают листья, простые, ломкие, в верхней части покрытые мелкими известковыми чешуйками и короткими, жесткими волосками, внизу голые. Колоски, очередно расположенные на укороченной оси соцветия, черепитчато кроют друг друга, образуя плотное, сжатое с боков соцветие (двурядный колос) до 4 см дл., состоящее из 10—12 колосков. Колоски состоят из двух, редко трех вполне развитых цветков и двух или четырех цветков, находящихся в зачатке. Прицветников 5 и больше (7—8) в зависимости от числа цветков в колоске, все голые с ясным килем (с выступающей наружу средней жилкой); наружный широко-яйцевидный сразу длинно заостренный, с коротким острием 7—10 мм дл., с относительно широкой травянистой частью, узко перепончато окаймленный; два средних более узкие, с относительно узкой травянистой частью, сверху слегка закругленные, оканчивающиеся острием; внутренние короче средних, но в верхней части значительно шире их, обычно пленчатые, с едва заметной средней жилкой, переходящей в острие. Чашечка воронковидная, 10—13 мм дл., трубка чашечки сплошь по жилкам и между ними густо опушенная, отгиб ее белый, 6 мм дл., вдоль жилок пурпурно окрашенный, жилки голые, доходят до края отгиба, иногда его превышают. Венчик розовый, плоды неизвестны. Цветет в июне.

Обитает в Южном Закавказье в Армении на известковых скалах верхнего горного пояса на высоте 2000—2100 м над ур. м. Эндемик.

Тип (голотип и изотипы): Армянская ССР, Севанский р-он, южный берег оз. Севан (Гюней), между с. Джил и с. Бабаджан, Известняковый склон, 2000 м над ур. м., 17.VI.1954, А. Ахвердов и Н. Мирзоева, ERE, 116094 (holo), 116095—116098 (iso).

Паратипы: Армянская ССР, Севанский р-он, между мысом Цамакаберд и Ахтамаром, на скалах, V.1979, П. Гамбарян, ERE, 116099.

Родство Хорошо отличается от остальных видов секции *Glumagia* Boiss. наличием в каждом колоске, кроме 2—3 цветков, достигающих полного развития. еще 2—4 зачаточных цветков. От близкого *A. ly-copodioides* (Girard) Boiss. четко отличается более рыхлой подушкой, соцветием, равным 2,5—4 см дл. (а не 1,5—2), числом колосков—10—11 (а не 5—8), наружными прицветниками—7—10 мм (а не 4—5) дл.

Вид назван в честь исследователя флоры Армении Элеоноры Цолаковны Габриэлян.

Институт ботаники
АН Армянской ССР

Поступило 24.IV 1981 г.

ACANTHOLIMON BOISS. ՑԵՂԻ ՆՈՐ ԷՆԴԵՄԻԿ
ՏԵՍԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ

Ե. Վ. ՄԻՐԶՈՅԵՎԱ

Հոգիածում նկարագրված է դիտուիթյան համար նոր և Հայաստանի համար նոր էնդեմիկ տեսակ *Acantholimon gabrieljanii* Mirzoeva: Վերջինս բնորոշ է միայն Սևանի ավազանի համար: