

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.893

НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ЗОНТИЧНЫХ (АРИАСЕАЕ) АРМЕНИИ

Г. К. ГОРОСЯН

*Ключевые слова: флора Армении, зонтичные.*

Работа с коллекцией сем. Ариасеае гербария Института ботаники АН АрмССР и определение материалов экспедиций последних лет по этому семейству, как уже отмечалось нами [2, 3], значительно изменили флористический спектр зонтичных многих районов Армении. Ниже приводятся дополнительные сведения о новых местонахождениях редких видов, а также новый для флоры Армении вид—*Vupleurum gerardii* All.

*Vupleurum gerardii* All. Новый вид для флоры Армении. Собран Э. Габриэлян и А. Еленевским в верховьях р. Воротан, в 5 км от с. Барзарчай, среди скал, 14.8.1959 (ERE, 8033).

*Actinolema macrolema* Boiss. Весьма своеобразный, редкий вид для флоры Армении и СССР. Собран И. Аревшатян в Араратском р-оне на юго-восточных отрогах Урцского хребта, южный макросклон, напротив с. Ерасх, 1.7.1978 (ERE 114526—114531). Был известен лишь из окр. Еревана (Вохчаберд, Гарни, Гехард) [4].

*Vupleurum kozo-poljanskyi* Grossh. Очень редкий и интересный эндемичный вид [1]. Описан из Санаина и до сих пор был известен лишь из близлежащих к нему пунктов (Шамлуг, Ахтала, Колагеран) [4]. Новое местонахождение—Иджеванский р-он, можжевельниковое редколесье в окр. с. Агдан, В. Аветисян, В. Манакян, 30.10.1980 (ERE 114532)—хотя и находится в том же флористическом районе, но значительно удален от классического местонахождения.

*Vupleurum tenuissimum* L. subsp. *gracile* (Bieb.) H. Wolff. (*V. marschallianum* C. A. Mey.)—Кафанский р-он, окр. с. Арачадзор, 10°0—1100 м над ур. м., Н. Ханджян, К. Таманян, 20.7.1972 (ERE 108907). На юге Армении обнаружен впервые, был известен только из окр. Еревана [4].

*Cachrys lophoptera* Boiss. Takht (= *Prangos lophoptera* Boiss.)—Талинский р-он, г. Артени (Богутлу), Г. Торосян, 22.7.1980 (ERE 114533). Новый для Ширакского флористического р-она, прежде известный только из Ереванского и Дарелегисского флористических р-нов [4].

*Peucedanum meyeri* (Boiss.) Boiss.—Зангезур, Кафанский р-он, между с. Срашен и Цав, в кустарниках, А. Еленевский, 6.8.1959 (ERE

8026). Известен был из Северной Армении [4], для Зангезура приводится впервые.

*Prangos arcis-romanae* Boiss. et Huet Гукасянский р-он, между сс. Гетик и Кефли, левый борт р Чичхан, горная степь, южный каменный склон. Я Мулкиджанян, В Аветисян, 12.7.1957 (ERE 75485). Новинка для Верхне-Ахурянского флористического района, был известен из Севанского, Дарелегисского и Мегринского р-онов [4].

*Smurnium perfoliatum* L. Новые местонахождения в Иджеванском флористическом р-оне: Ноемберянский р-он, окр. с. Кохб, урочище Хлагом, в буково-дубово-грабовом лесу, Э. Габриэлян, 1.6.1980 (ERE 114534—114537, 114836; Ноемберянский р-он, окр. с. Верхний Аксигар, урочище Калакянд, тиссовая роша, 1000 м над ур. м., левый берег р. Воскепарчай, Э. Габриэлян, 3.6.1980 (ERE 114837). Весьма редкий вид, известен лишь из Иджеванского и Зангезурского флористических р-онов.

В дополнение к «Флоре Армении» [4] ниже приводится также ряд видов зонтичных, новых для соответствующих флористических р-онов.

В. Ахурянский — *Anthriscus nemorosa* (Bieb.) Spreng., *Carum carvi* L., *Ferula orientalis* L., *Malabaila dasyantha* (C. Koch) Grossh., *Peucedanum ruthenicum* Bieb.

Ширакский — *Bupleurum persicum* Boiss., *Chaerophyllum bulbosum* L., *Ferula orientalis* L., *Pimpinella peucedanifolia* Fisch.

Арагацкий — *Bupleurum polyphyllum* Ledeb., *B. rotundifolium* L., *Malabaila dasyantha* (C. Koch) Grossh., *Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon., *Pimpinella peucedanifolia* Fisch.

Лори — *Angelica tatjanae*, Bordz., *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm., *Heracleum transcaucasicum* Manden., *Zosima absynthifolia* (Vent.) Link.

Иджеванский — *Aethusa cynapium* L., *Agasylis latifolia* (Bieb.) Boiss., *Bifora radians* Bieb., *Buntium paucifolium* DC., *Chaerophyllum macrospermum* (Willd. ex Spreng.) Fisch. et C. A. Mey., *Cymbocarpum anetholoes* DC., *Heracleum transcaucasicum* Manden., *Laser trilobum* (L.) Borkh., *Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon., *Pastinaca armena* Fisch. et C. A. Mey., *Pimpinella saxifraga* L., *Scandix iberica* Bieb., *Torilis japonica* (Houtt.) DC., *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm.

Апаранский — *Bupleurum comnutatum* Boiss. et Bal., *Caucalis platycarpus* L., *Pastinaca armena* Fisch. et C. A. Mey., *Pimpinella peucedanifolia* Fisch., *P. tripartita* Kalenicz.

Севанский — *Bupleurum falcatum* L. subsp. *exaltatum* (Bieb.) H. Wolff., *Pimpinella peucedanifolia* Fisch., *Zosima absynthifolia* (Vent.) Link.

Герамский — *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm., *Astrodaucis orientalis* (L.) Drude., *Bupleurum polyphyllum* Ledeb., *B. rotundifolium* L., *Chaerophyllum macrospermum* (Willd. ex Spreng.) Fisch. et C. A. Mey., *Pimpinella saxifraga* L., *Trinia leiogona* (C. A. Mey.) B. Fedtsch., *Zosima absinthifolia* (Vent.) Link.

Ереванский — *Aethusa synapium* L., *Angelica tatjanae* Bordz., *Chaerophyllum aureum* L., *Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon., *Pastinaca armena* Fisch. et C. A. Mey.

Дарелегисский — *Bifora radians* Bieb., *Eryngium campestre* L.

Зангезурский — *Heracleum sosnowskyi* Manden., *H. transcaucasicum* Manden., *Ligusticum alatum* (Bieb.) Spreng., *Pimpinella nudicaulis* Trantv., *P. tripartita* Kalenicz., *Scandix steliata* Banks et Soland.

Мегринский — *Cymbocarpum anethoides* DC., *Grammosciadium daucoides* DC., *Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon., *Turgentia latifolia* (L.) Hoffm.

Институт ботаники АН Армянской ССР

Поступило 24.IV 1981 г.

## ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՈՎԱՆՈՑԱՎՈՐՆԵՐԻ (Ariaceae) ՆՈՐ ԵՎ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Գ. Կ. ՔՈՐՈՍՅԱՆ

Հոդվածում նշվում են Հայաստանի հովանոցավորների համար մեկ նոր և յոթ հազվագյուտ տեսակների աճման վայրերը:

### Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Аветисян В. Е., Барсегян А. М., Габриэлян Э. Ц., Григорян А. А., Торосян Г. К. Список редких и исчезающих видов флоры Армении. Ереван, 1979.
2. Торосян Г. К. Биолог. ж. Армении, 30, 9, 49—52, 1977.
3. Торосян Г. К. Биолог. ж. Армении, 31, 3, 332—334, 1978.
4. Флора Армении, 6, Ереван, 1973.