

на территории, примыкающей к Нахичеванской АССР (между сс. Хачик и Гнишик). Из тех же местонахождений имеются экземпляры этого вида, собранные в 1963 и 1976 г. разными коллекторами. Второе местонахождение *T. kotschyi* в Армении—г. Хуступ, где вид собран нами совместно с Т. Н. Поповой. Это сизоватое, обильно опушенное, у основания более или менее одревесневшее, декоративное растение произрастает там на труднопреодолимом склоне, среди каменистых осыпей.

Изученные экземпляры (ERE): АрмССР, Ехегнадзорский р-он, между сс. Хачик и Гнишик, известковые скалы, 24.VII.1950, А. Л. Тахтаджян (№ 114624, 114626); там же, урочище «Малый хан», на скалах, 2500 м, 5.VIII.1963, В. Е. Аветисян, Э. Ц. Габриэлян (№ 114623); там же, г. Арснасар, скалистые склоны, 2600 м., 9.VII.1976, В. Е. Аветисян и др., (№ 114621, 114628); Кафанский р-он, г. Хуступ, подъем с сев.-восточной стороны, вблизи вершины, каменистые осыпи, 16.VII.1969, Н. С. Ханджян, Т. Н. Попова (№ 114625, 114627).

Институт ботаники АН Армянской ССР

Поступило 24.IV 1981 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Галушко А. И. Флора Северного Кавказа, 3, Ростов-на-Дону, 1980.
2. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, 4, Баку, 1934.
3. Гроссгейм А. А. Определитель растений Кавказа. М., 1949.
4. Мурадян Л. Г. Биолог. ж. Армении, 29, 8, 38—43, 1976.
5. Сосновский Д. И. Докл. АН Армянской ССР, 2, 4, 119—122, 1945.
6. Цвелев Н. Н. В кн.: Флора СССР, 26, Л., 1961.
7. Boissier E. Diagnoses Plantarum Orientalium Novarum, ser. 1, 6, 1845.

РЕФЕРАТЫ

УДК 595.772

ВИДОВОЙ СОСТАВ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЛЕПНЕЙ ЗАКАВКАЗЬЯ И СЕВЕРНЫХ СКЛОНОВ Б. КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА

А. Е. ТЕРТЕРЯН

Первые сведения о видовом составе фауны слепней Кавказа (Закавказья) мы находим как у зарубежных, так и русских исследователей. Однако систематическое изучение их началось лишь в советское время. Первую обобщающую сводку по слепням Кавказа дал Н. Г. Олсуфьев. В послевоенные годы развернулись широкие исследования фауны слепней Кавказа—в Армянской ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Дагестанской АССР, Кабардино-Балкарской АССР и в других автономных республиках.

Недавно опубликовано 2-е издание «Фауны СССР», посвященной этой группе насекомых, в которой обобщены все имеющиеся данные по

изучению слепней СССР (Олсуфьев, 1977). В том вошли 185 видов и подвидов слепней. Из указанного состава почти половина видов отмечается для территории Закавказья и северных склонов Кавказского хребта. Однако данные по географическому распространению взрослых слепней Закавказья представлены в обобщенном виде, причем для Армении они далеко не полны.

Настоящая статья посвящена видовому составу слепней Закавказья и северных склонов Кавказского хребта. В систематическом списке каждый вид (имаго) сопровождается подробными сведениями по географическому распространению, с указанием республик, областей, районов и населенных пунктов. Впервые дается географическое распространение преимагинальных фаз. Эти данные приводятся по материалам, собранным в Армянской ССР, поскольку слепнями подробно занимались только в этой республике. В основу этого списка положены материалы: а) из Армянской ССР: сборы автора 1948—1981 гг., а также фрагментарные сборы слепней, проведенные другими лицами; б) из Азербайджанской ССР: коллекции слепней Института зоологии АН Азербайджанской ССР, вновь просмотренные и определенные нами на современном уровне; коллекции слепней кафедры зоологии беспозвоночных животных Азербайджанского государственного университета; в) из Грузинской ССР: коллекция Музея Грузии им. акад. Джанашиа, просмотренные и определенные нами; личные сборы автора по слепням, проведенные в совместной с Институтом зоологии АН Грузинской ССР экспедиции в высокогорном Онском районе; г) коллекции слепней, хранящиеся в Зоологическом институте АН СССР (г. Ленинград); д) опубликованные в периодической печати работы, а также материалы диссертаций, относящиеся к рассматриваемому вопросу.

В настоящей статье мы придерживаемся современной системы сем. *Tabanidae*, с некоторыми изменениями в расположении таксонов.

В статье для Закавказья и северных склонов Б. Кавказского хребта указывается 105 видов и подвидов слепней.

113 с., библиогр. 133 назв.

Институт зоологии АН Армянской ССР

Поступило 2.XI 1981 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНТИ

УДК 633.11:575.581

РЕФЕРАТЫ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В ЗЕРНАХ ГИБРИДОВ ПШЕНИЦЫ F_1 И РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ

Э. А. ПЕТРОСЯН, В. В. ОГАНЕСЯН

Данные о наследовании количества белка в зерне F_1 разноречивы. Это объясняется факторами, имеющими прямое отношение к методу