

УДК 636.22/28

## ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ ВЕСА ВОЛОС У КОРОВ КАВКАЗСКОЙ БУРОЙ ПОРОДЫ

В. Б. ВОСКАНЯН, М. С. ХАЧАТРЯН, А. О. ОГАНЕСЯН

С целью более направленного ведения селекции по совершенствованию продуктивных и племенных качеств кавказской бурой породы в отделе генетики и разведения крупного рогатого скота института на протяжении ряда лет проводятся многосторонние научные исследования.

Для характеристики конституциональных особенностей породы использовался такой важный компонент, как кожный покров, свойства которого тесно связаны с породностью, возрастом, полом, продуктивностью животных. Результаты изучения кожного покрова в наших работах в указанном аспекте обобщены ранее (Восканян В. Б., Хачатрян М. С., 1974, 1975, 1977). Данное сообщение относится к изучению волосяного покрова высокоудойных коров кавказской бурой породы. Исследование проводилось на коровах колхозов им. XXII партсъезда и им. Шаумяна Шаумянского и им. Куйбышева Абовянского районов.

Судя по полученным данным, вес волос высокоудойных коров изменяется в зависимости от возраста, живой массы и уровня молочной продуктивности. Наряду с этими закономерными изменениями наблюдались также изменения весовых показателей жиропота и грязи.

Таким образом, весовые показатели волосяного покрова животных можно считать доступным критерием при изучении интерьера. Способ определения веса волос (и жиропота) можно применять при проведении селекции кавказской бурой породы—подборе материнских пар и отборе племенного молодняка.

7 с., табл. 1, библиогр. 4 назв.

Армянский НИИ животноводства и кормопроизводства

Поступило 23.IX 1982 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНТИ