

УДК 636.22/28

О НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КОЖНЫЙ ПОКРОВ МОЛОДНЯКА КАВКАЗСКОЙ БУРОЙ ПОРОДЫ

М. С. ХАЧАТРЯН

Проведена объемная работа по изучению качества шкур молодняка кавказской бурой породы. Этому способствовали интенсивное выращивание и откорм молодняка, позволяющих не только увеличить производство высококачественной говядины, но и обеспечить промышленность тяжелым кожевенным сырьем. В связи с этим становится очевидным значимость прижизненного определения площади и толщины кожного покрова молодняка. В задачу наших исследований входило определение толщины кожи в области середины последнего ребра и на вершине локтевого бугра, а также измерение площади кожи молодняка обоих полов в различные возрастные периоды. Молодняк был выращен в колхозе им. Куйбышева с. Котайк Абовянского района. Полученные данные свидетельствуют о том, что с возрастанием живой массы животного общий объем кожного покрова и его площадь увеличиваются. Закономерность в темпе роста у обоих полов животных проявляется одинаково, однако вследствие полового диморфизма бычки превосходят телочек по площади кожи на 7—17%. Таким образом, можно заключить, что при изучении интерьера молодняка крупного рогатого скота кожный покров является одной из наиболее доступных орган-систем, отражающей биологические закономерности формирования организма, а прижизненное определение площади и толщины кожи как важные интерьерные показатели могут быть использованы при бонитировке, в частности при оценке кожного покрова для получения кожевенного сырья требуемого качества.

7 с., табл. 1, библиогр. 4 назв.

Армянский НИИ животноводства и кормопроизводства

Поступило 23.IX 1982 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНТИ