

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.29

НОВЫЕ ДЛЯ СССР И АРМЯНСКОЙ ССР ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ,
ОБНАРУЖЕННЫЕ НА КАМЕНИСТЫХ ОБНАЖЕНИЯХ
ДНА ОЗЕРА СЕВАН

А. А. АБРАМЯН

Ключевые слова: лишайники, обнаженные грунты, флористические новинки, озеро Севан.

Снижение уровня воды озера Севан привело к обнажению огромных пространств (20 тыс. га), которые со временем стали зарастать. Как выяснилось, среди растительности обнаженных почвогрунтов лишайники занимают далеко не последнее место, не отличаясь при этом большим разнообразием видов [1]. Тем не менее в процессе изучения закономерностей формирования лишайникового покрова каменистых обнажений нам удалось выявить один новый для СССР и девять новых для Армянской ССР видов. Несмотря на то, что последние ранее для Армении не указывались, в своем большинстве это обычные для флоры Кавказа виды, и их произрастание в центральной Армении вполне закономерно [2]. Все отмеченные виды собраны в прибрежной полосе на высоте 1900—1915 м над ур. м., с камней, покрытых густым известковым налетом, осажженным из озерной воды.

При обработке материала ценными указаниями оказали помощь Н. С. Голубкова и Ц. Н. Инашвили, за что приношу им свою искреннюю признательность.

Sarcogyne polackiana (Müll. Arg.) H. Magn., Medd. fran Goteborgs Bot. Trädg. 12, 1938:103.—Басс. оз. Севан, Артанишский п-ов, обнаженные грунты, 13.VI.1980, А. Абрамян, № 172. Известен из Ирана. Для лишенофлоры СССР указывается впервые. Этой находкой подтверждается предположение Голубковой [3] о возможности произрастания данного вида на Кавказе. От диагноза наши образцы отличаются плохо развитым слоевищем.

Acarospora cervina Massal., Ricerch. Auton. Lich. 1852:28.—Этот и последующие виды обнаружены в Армении впервые. В бассейне оз. Севан найден только на Гюнейском побережье (Севанский хр.), где помимо обнаженных грунтов встречается и в горах, достигая высоты 2700 м над ур. м. В наших сборах вид представлен *f. ruginosa* Massal., Ricerch. Auton. Lich. 1852:28. С обнаженных грунтов собраны только стерильные образцы.

Caloplaca biatorina (Massal.) Steiner, Ann. Myc. 7, 1910:239.—Басс. оз. Севан, Артанишский п-ов, обнаженные грунты, 16.VII.1980, А. Абрамян, № 186. Довольно обычен на обнаженных грунтах. При-

входит Сатала [4] для Ереванской губернии из местонахождения, в настоящем соответствующем территории НахАССР.

C. declipiens (Arn.) Blomb. et Forss., Points-Förteckning 1880:69.—Басс. оз. Севан, Артанишский п-ов, обнаженные грунты, 15.VII.1980, А. Абрамян, № 174; 16.VII.1980, А. Абрамян, № 175.

Collema minor (Pakh.) Tomin ex Schaf., Bot. Materialy (Not ul System. e Sect. Cryptog. Inst. Bot. nomine V. L. Komarovli Acad. Sci. URSS) 9, 1953:23, 27.—Басс. оз. Севан, Артанишский п-ов, обнаженные грунты, на крупнозернистом песке среди камней, 12.VIII.1979, А. Абрамян, № 210.

C. polycarpon Hoffm., Deutschl. Flora 1796:102.—Распространенны в бассейне оз. Севан лишайник. Особенно часто встречается на Артанишском п-ове. Одинаково обильно произрастает как на обнаженных грунтах, так и на коренном берегу.

C. undulatum Laur. ex Flot., Linnaea 23, 1850:161.—Басс. оз. Севан, Айриван, обнаженные грунты, 9.VII.1980, А. Абрамян, № 209. В наших сборах вид представлен var. *granulosum* Degel., Symb. Bot. Upsa 13.2.1954:369. На обнаженных грунтах довольно обычен.

Lecanora crenulata (Dicks.) Hook. in Sm., Engl. Flora 5, 1814:194.—Басс. оз. Севан, обнаженные грунты вдоль дороги Севан—Камо, 24.IV.1979, А. Абрамян, № 1; басс. оз. Севан, Артанишский п-ов, обнаженные грунты, 16.VII.1980, А. Абрамян, № 186. Образец, собранный с территории, ныне соответствующей НахАССР, Сатала [4] отмечает для Ереванской губернии.

Rinodina bischoffii (Hepp) Massal., Framm. Lich. 1855:26.—Басс. оз. Севан, Артанишский п-ов, обнаженные грунты, 13.VI.1980, А. Абрамян, № 187. Встречается на каменистых обнажениях всего побережья.

Verrucaria muralis Ach., Method. Lich. 1803:115.—Басс. оз. Севан, Артанишский п-ов, обнаженные грунты, 13.VI.1980, А. Абрамян, № 173. Встречается на каменистых обнажениях всего побережья.

Национальный парк «Севан», Армянская ССР

Поступило 24.IV 1981 г.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Абрамян А. А. В сб.: Брио-лихенологические исследования высокогорных районов и севера СССР. Анагиты, 1981.
2. Абрамян А. А. Биолог. ж. Армении, 33, 5, 560—561, 1980.
3. Голубкова Н. С. В кн.: Определитель лишайников СССР, 5, Л., 1978.
4. Szatala Ö. Borbasia, 4, 1—6, 70—96, 1942.