

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОВРОДЕЛИИ КРАСИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ ФЛОРЫ АРМЕНИИ

М. А. МАНУЧАРЯН, А. А. МУРАДЯН

Статья посвящена изучению красящих свойств более 50 видов красильных растений флоры Армении, относящихся к 30 семействам. Результаты опытных выкрасок показывают, что получена богатая гамма цветов, включающая красный, желтый, коричневый, фиолетовый, черноватый, серый, оливковый и их оттенки. Красящие растения классифицированы по основным цветам, которые нами получены.

Выкраски красного цвета и его оттенков получены главным образом при использовании корней марены (*Rubia tinctorum* L.); розовые и terraкотовые тона — при окраске корнями ясменника (*Asperula humifusa* (MB) Bess). Желтый цвет и его оттенки дает большое число растений — виды молочая (*Euphorbia* L.), дурнишник (*Xanthium strumarium* L.), золотарник (*Solidago virga-aurea* L.) зверобой (*Hypericum polygonifolium* Rupr), бессмертник (*Helichrysum spicatum* Fisch. et Mey) и др. Коричневый цвет и его оттенки получены при крашении околоплодниками и листьями грецкого ореха (*Juglans regia* L), древесиной скумпии (*Cotynus coggygria* L.), листьями дурнишника, надземной частью горца (*Polygonum aviculare* L.), душицы (*Origanum vulgare* L.), зверобоя, корнями щавеля (*Rumex crispus* L.); Окрашивание плодами бузины (*Sambucus nigra* L.) дает табачно-бурый, табачно-коричневый, умбровый цвета, корнями ясменника—ореховый, кожанно-бурый. Черный цвет получен при окраске плодами бузины и надземной частью душицы; черноватый цвет дают многие растения, содержащие дубильные вещества—скумпия, горец, щавель, лабазник (*Filipendula hexapetala* Gilib.), перилла (*Perilla nankinensis* (Lour.) Desne), молочай. Гамма зеленых цветов — зеленовато-серый, зеленовато-желтый, оливково-зеленый, хаки — получена при окрашивании щавелем, дурнишником, неслией (*Neslia paniculata* (L.) Desv.), солодкой (*Glycyrrhiza glabra* L.), дымяной (*Fumaria officinalis* L.), горцем, гладиолусом (*Gladiolus kotchuanus* Boiss) и др.

Выбраны растения, перспективные для применения в ковроделии— марена, молочай, дурнишник, орех, душица.

19 с., библиогр. 6 назв.

Институт ботаники АН Армянской ССР

Поступило 23.X 1982 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНТИ