5. Петросян Ф. Р., Гижларян М. С. и др. Биолог. ж. Армении, 34, 7, 1981.
6. Петросян Ф. Р., Гижларян М. С. Ж. экспер. и клин. мед., АН Арм. ССР, 3, 225—230, 1982.
7. Пирс Э. Гистохимия теоретическая и прикладная, М., 1962.
8. Хачатрян М. К. Санитарная охрана водоемов от загрязнения промышленными сточными водами, 5, 44—61, М., 1962.
9. Fouts J. R., Rogers A. Z. J. Pharmacol. exper. Ther., 146, 286, 1964.
10. Hollander F. Gastroenterology, 43, 304, 1962.
11. Slater T. F. Nature, 209, 5018, 36—40, 1966.

«Биолог. ж. Армении», т. XXXVII, № 1, 1984

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 577.3

ОСМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСМЕМБРАННЫЙ H^+ -ПОТОК У ГЛИКОЛИЗИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ

А. А. ТРЧУНЯН

Ключевые слова: бактерии гликолизирующие, осмотический шок, трансмембранный перенос ионов.

Бактерии *E. coli* при гликолизе секретируют ионы водорода [1, 3, 4, 6, 9], что имеет важное значение для поддержания внутриклеточного рН. Согласно предложенной нами схеме [6], H^+ -ионы транспортируются через мембрану бактерий либо в виде нейтральной молочной кислоты, либо с помощью $H^+ - ATФ$ -азного комплекса $F_1 \cdot F_0$, образующего суперкомплекс с TpkA системой поглощения ионов калия и функционирующего как $H^+ - K^+$ -насос [2, 8]. При этом такой насос обменивает 2 H^+ клетки на один K^+ среды, работает кратковременно, ДЦКД (N,N'-дипивлогексилкарбодимид)-зависим и чувствителен к осмотическому давлению среды [5, 6]. Трансмембранный H^+ -поток может идти и через отдельные H^+ -каналы F_0 по градиенту рН между клеткой и средой [7, 8].

В настоящей работе приводится характеристика трансмембранного H^+ -потока у гликолизирующих бактерий, в котором в отсутствие градиента рН и электрического поля на мембране определена ДЦКД-зависимая и осмочувствительная компонента, связанная с работой $F_1 \cdot F_0$.

Материал и методика. Исследования проводили на таком типе бактерий *E. coli* K 12 (λ). В работе использовали ДЦКД и КХФГ (карбонилцианидхлорфенилгидразон) («Sigma», США). Методика подготовки бактерий к эксперименту и измерения активностей ионов в среде с помощью ионоселективных электродов описана ранее [4, 6].

Результаты и обсуждение. Бактерии *E. coli*, по нашим данным, при гликолизе секретируют 2,1—2,2 ионов водорода и 1,9 аннонов молочной кислоты на молекулу глюкозы (табл.), что согласуется с результатами работ ряда авторов, касающимися количественного соотношения секреции H^+ у гликолизирующих бактерий [1, 3, 9].

Секреция ионов водорода и анионов молочной кислоты и поглощение ионов калия у гликолизующих бактерий *E. coli* K 12 (Δ)

Глюкоза, мМ	Перенос ионов, мМ			Отношение количества секретировавшихся H^+ к количеству глюкозы	Отношение количества секретируемых анионов Лак к количеству глюкозы
	H^+	K^+	Лак ⁻		
5	$10,9 \pm 1,2$	$1,2 \pm 0,2$	$9,6 \pm 1,0$	$2,2 \pm 0,2$	$1,9 \pm 0,2$
10	$21,3 \pm 2,0$	$1,5 \pm 0,3$	$18,5 \pm 1,5$	$2,1 \pm 0,2$	$1,9 \pm 0,2$

Бактерии отмыты в дистиллированной воде и перенесены в экспериментальный раствор с осмотичностью 570 мосМ, активность ионов калия—1,5 мМ, рН 7,8, количество экспериментов—по 5

Если с помощью протонифора резко уменьшить величину мембранного потенциала и градиента рН, то ионы калия не станут удерживаться в клетке и начнут выходить в среду по градиенту концентрации, и в таких условиях $H^+ - K^+$ насос будет работать непрерывно, пока имеется глюкоза. Действительно, в присутствии протонифора КХФГ секреция H^+ из бактерий заметно увеличивается, она значительно подавляется при введении ДЦКД в среду (рис., ср. кр. 1 и 2). Этот факт говорит о том, что секреция H^+ в отсутствие градиента рН и электрического поля на мембране бактерий осуществляется в основном в результате работы ДЦКД-чувствительного $H^+ - АТФ$ -азного комплекса $F_1 \cdot F_0$. При этом ДЦКД-чувствительная компонента составляет около 70—80 процентов трансмембранного H^+ -потока.

При переносе бактерий из среды с высоким в среду с низким осмотическим давлением, то есть при отрицательном осмотическом шоке [4, 6], ДЦКД уже не подавляет секреции H^+ , которая значительно меньше (рис., кр. 3). Такие же результаты были получены в параллель-

Рис. Кинетика секреции H^+ у гликолизующих бактерий *E. coli* K 12 (Δ). 1—бактерии отмыты в дистиллированной воде и перенесены в экспериментальный раствор с осмотичностью 570 мосМ; 2—тот же эксперимент в присутствии КХФГ в концентрации 10^{-4} М; 3—бактерии отмыты в растворе с осмотичностью 800 мосМ, созданной с помощью сахарозы, и перенесены в экспериментальный раствор с КХФГ в концентрации 10^{-4} М; глюкоза в концентрации 50 мМ, рН 7,8, активность K^+ 1,9 мМ, ДЦКД введен (стрелка) в концентрации 10^{-4} М.

ном [5] эксперименте (не показано). Следовательно, в трансмембранном H^+ -потоке четко выявляется и осмотически чувствительная компонента, осмотический шок включает именно ДЦКД-чувствительный $F_1 \cdot F_0$

Таким образом, в трансмембранном H^+ -потоке у гликолизующих бактерий *E. coli* выделяются ДЦКД-зависимая и осмочувствительная компонента, связанная с функционированием F_1F_0 .

Ереванский государственный университет,
кафедра биофизики

Поступило 14.X 1983 г.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. *Мартirosов С. М.* Автореф. докт. дисс., Л., 1973.
2. *Мартirosов С. М., Папоян Г. А., Трчунян А. А.* Биофизика, 27, 249—252, 1982.
3. *Blackwood A. C., Nelsh A. C., Ledingham Q. A. J.* Bacteriol., 72, 497—499, 1956.
4. *Durgaryan S. S., Martirosov S. M.* Bioelectrochem. Bioenerg., 5, 554—560, 1978.
5. *Durgaryan S. S., Martirosov S. M.* Ibid, 5, 567—573, 1978.
6. *Martirosov S. M., Trchounian A. A.* Ibid, 8, 25—32, 1981.
7. *Martirosov S. M., Trchounian A. A.* Ibid, 8, 605—611, 1981.
8. *Martirosov S. M., Trchounian A. A.* Ibid, 8, 597—603, 1981.
9. *Schultz S. G., Epstein N., Goldstein D. A. J. Gen. Physiol., 46, 343—353, 1962.*

«Биолог. ж. Армении», т. XXXVII, № 1, 1984

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 616:983

ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ШТАММОВ ВИРУСА САРКОМЫ ПТИЦ, ВЫДЕЛЕННЫХ В АРМЯНСКОЙ ССР, НА КУЛЬТУРУ КЛЕТОК

К. Ш. ФРАНГУЛЯН, М. Г. ХАНАМИРЯН, Р. Р. ХАЧАТУРЯН

Ключевые слова: вирус птиц, культура клеток, трансформация.

Онкогенные вирусы, наряду со способностью индуцировать опухоли у животных, способны размножаться и вызывать злокачественную трансформацию *in vitro* в клетках, полученных от естественного хозяина, а также от животных других видов [2, 5]. Трансформирующая активность в отношении клеток различного происхождения установлена у ряда онкорнавирусов. Наиболее изученным в этом аспекте является вирус саркомы Рауса. Ряд авторов [1—4, 6, 7] считают, что вирус саркомы Рауса вызывает *in vitro* трансформацию клеток всех известных лабораторных животных, обезьян и эмбриональной ткани человека, причем эти клетки, хотя и содержат в своем составе интегрированный вирусный геном, не обладают, за редким исключением, способностью к продукции инфекционного вируса.

Основная задача нашей работы состояла в изучении трансформирующей активности штаммов вируса саркомы птиц, выделенных в Армянской ССР, в отношении некоторых культур клеток млекопитающих.