13. Шустин Н. А. Физиология лобных долей головного мозга. 223, Л., 1959.
14. Gombarian L. S., Kazarian A. G., Garibian A. A. Folia clinica (Internacional) (Barcelona), 26, 5, 2—12, 1976.
15. Gombarian L. S., Koval J. N., Garibian A. A. and Sarkisian J. S. Exp. Brain Res., 15, 1, 15—28, 1982.
16. Garibian A. A. Folia clinica Internacioaal (Barcelona), 25, 9, 2—8, 1975.
17. Garibian A. A., Sarkisian J. S., Kazarian G. M. Folia clinica Internacioaal., 24, 10, 1—7, 1974.
18. Hecht K., Neuyen Van Hai, Garibian A. A. and Hecht T. Acta Physiol. Sci. Hungaricae, 48, 4, 387—389, 1976.
19. Pask G. Electronic News, 391, 10—15, 1:63.

«Биологическая Армения», т. XXXVII, № 2, 1984

УДК 615.2+612.015.32:616.45—001 1/3

РЕГУЛЯЦИЯ ДИБУНОЛОМ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ

Э. М. МИКАЕЛЯН, В. Г. МХИТАРЯН

Установлено, что при иммобилизационном стрессе в сердце, мозге и печени белых крыс интенсифицируется аскорбат- и НАДФ-Н-зависимое индуцируемое перекисное окисление липидов. Активность СОЛ подавляется, а глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы активируются. Запасы биоантиоксиданта α -токоферола в тканях значительно понижаются. Дибунол, введенный на фоне иммобилизационного стресса, регулирует интенсивность ПОЛ, уровень α -токоферола в тканях, а также активность ферментов, предупреждающих образование активных форм кислорода и устраняющих липоперексиды.

Ключевые слова. стресс иммобилизационный, перекисное окисление, дибунол, α -токоферол, супероксиддисмутаза, глутатионредуктаза, глутатионпероксидаза

Интенсивность процесса перекисного окисления липидов как в физиологических, так и в экстремальных условиях зависит от жирнокислотного состава фосфолипидов мембран, уровня антиоксидантов и активности ферментных систем, генерирующих и детоксицирующих перекиси. Бурлаковой [3] была выдвинута гипотеза регуляции процесса перекисного окисления липидов биомембран системой природных антиоксидантов по замкнутому контуру, по принципу отрицательной обратной связи.

Нами ранее было установлено, что при иммобилизационном стрессе повышается интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в тканях [5]. Было интересно проследить, как синтетический антиоксидант дибунол регулирует ПОЛ при иммобилизационном стрессе (ИМО). Дибунол отличается низкой токсичностью, быстро переходит из крови в ткани, накапливается в их липидах, благодаря чему в организме длительно сохраняется его стабильная концентрация [1].

Антирадикальная активность дибунола на 2 порядка ниже природного антиоксиданта α -токоферола. Однако в условиях *in vivo* дибунол

как пространственно экранированный фенол проявляет большую антиокислительную активность, так как радикал дибунола, возникающий в реакции $ROO \cdot HJn \rightarrow ROOH + Jn$, не обладает способностью реагировать с жирнокислотными остатками и разветвлять цепь [8]. Все это послужило основанием для использования дибунола с целью регуляции ПОЛ при инфаркте миокарда, лечении ожогов, ран, язвы желудка и других патологических состояний.

Первоначально механизм регуляторного действия дибунола целиком относили к его антирадикальным свойствам. В последнее время некоторые исследователи постулируют действие дибунола на интенсивность ПОЛ через регуляцию активности ферментных систем утилизации активных форм кислорода (СОД и липопероксидазы (глутатионпероксидазы и глутатионтрансферазы) [7].

В предыдущих исследованиях нами было показано, что дибунол после четырехкратной инъекции в дозе 120 мг/кг ежедневно intactным животным подавляет интенсивность индуцированного аскорбат- и НАДФН-зависимого ПОЛ в печени, сердце, мозге и эритроцитарных мембранах. Интерес представляет влияние дибунола на распределение α -токоферола в тканях. В работах Бурлаковой и Храповой [2] показано, что дибунол после разовой инъекции в дозе 100 мг/кг intactным мышам увеличивает АОЛ липидов печени с одновременным снижением уровня токоферола. По мнению авторов, последний интенсифицируется на тушение свободных радикалов ввиду сравнительно низкой антирадикальной активности дибунола по отношению к α -токоферолу.

Нами установлено, что влияние дибунола на уровень α -токоферола имеет тканевую специфичность: значительно деингибируется в эритроцитарных мембранах и несколько повышается в мозге, в печени и в сердце уровень его ниже контроля.

Дибунол стадийно изменяет активность ферментов антирадикальной защиты клетки: СОД в основном ингибируется, а ферменты, детоксифицирующие липоперекиси, глутатионпероксидаза и глутатионредуктаза, активируются.

Материал и методика. Опыты ставили на 150-ти беспородных белых крысах-самцах массой 120—150 г, разделенных на 3 группы: I—intactные крысы, II—животные, которых иммобилизовали ежедневно в течение 150 мин фиксации головы и конечностей (число иммобилизаций — от одной до семи). За это время происходит максимальная активация адреномежулярной и адренокортикальной системы, что соответствует фазе напряжения стресса. III группа — животные, которым на фоне иммобилизационного стресса предварительно вводили дибунол в дозе 120 мг/кг ежедневно за 3 дня до стресса и в день первой фиксации.

У животных всех трех групп в сердце, печени и мозге определяли интенсивность индуцированного аскорбат- и НАДФН-зависимого перекисного окисления липидов, содержание и активность супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы. Содержание витамина Е в тканях определяли флуориметрически по методу Дитана максимумом возбуждения при 295 нм и максимумом флуоресценции при 340 нм [9]. Количество витамина Е выражали в мкг на мг белка.

Об активности супероксиддисмутазы (СОД) судили по ингибированию генерации супероксидных анион-радикалов в модели фенолазметоксульфат-НАДФН-нитротетразолилсиний, за единицу активности принимая такое количество раствора фермента, которое

при добавлении к модельной системе, генерирующей супероксидный липион-радикал, подавляет его генерацию на 30% [11]. Пересчет единицы активности производили на мг белка.

Глутатионпероксидазную и глутатионредуктазную активность определяли по ранее описанной нами методике [6], выражая ее соответственно в мкмоль восстановленного глутатиона, окисленного за 1 мин на 1 мг белка, и мкмоль НАДФН, окисленного за 1 мин на 1 мг белка.

Ферментативное НАДФ-зависимое и неферментативное аскорбятзависимое индуцированное перекисное окисление липидов определяли по уровню одного из конечных продуктов перекисного окисления—малонового диальдегида—по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой. Ткани тщательно перфузировали охлажденным 0,15 М КСl. Все операции проводили на холоду при 4°. Ткани гомогенизировали в 0,154 М КСl, готовили 10%-ный гомогенат. Объем инкубационной среды составлял 1,2 мл, содержал 0,3 мл гомогената, время инкубации—30 мин при 37°. Инкубационная среда для аскорбат-зависимого перекисления также включала 0,3 мл 40 мМ трис-HCl pH 7,4, 0,3 мл 0,8 мМ аскорбата, 0,3 мл $12 \cdot 10^{-6}$ М соли Мора. В случае ферментативного НАДФН-зависимого перекисного окисления—0,3 мл $2 \cdot 10^{-1}$ М гидрофосфата натрия, 0,3 мл $12 \cdot 10^{-6}$ М соли Мора, 0,3 мл 1 мМ НАДФН. Содержание липидных перекисей выражали в нмоль малонового диальдегида на мг белка гомогената. Для расчета использовали коэффициент молярной экстинкции— $1,56 \cdot 10^5 \text{M}^{-1} \text{cm}^{-1}$. Содержание белка определяли по методу Лоури [10].

Результаты и обсуждение. Установлено, что иммобилизационный стресс (ИМО) вызывает выраженную интенсификацию ферментативного и неферментативного перекисного окисления липидов в сердечной мышце, мозге и печени. Активирование НАДФН-зависимого ПОЛ в основном более выражено. Интенсивность сдвигов липоперекисления проявляет некоторую органныю специфичность и зависит от срока иммобилизации. В мозге и печени к 7-му дню стресса активность ПОЛ приближается к контрольному уровню (рис. 1, 2). В сердце при иммобилизационном стрессе ПОЛ активируется с большей интенсивностью.

Рис. 1. Аскорбат и НАДФН-зависимое ПОЛ, содержание витамина Е, активность СОД, глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы в мозге при иммобилизационном стрессе, % по отношению к контролю. Условные обозначения: 1. Аскорбат-зависимое ПОЛ. 2. НАДФН-зависимое ПОЛ. 3. Витамин Е. 4. Активность СОД. 5. Активность глутатионредуктазы. 6. Активность глутатионпероксидазы.

чем в мозге и печени (рис. 3), причем наибольшие сдвиги приходятся на первые три фиксации, к 4-й иммобилизации появляется тенденция к адаптации, проявляющаяся в постепенном затухании ПОЛ (рис. 3).

Рис. 2. Аскорбат- и НАДФН-зависимое ПОЛ, содержание витамина Е, активность СОД, глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы в печени при иммобилизационном стрессе, % по отношению к контролю. Условные обозначения—те же

Рис. 3. Аскорбат- и НАДФН-зависимое ПОЛ, содержание витамина Е, активность СОД, глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы в сердце при иммобилизационном стрессе, % по отношению к контролю. Условные обозначения—те же

В печени и мозге интенсификация ПОЛ происходит стадийно с максимумами на 1-2-й и 5-й иммобилизациях (рис. 1, 2)

Активирование перекисного окисления липидов при ИМО связано с ингибированием фермента антиокислительной защиты СОД. Как показали наши исследования, в мозге, печени и сердце во все сроки ИМО СОД ингибируется в среднем на 30—60% (рис. 1, 2, 3). Это усиливает неферментативную дисмутацию супероксидного анион-радикала с образованием агрессивных форм кислорода—синглетного кислорода и гидроксидного радикала, резко активирующих свободнорадикальное окисление липидов биомембран.

Симбатно интенсификации ПОЛ в тканях при ИМО растет активность ферментных систем, детоксицирующих липоперекиси, — глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы (рис. 1, 2, 3). Эти ферменты прерывают липоперекисление на стадии разветвления цепи. Глутатионпероксидаза утилизирует липоперекиси ненасыщенных жирных кислот и соответствующие оксикислоты. Между указанными ферментами имеется тесная функциональная связь. Для функционирования глутатионпероксидазы в качестве субстрата необходим восстановленный глутатион, который является продуктом глутатионредуктазной реакции.

Аналогичная зависимость активности ферментов, детоксицирующих липоперекиси, от уровня субстрата наблюдалась и другими авторами в печени при канцерогенезе, в митохондриях старых крыс [4, 12].

Резкое подрастание уровня липоперекисей в тканях при иммобилизационном стрессе на фоне активирования ферментной системы их детоксикации указывает на несбалансированность процессов образования и устранения липоперекисей. Симбатно интенсификация ПОЛ и повышению содержания активных форм кислорода при ИМО в реакции антирадикальной защиты включается эндогенный антиоксидант — токоферол. Это приводит к истощению его запасов и понижению содержания в тканях до уровня, ниже контрольного (рис. 1, 2, 3). Наибольшие затраты витамина Е в основном совпадают с пиками интенсификации аскорбат- и НАДФН-зависимого путей перекисления липидов. К 7-й фиксации указанные сдвиги выравниваются.

Рис. 1. Аскорбат- и НАДФН-зависимое ПОЛ, содержание витамина Е, активность СОД, глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы в мозге при иммобилизационном стрессе на фоне предварительного введения дибунола, % по отношению к контролю. Условные обозначения — те же.

Предварительное введение дибунола существенно регулирует ПОЛ при иммобилизационном стрессе. Под его влиянием значительно падает активность обоих путей перекисления липидов — ферментативного НАДФН-зависимого и неферментативного аскорбат-зависимого. Эффект столь выражен, что в сердце, печени и мозге активность ПОЛ снижается значительно ниже контрольного уровня (рис. 4, 5, 6).

Влияние дибунола на распределение токоферола в тканях у интактных животных и на фоне ИМО неоднозначно. В печени интактных животных, как уже отмечалось, он понижает уровень токоферола. На фоне иммобилизационного стресса дибунол обогащает печеночную ткань токоферолом, уровень которого, кроме 5- и 6-кратной иммобилизации, значительно повышается, превосходя контрольный (рис. 5).

Рис. 5. Аскорбат- и НАДФН-зависимое ПОД, содержание витамина Е, активность СОД, глутатиопредуктазы и глутатиопероксидазы в печени при иммобилизационном стрессе на фоне предварительного введения дибунола, % по отношению к контролю. Условные обозначения—те же.

В мозге и сердце под влиянием дибунола на фоне ИМО содержание токоферола также повышается по сравнению с его количеством в те же сроки иммобилизации, за исключением трех- и пятикратной ИМО для мозга, пяти- и семикратной для сердца (рис. 4 и 6).

Рис. 6. Аскорбат- и НАДФН-зависимое ПОД, содержание витамина Е, активность СОД, глутатиопредуктазы и глутатиопероксидазы в сердце при иммобилизационном стрессе на фоне предварительного введения дибунола, % по отношению к контролю. Условные обозначения—те же.

На основании полученных результатов можно заключить, что дибунол, наряду с токоферолом, вовлекается в реакции антирадикальной защиты при ИМО, благодаря чему регулирует уровень последнего в тканях.

Степень вовлечения каждого из них в реакции тушения свободных радикалов определенным образом зависит от исходного метаболического фона, тканевой специфичности и срока иммобилизации. Активность СОД при ИМО на фоне введения дибунола меняется стадийно в зависимости от вида ткани и длительности стрессорного воздействия. В основном отмечается активирование супероксиддисмутазы, кроме 4-разовой иммобилизации для печени; 1-, 2-, 4-разовой для сердца; 1-, 4-, 5- и 6-разовой для мозга (рис. 4, 5, 6). Активность ферментной системы глутатионпероксидазы — глутатионредуктазы снижается, следуя за уровнем липоперексидей.

Таким образом, антиоксидант дибунол регулирует перекисное окисление липидов при стрессе непосредственно путем его антирадикального и антиокислительного действия, а также косвенно, через изменение активности ферментов, предупреждающих образование активных форм кислорода и устраняющих липоперексиды.

Ереванский медицинский институт,
кафедра биохимии

Поступило 8.VII 1983 г.

ԼԻՓԻԴՆԵՐԻ ԴԵՐՈՔՍԻԴԱՑԻԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԳԻՐՈՒՆՈՒՄԸ ԽՐՈՐՈՒԻԻԶԱՑԻՈՆ ԱՏՐԵՍԻ ՓԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Է. Մ. ՄԻՔԱԵԼԻԱՆ, Վ. Գ. ՄԿԻՏՐԻԱՆ

Իմմոբիլիզացիոն ստրեսի պայմաններում սպիտակ առնետների սրտամկանում, ուղեղում և լյարդում ուժեղանում է ասկորբատ և NADPH կախում ունեցող լիպիդային զերօքսիդացման պրոցեսը: Մուպերօքսիդիսմոտապայի ալտիփոթյունը ճնշվում է, իսկ գլուտաթիոնզերօքսիդազայի և գլուտաթիոն-ոկսիկտապայի ալտիփոթյունը բարձրանում է: α -տոկոֆերոլի քանակը հյուսվածքներում զգալիորեն նվազում է:

Իմմոբիլիզացիոն ստրեսի պայմաններում գիրունը կարգափոխում է զերօքսիդացման պրոցեսի ինտենսիփոթյունը, α -տոկոֆերոլի մակարդակը հյուսվածքներում, ինչպես նաև նշված ֆերմենտների ալտիփոթյունը և կանխում թթվածնի ալտիվ ձևի զոյացումը:

THE REGULATION OF LIPIDS PEROXIDATION BY DIBUNOL UNDER THE IMMOBILIZATION STRESS CONDITIONS

E. M. MIKHAELIAN, V. G. MKHITARIAN

Under the immobilization stress conditions the ascorbate and NADPH-dependent lipid peroxidation processes increase in the brain, liver and myocardium.

The activity of superoxidismutase decreases, while the glutathione peroxidase and glutathione reductase activities increase with the decrease

of α -tocopherol content in tissues. Dibunol regulates the intensity of lipid peroxidation processes, the level of α -tocopherol in tissues, the activity of the named enzymes.

Dibunol inhibits the appearance of the active form of the oxygen, 100.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Барсень В. А. Тез. Всесоюзн. совещ. «Биоантиоксидант», 118, Черногоровка, 1983
2. Буракола Е. Б. и др. Биоантиоксиданты в лучевом поражении и злокачественном росте 52, М., 1975.
3. Буракола Е. Б., Кухтина Е. П., Храпова Н. Г., Аристратова С. А., Биохимия, 892, 47, 6, 1982.
4. Ланкин В. Э., Гуревич С. М. Докл. АН СССР, 87, 228, 3, 1976.
5. Мхитарян В. Г., Араратян Э. А., Микаелян Э. М., Мелконян М. М. Ж. экпер. и клин. медицины, 13, 17, 5, 1977.
6. Микаелян Э. М., Мелконян М. М., Медик-Агаева Е. А., Мхитарян В. Г. Ж. экпер. и клин. медицины, 11, 19, 5, 1979.
7. Ракитя Д. Р., Коновалова Г. Г., Чепланенко Н. М. и др. Тез. Всесоюзн. совещ. «Биоантиоксидант», 46, Черногоровка, 1983.
8. Храпова Н. Г. Биоантиокислители в регуляции метаболизма в норме и патологии, 59, М., 1982.
9. Duggan D. E. Arch. Biochem. Biophys., 84, 116, 1959.
10. Morimitsu Nishihimi N., Appaji Rao Jment. Jagu. Biochem. Biophys. Res. Commun., 46, 3, 849, 1972.
11. Nohl H., Hegner D. Mech. Ageing Develop., 11, 145, 1979.
12. Lowry O. H., Rosenbrensk A., Beer K., Raymond F. J. Biol. Chem., 193, 265, 1951.

«Биолог. ж. Армения», т. XXXV/1, № 2, 1984

УДК 612.447+591.1*7

АКТИВНОСТЬ Ca^{2+} -АТФазы САРКОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО РЕТИКУЛУМА БЕЛЫХ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОПАРАТИРЕОЗЕ

Д. И. ХУДАВЕРДЯН, Э. Э. МХЕЯН

Показано, что в условиях гипопаратиреоза околощитовидных желез, на 5—6-е сутки после операции снижается активность Ca^{2+} -АТФазы белых скелетных мышц крыс, что, во-первых, может способствовать возникновению судорог.

Ключевые слова: гипопаратиреоз, Ca^{2+} -АТФаза, саркоплазматический ретикулум.

Гипофункция околощитовидных желез проявляется в двигательных, трофических и токсических расстройствах. Судорожный синдром, наиболее выраженный в симптомокомплексе этого заболевания, протекает на фоне уменьшения содержания ионов кальция в биологических жидкостях организма [3].

В настоящее время окончательно не выяснена роль процессов, протекающих на различных уровнях нервно-мышечного аппарата, в разви-