58. Roemer D., Buesscher H. H., Hill R. C., Maurer R., Peichor T. J., Zeugner H., Benson W., Fluner E., Milkowski W., Thies P. W. *Nature*, 298, 5876, 759-760, 1982.
59. Sawynok J., Penky C., LaBella F. C. *Life Sci.*, 25, 19, 1621-1638, 1979.
60. Schwab L. S. *J. Med. Chem.*, 23, 6, 698-702, 1980.
61. Shaw J. S., Miller L., Turubull M. J., Gormley J. J., Morley J. S. *Life Sci.*, 31, 12-13, 1259-1262, 1982.
62. Simon E. J. 7th Congr. Pharmacol., 613, Paris, 1978.
63. Simon E. J. *Life Sci.*, 16, 12, 1795-1800, 1975.
64. Snyder S. H. *Scientific American*, T-3, 9, 1813, 4-56, 1977.
65. Sormley J. J., Morley J. S., Priestley T., Shaw J. S., Turubull M. J., Wheeler H. *Life Sci.*, 31, 12-13, 1263-1266, 1982.
66. Szmuszkowicz J., Van Voigtlander P. F. *J. Med. Chem.*, 25, 10, 1125-1126, 1982.
67. Takemori A. E., Ohi T., Nishiyama N. *J. Pharmacol. exp. therap.*, 180, 2, 261-265, 1973.
68. Ward S. J., Portoghese P. S., Takemori A. E. *Adv. Endog. Optoids, Proc. Int. Max. Res. Conf.*, 12th, 229-231, 1981.
69. Vinogradova N. D., Kuznetsov S. V., Monastenkova S. F., Predtechenskii M. B., Chigareva S. W. USSR SU 990.759, Otkrytiya, Izobret., Prom. Obroztisy, Tovarynye Znaki, 3, 109, 1983.
70. Zakusov V. V. in: Opiate receptors and neurochemical correlates of pain, 109-114. Budapest, 1979.

«Биолог. ж. Армения», т. XXXVIII, № 1, 1985

УДК 579.252

ФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕКОМБИНАНТНЫХ ПЛАЗМИД, НЕСУЩИХ РАПОН *argECBH* ХРОМОСОМЫ *ESCHERICHIA COLI* K-12

Н. Л. МЕТТ, А. В. КОЧИКЯН, А. Л. МЕТТ, М. З. АСТВАЦАТРЯН,
В. А. САКАНЯН

Осуществлено молекулярное клонирование генов *argECBH* *E. coli* K-12 на векторе pBR322. Построена рестрикционная карта плазмиды pALM1, несущей *Bam*HI-фрагмент со всеми генами биполярного оперона *argECBH*. С помощью различных рестриктаз получены делеционные мутанты плазмиды pALM1, сохранившие, по крайней мере, ген *argE*. Рекombинантные плазмиды характеризуются многокопийностью, способностью к амплификации и стабильностью в клетках *E. coli*. Отмечен «эффект дозы гена» по активности N-ацетилаорнитин деацетилазы (продукт гена *argE*) в экстрактах штамма *E. coli*, несущего рекомбинантную плазмиду.

Ключевые слова: гены *argECBH*, молекулярное клонирование, рестрикционная карта.

Аргининовый регулон *Escherichia coli* K-12 состоит из 10 генов, расположенных в разных местах хромосомы. Четыре гена представлены в виде биполярного оперона *argECBH*, в котором транскрипция генов *argE* и *argCBH* идет в противоположных направлениях с перекрывающегося регуляторного участка ДНК [4]. Транскрипция этих генов находится под контролем репрессора, кодируемого геном *argR*. В регу-

ляции оперона *argECBII* аргинин выступает в качестве корепрессора [2].

Нами осуществлено молекулярное клонирование генов *argECBII* *E. coli* K-12. Скопструированные рекомбинантные плазмиды представляют собой удобное средство для изучения структурной и функциональной организации генов биополярного оперона *argECBII*.

Материал и методика. В работе использовали прототрофный штамм *E. coli* K-12, а также аукоотрофные штаммы *E. coli* K-12 MA 102 (*prc⁻ leu⁻ thr⁻ his⁻ argE⁻ trp⁻ L recA*) и MA 105 (*pur⁻ trp⁻ argII recA*).

Измерение активности *N*-ацетилорнитин деацетилазы проводили согласно описанной методике [5]. Генно-инженерные методики также описаны [3].

ДНК-лигаза фазы T4, рестриктазы *Sal*I и *Bgl*II получены из Института биохимии и физиологии микроорганизмов АН СССР, г. Пущино-на-Оке; рестриктазы *Hind*III, *Xba*I, *Xho*I, *Kpn*I, *Pvu*II, *Eco*R1 из ВНИИ прикладной микробиологии, г. Вильнюс.

Рестриктазы *Bam*HI, *Sau*3A и *Pst*I выделены в нашей лаборатории по общепринятым методикам.

Результаты и обсуждение. Клонирование генов *argECBII* *E. coli* K-12. Расщепленную рестриктазой *Bam*HI или *Eco*R1 хромосомную ДНК, выделенную из прототрофного штамма *E. coli* K-12, сшивали с помощью лигазы с вектором pBR322, расщепленным теми же рестриктазами. Лигированной смесью трансформировали клетки штамма *E. coli* K-12 MA 102. Трансформанты отбирали на минимальной селективной среде без аргинина и в присутствии ампициллина (Ар, 50 мкг/мл) и стрептомицина (200 мкг/мл).

В каждом из опытов по клонированию было получено несколько трансформантов. Плазмидные ДНК из всех *Arg⁻ Ar⁺* клонов характеризовались большим молекулярным весом, чем ДНК вектора pBR322. При перетрансформации штамма *E. coli* K-12 MA 102 плазмидной ДНК приблизительно с одинаково высокой частотой ($2-6 \cdot 10^5$ трансформантов/мкг ДНК) для всех образцов ДНК возникали *Arg⁺ Ar⁺* колонии. Рестрикционный анализ плазмидных ДНК ферментами *Bam*HI или *Eco*R1, использованными для клонирования, подтвердил их рекомбинантную природу.

Размер *Eco*R1-вставок колебался в пределах 18,1—21,6 тысячи пар оснований (т. п. о.) у разных плазмид, а *Bam*HI-вставок—8 т. п. о. Клетки, несущие рекомбинантные плазмиды с *Bam*HI-вставкой, были чувствительны к тетрациклину вследствие инсерционной инактивации *tet* гена вектора pBR322.

Эти данные свидетельствуют о том, что рекомбинантные плазмиды содержат ген *argE*.

Трансформация клеток штамма *E. coli* K-12 MA 105, дефектного по гену *argII*, образцами как *Bam*HI-, так и *Eco*R1-рекомбинантных плазмид также дает высокий выход *Arg⁺*-колоний. Поскольку гены *argE* и *argII* являются дистальными в опероне *argECBII*, можно заключить, что в составе рекомбинантных плазмид отклонирован весь кластер *argECBII* генов.

Для дальнейшей работы использовали одну из рекомбинантных плазмид, несущую *Bam*HI-фрагмент размером 8,0 т. п. о. Эта плаزمид, обозначенная как pALM1, имеет молекулярную длину 12,3 т. п. о.

Рестрикционное картирование плазмиды pALM1. Рестрикционная карта рекомбинантной плазмиды pALM1 построена на основании анализа фрагментов, образующихся при расщеплении плазмидной ДНК различными рестриктазами в отдельности и в комбинации друг с другом.

Клонированный BamHI-фрагмент не содержит сайтов расщепления для ферментов XhoI, XmaI, KpnI, EcoRI и PstI, но содержит 1 сайт для BglII, по 2 сайта для HindIII и SalI и 4—5 сайтов для рестриктазы PvuII. Локализация сайтов расщепления ферментами HindIII, SalI и BglII в геноме pALM1 показана на рис. 1.

Рис. 1. Рестрикционные карты плазмид pALM1 и pALM2. Тонкой линией обозначена ДНК вектора pBR322, толстой — клонированный BamIII-фрагмент хромосомы, пунктиром — участки, удаленные в геноме pALM2. Стрелками обозначено направление транскрипции генов *argE* и *argCB11* по [4].

Генерирование делеций в геноме pALM1. Для удобства последующей работы были получены делеционные мутанты плазмиды pALM1. Один из мутантов генерирован в результате расщепления плазмиды pALM1 одновременно рестриктазами BamIII и HindIII и отбором *Arg^r* трансформантов в штамме *E. coli* K-12 MA 102. Плазмидные ДНК, выделенные из нескольких десятков *Arg^r* клонов, имели одинаковый молекулярный вес и характеризовались утратой небольшого HindIII/BamIII-фрагмента (~0,3 т. п. о.) вектора и HindIII/BamIII-фрагмента (~1,8 т. п. о.) исходной вставки (рис. 2). К тому же в геноме таких плазмид изменилась ориентация клонированной вставки. Рестрикционная карта одной из делеционных плазмид, обозначенной pALM2, представлена на рис. 1.

Поскольку *argE^r*-плазида pALM2 (как и все другие делеционные мутанты) сохраняют смежные BamHI/HindIII-фрагмент (4,0 т. п. о.) и HindIII/HindIII-фрагмент (1,8 т. п. о.), то HindIII-сайт, разделяющий эти два фрагмента, расположен в гене *argE*. Следовательно, плазида pALM2 возникла либо в результате неполного расщепления по сайтам HindIII генома pALM1, либо в результате лигирования двух указанных смежных фрагментов ДНК с восстановлением интактного гена *argE*.

Возможно, ген *argE* инактивируется также в результате расщепле-

ния рестриктазой Sall, так как жизнеспособных ArgE⁺ трансформантов не удалось генерировать при одновременной обработке ДНК рALM1 рестриктазами BamHI/Sall.

Чтобы получить более протяженную делецию с сохранением гена argE, ДНК плазмиды рALM1, неполностью расщепленную рестриктазой Sau3A, переклонировали на векторе рBR322 по BamHI-сайту. В результате среди ArgE⁺ трансформантов обнаружено несколько делеционных вариантов, сохранивших вставку различной длины. Самая маленькая из этих плазмид, обозначенная рALM3, имеет вставку размером ~2,6 т. п. о.

По данным Бени с соавт. [1], ожидаемый размер биологического оператора argECBII составляет около 5 т. п. о. Поскольку величина вставки в геноме рALM3 значительно меньше указанного размера, в нем не должен присутствовать, по крайней мере, ген argH. Аналогично в HindIII-фрагменте (1,8 т. п. о.) плазмиды рALM2 не могут присутствовать все гены оперона. Эти предположения подтверждаются результатами трансформации штамма E. coli K-12 MA 105 плазмидами рALM2 и рALM3. В отличие от плазмиды рALM1 эти делеционные мутанты не дают ArgH⁺ трансформантов.

Рекомбинантные плазмиды рALM1 и рALM2 стабильно наследуются в штамме E. coli K-12 MA 102 по прошествии более чем 20 генераций. Все три плазмиды—рALM1, рALM2 и рALM3—характеризуются сравнимой с вектором рBR322 копияемостью. Кроме того, они амплифицируются при инкубации клеток с хлорамфениколом. Следовательно, у рекомбинантных плазмид рALM1, рALM2 и рALM3 сохранены репликационные функции исходного вектора.

В экстракте клеток штамма E. coli K-12 MA 102, несущего плазмиду рALM2, активность N-ацетилорнитин деацетилазы (продукт гена argE) приблизительно в 10⁷ раз выше, чем в экстракте клеток прототрофного штамма E. coli K-12. Имея в виду многокопийность плазмиды рALM2, повышение активности N-ацетилорнитин деацетилазы может быть объяснено «эффектом дозы гена».

В настоящее время изучается экспрессия генов argECBII оперона в условиях репрессии и дерепрессии и в разном цитоплазматическом окружении.

Научно-исследовательский технологический институт аминокислот, г. Ереван

Получено 16.VII 1981 г.

E. coli K-12-ի ԳՐՈՒՑՈՍՄԻ argECBII ՇՐՋԱՆԸ ԿԵՐՈՂ ՌԵԿՈՄԻՆԵՆՏ ՊԼԱՉՄԻԳՆԵՐԻ ՖԵՋԵԿԱԿԱՆ ՎԵՐՈՒՆԵՐՈՒՅՈՒՆԸ

Մ. Լ. ՄԵՏՏ, Ա. Վ. ՂՈՅԿՅԱՆ, Ա. Լ. ՄԵՏՏ, Մ. Զ. ԱՍԳԽԱՍԵՐՅԱՆ, Վ. Ա. ՍԱԹԱՆՅԱՆ

Իրականացված է E. coli K-12-ի argECBII գեների մոդելային կոնստրուկտի պրոպագուլացիայի վեկտորի վրա:

Կառմված է pALM1 պլազմիդի սևտրիկցիոն բարձրագր: pALM1 պլազմիդը կրում է BamHI հատվածը, որը պարունակում է argECBII կրկնարկն օպերոնի բոլոր գեները: