

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.893

О ДВУХ «ИСЧЕЗНУВШИХ» ВИДАХ ФЛОРЫ АРМЕНИИ
(ARACEAE, ORCHIDACEAE)

К. Г. ТАМАНЯН

Ключевые слова: флора Армении, редкие виды

Некоторые редкие виды, которые в течение нескольких десятилетий не обнаруживались на прежних местообитаниях, в процессе работы над «Красной книгой» были отнесены к разряду исчезнувших. Недавно нами обнаружено два таких интереснейших вида. Один из них—чрезвычайно ценное лекарственное растение—аир болотный, или ирный корень.

Acorus calamus L.—восточноазиатский субтропический элемент. Известно всего два вида *Acorus*, населяющих умеренные и теплые страны Северного полушария. Из них у нас встречается один [2], имеющий дизъюнктивный ареал. В Европейской части СССР аир произрастает в основном в западных районах. В северных, восточных и в ряде южных районов он отсутствует. Встречается также в некоторых районах Сибири и на Дальнем Востоке [1, 3].

Это прибрежно-водное растение. Растет в стоячих водах либо по берегам рек, ручьев и озер, на заболоченных участках, по дну мокрых балок, нередко образуя сплошные заросли.

Потребность в «корне» аира в нашей стране составляет до 100 тонн в год. Это необычайно ценное в лекарственном и пищевом (ликерное производство) отношении растение и поэтому новое нахождение его на территории Армении, где он в прошлом, вероятно, настолько широко использовался, что полностью исчез, несомненно имеет большое значение. Аир очень легко размножается вегетативным способом, возобновляясь от мелких кусочков корневища, что дает неоценимое преимущество для возделывания его в хозяйственных целях.

В гербарии Института ботаники АН АрмССР хранятся всего 2 экземпляра аира из окр. с. Паракар, собр. Шелковниковым в 1925 г. (ERE № 293, 294) и 1 лист из с. Арсвшат, собр. Сепетчяном в 1949 г. (ERE № 41272). Нами он обнаружен по дороге из Эчмиадзина в Аштарак, 16.6.1984 г. К. Г. Таманян (ERE № 125316, 125317).

Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.—надбородник безлистный. Монотипный род, населяющий умеренную зону Европы и запад Азии. Географический тип—палеарктический. Чрезвычайно редкий вид, многолетние поиски которого наконец увенчались успехом. В гербарии Института ботаники хранится всего два экземпляра

из Лорийского флористического района (окр. Степанавана), собранные в 1920 г. А. Шелковниковым. Нами обнаружен в новом Иджеванском флористическом районе: Дилижан, Головино, лес в окр. санатория «Горная Армения», собр. и опр. К. Г. Таманян (ERE № 125315).

Таким образом, оба найденных нами вида—*Acorus calamus* L. и *Epipogium arhyllum* (F. W. Schmidt) Sw.—переходят тем самым из ранга исчезнувших (статус 0) в ранг находящихся под угрозой вымирания. Дальнейшее существование их невозможно без специальных мер охраны (статус 1).

Институт ботаники АН Армянской ССР

Поступило 28.III 1984 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. 185. М., 1976.
2. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа. 2, 72, 254, Баку, 1940.
3. Флора СССР. ч. 635, Л., 1935.

«Биолог. ж. Армении», т. XXXVIII, № 10, 1985

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.4

ТИП ВЕТВЛЕНИЯ ЛУКОВИЦ У НЕКОТОРЫХ АМАРИЛЛИСОВЫХ

М. Я. АСАТРЯН

Ключевые слова: амариллисовые, луковица, ветвление

Ветвление побега начинается с образования боковых побегов. Оно непосредственно связано с вегетативным размножением, поэтому изучение его имеет большое практическое значение [2].

У растений с достаточно хорошо выраженными междоузлиями установление характера ветвления не представляет особой трудности, но у луковичных растений стебель сильно укорочен и из-за невыраженных междоузлий у них трудно определить тип ветвления и установить местоположение почки возобновления.

Изучение типа ветвления у амариллисовых привлекало внимание ботаников еще с прошлого столетия. Для выяснения этого вопроса использовали разные критерии, и тем не менее до сих пор мнения исследователей все еще противоречивы [1].

Характер ветвления побега у амариллисовых изучен лишь у небольшого числа представителей, поэтому данные, полученные для новых родов, пополняют сведения об этом семействе. Нами изучен характер ветвления у представителей родов *Cyrtanthus*, *Eucharis* и *Lycoris* по принципу Артюшенко [1], считающей, что основным критерием его