

Verbascum blattaria L. — Этот довольно редкий в Армении коровяк собран в Иджеванском р-не в окр. с. Тала в шибляке, 8.9.1983, Э. Габриэлян и К. Таманян (ERE 122987). Это — вторая находка в Северной Армении и четвертая в республике.

Veronica dillenii Crantz. — Очень редкий на Кавказе и новый для Армении вид, собранный в Разданском районе, в Цахкадзоре, на сухом склоне левобережья реки на высоте 1800 м над ур. м., 16.7.1977, Э. Габриэлян (ERE 120536). Собирали также Т. Поповой и Н. Ханджян.

Kickxia elatine (L.) Dum. — Редкое растение, новое для Иджеванского флористического района. Собрано на правом берегу реки Агстев, на горе Беджаниял, 6.9.1983, Э. Габриэлян (ERE 122985, 122986).

Следует также остановиться несколько подробнее и привлечь внимание фитосистематиков к интереснейшему явлению, замеченному членами Иджеванской экспедиции в сентябре 1983 г. На влажном сильно задернованном лугу северной экспозиции, в привершинной части известняковой горы Аггая, кроме произрастающих там довольно редкой *Gentiana ciliata* и более обычной *G. caucasica*, обнаружены небольшие популяции *Gentiana gelida* и *Gentiana septemfida*. В зоне контакта эти два вида образовали множество переходных форм с необычайным разнообразием в окраске венчика и строении цветка. По всей вероятности, здесь довольно бурно протекают процессы гибридизации и образования новых форм. Думается, что кариологические исследования на популяционном уровне могут представить значительный научный интерес. Такое же явление, но в меньшем масштабе было замечено нами на Севанском (Семеновском) перевале, на такой же высоте, около 2000 м над ур. м.

Институт ботаники АН Армянской ССР

Поступило 24 IV 1984 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Еленевский А. Г. Новости сист., 243, 1961.
2. Флора Армении, 5, 18—19, 1966.
3. Флора СССР, 25, 518—519, 1959.
4. Davis P. Flora of Turkey, 2, 360—361, 1967.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.9+582.52/572

О НЕКОЛЬКИХ РЕДКИХ ВИДАХ ЛИЛЕЙНЫХ (СЕМ. LILIACEAE) ФЛОРЫ АРМЕНИИ

Г. Г. ОГАНЕЗОВА

Ключевые слова: флора Армении, лилейные.

Во время экспедиционных поездок последних лет по Северной Армении нами найдено несколько новых и редких видов лилейных

для флоры республики. В их числе два вида лука — *Allium saxatile* Bieb., *Allium moschatum* L., *Colchicum umbrosum* Stev. — один из осеннецветущих безвременников флоры Кавказа и *Scilla rosenii* C. Koch.

Allium saxatile Bieb. — новый вид флоры Армении: Кироваканский р-он, г. Кировакан, левый берег р. Памбак, чай «Гыры», на южных известковых склонах, 26.IX.1945, Ахвердов А. А., Мирзоева Н. В., TBI; Иджеванский р-он, можжевельниковое редколесье в окр. с. Агдан, 30.X.1980, Аветисян В. Е., Манакян В. А., ERE 122881 (определение Погосьяна А. И.); Иджеванский р-он, при выезде из с. Куйбышев в сторону Иджевана, гора Абетакар, скалы, 6.IX.1983, Оганезова Г. Г., ERE 122729; Иджеванский р-он, гора Агтая, близ вершины, 7.IX.1983, Оганезова Г. Г., ERE 122732.

До недавнего времени этот вид в ERE не был представлен и для Армении был известен лишь по экземпляру из окр. Кировакана, хранящемуся в TBI. Помимо перечисленных, есть еще несколько гербарных листов с растениями, культивированными на участке армянской флоры и растительности Ин-та ботаники АН АрмССР, на этикетках которых указано, что луковички были привезены из Дилиджана. Таким образом, оказалось, что этот малоазиатско-кавказский вид (по Гроссгейму [2], его ареал на Кавказе охватывает Сев. Кавказ, Колхиду и центральное Закавказье—Сомхетию), до сих пор не приводившийся для флоры Армении, довольно широко распространен в Иджеванском флористическом р-оне [4]. Это вполне закономерно, так как Иджеванский флористический р-он почти полностью входит в Сомхетию в понимании Гроссгейма. Есть еще одно интересное обстоятельство — в работе Погосьяна [3] приводится хромосомное число для вида *Allium saxatile* с указанием, что изучены экземпляры, культивированные на участке армянской флоры и растительности Ин-та ботаники АН АрмССР, происходящие с г. Катлажух (сбор и определение Мирзоевой Н. В.). К сожалению, эти гербарные экземпляры не сохранились, и проверить достоверность идентификации невозможно.

Allium moschatum L. — редкий во флоре Армении вид: Севанский флористический р-он, distr. Nor-Bajazet. In montibus, prope pag. Subbotan, 8.VIII.1928, O. Zedelmeyer, T. Geidemann, TBI; Иджеванский р-он, окр. с. Тала, шибляк, 8.IX.1983, Оганезова Г. Г., ERE 122731; там же, Габриэлян Э. Ц., ERE 121192.

На Кавказе этот средиземноморский вид встречается в Сомхетии и Карабахе [2]. Наша находка подтверждает его произрастание в Армении, известное по сбору почти полувековой давности.

Colchicum umbrosum Stev. — редкий во флоре Армении вид, приуроченный к Иджеванскому флористическому р-ону: Armenia, Uç-Kilisa in pratis 4100', 12.IX.1925, А. Б. Шелковников, ERE 18199 (определение Гроссгейма); Ноемберянский р-он, в 5 км от с. Кохб, близ с. Козман, 29.V.1980, Оганезова Г. Г., ERE 117750, 117751, 117752; экземпляр выращен из луковички, собранных там же, 1.IX.1982, Оганезова Г. Г., ERE 118270; Ноемберянский р-он, лес по дороге к ур. Хлатому в окр. с. Козман, 8.IX.1983, Оганезова Г. Г., ERE 122728.

Первые собранные нами экземпляры этого вида были в плодах. Часть их была гербаризирована, часть высажена в грунт. В 1982 г. в сентябре одно из высаженных растений зацвело (ERE 118270). Осенью 1983 г. была предпринята специальная посадка для сбора цветущих растений, но удалось обнаружить лишь один уже отцветший экземпляр. Безвременник тенистый из посемберянской популяции растет небольшими удаленными друг от друга группами особей, обычно близ корней деревьев. На Кавказе этот вид, по Гроссгейму [2], встречается в Черкессии, Абхазии и юго-западной Грузии, указывается также Днябарский округ Иранской провинции (юго-западный Азербайджан), но с комментарием: «редко и сочинительно». Обнаружение новой популяции этого редкого в Армении малоазийско-кавказского вида представляет интерес, тем более, что со времени сбора Шелковникова прошло почти 60 лет. Найденная популяция интересна еще и тем, что в том же букво-грабовом лесу обитают такие редкие для Армении виды, как *Galanthus alpinus* D. Sosn. и *Aristolochia iberica* Fisch. et Mey.

Scilla rosenii C. Koch — один из редких видов флоры Армении. Впервые был обнаружен в Севанском флористическом р-оне в 1969 г.: Sevan lake Gegam mountain-ridge riv. Gegharkunikdjun 11.VI.1969 Габриэлян Э. Ц., ERE 109829. Новые местонахождения: Амасийский р-он, басс. оз. Арпалач, яйла над с. Гюлджа, заболоченная низина, 2300 м над ур. м., 8.VII.1978, Оганезова Г. Г., ERE 110487, 110488; там же, Файвуш Г. М., ERE 122888. Позже Файвуш, уже несколько лет занимающийся тщательным изучением флоры и растительности Ширака, обнаружил еще две популяции этого вида: Амасийский р-он, окр. с. Балыхли, заболоченный участок выше селения, 21.V.1979, Файвуш Г. М., ERE 122889; Гукасянский р-он, ущ. в окр. с. Саригюх, 23.V.1979, Файвуш Г. М., ERE 122890.

Согласно Гроссгейму [2], этот вид встречается только в западном и юго-западном Закавказье (Колхиде, Джавахетия). Исходя из этого, Габриэлян [1], обсуждая свою находку, писала, что, видимо, ареал этого вида в Армении носит узколокальный характер. Наша находка территориально ближе к основному ареалу прелески Розена на Кавказе. Ближайшее местонахождение этого вида из пограничных с Арменией р-онов Грузии — окрестности Ахалкалаки. Transcaucasia Armenia Ros-sica. In pascuo alpino montis Magni Abal (с. 70007, dist. г. Achalkalaki (18) mayi 1907, leg. Krynlitzky, det. Evr. Бордзиловский, LE. Таким образом, можно говорить о небольших иррадиациях этого малоазийского вида в Армению. Все обнаруженные популяции *Scilla rosenii* были приурочены к заболоченным или переувлажненным низинам субальпийского пояса.

Институт ботаники АН Армянской ССР

Получено 11.IV.1984 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Габриэлян Э. Ц., Гамбарян Н. П. Биолог. ж. Армения, 26, 56—60, 1973.
2. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, 2, Баку, 1910.
3. Погосян А. Н. Бот. журн., 68, 652—660, 1983.
4. Таташян А. Л. Флора Армении, 1, Ереван, 1954.