

Для Кавказа указывается впервые. На территории СССР этот вид был известен из Средней Азии, Ростовской области и Краснодарского края.

Институт зоологии АН Армянской ССР

Поступили 2.IV 1985 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Негроров О. П. ДАН АрмССР, 65, 4, 188—192, 1967.
2. Негроров О. П. (Negrov O. P.). *Dolichopodidae* in B. E. Lindner "Die Fliegen der palaearktischen Region", Stuttgart, t. 5, 29, 199, 257—302, 1972.
3. Штагелъберг А. А. Русск. энтомол. обзор., 20, 65—68, 1926.

«Биолог. ж. Армении», XXXVIII, № 8, 1985

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 596.765.8

РЕДКИЕ, МАЛОИЗВЕСТНЫЕ И НОВЫЕ ДЛЯ АРМЕНИИ ВИДЫ ЖУКОВ-ЗЛАТОК (COLEOPTERA, BUPRESTIDAE)

М. Ю. КАЛАШЯН

Ключевые слова: фауна Армении, жуки-златки.

При обработке коллекций Ин-та зоологии АН АрмССР, С. М. Яблокова-Хизоряна, ЗИН АН СССР и в ходе экспедиционных работ были получены некоторые фаунистические и экологические данные о фауне жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) Армении. Выполнение нашей работы было бы невозможным без помощи С. М. Яблокова-Хизоряна (Ин-т зоологии АН АрмССР), А. В. Алексеева (Орехово-Зуевский педагогический институт), М. Г. Волковича (ЗИН АН СССР), а также д-ра Касаба, предоставившего типовой материал из Венгерского национального музея естественной истории, и М. Л. Данилевского (ИЭМЭЖ АН СССР), предоставившего некоторые материалы.

Ниже приводятся сведения о некоторых редких, малоизвестных и новых для Армении и СССР видах жуков-златок.

Acmaeodera elbursi Obe nb. — Описан из Ирана (Эльбурс); найден нами в окрестностях п. Джрвеж близ Еревана, жуки встречаются на цветах *Centauraea* sp. с середины июня до середины июля, в начале июля довольно обильны.

A. stricta Ab. — Распространен в странах Передней Азии; в Армении найден там же, в окрестностях п. Джрвеж, С. М. Яблоковым-Хизоряном и нами. Жуки встречаются на соцветиях *Achillea* sp., в июне, всего собрано 5 экземпляров. Этот вид найден также М. Л. Данилевским в окрестностях с. Бузгов НахАССР.

A. obscura Reitt. — Описан из долины р. Аракс, распространен в странах Передней и Малой Азии, в Галыше и Западном Копетдаге. Из

Армении нам известен по 2♀♀, собранным на Горованских песках близ п. Веди в середине июня 1982 и 1983 гг.

Anthaxia holoptera Obenb. Описан с Конатдага, был включен в список армянской фауны Яблоковым-Хизоряном [2]; это указание осталось, очевидно, неизвестным Билы [4], недавно изучавшему этот вид. Экземпляры из Армении найдены в окр. с. Севкар (Иджеванский р-н), окр. с. Шурнух (Горисский р-н), окр. с. Чакатен (Кафанский р-н) и окр. с. Ньюади (Мегринский р-н); по сообщению С. М. Яблокова-Хизоряна, жуки собраны в лесу, отряхиванием с дикой груши. В коллекции ЗИН СССР имеется экземпляр из Кафанского р-на, с. Кизилдаш. Мы имели возможность сравнить экземпляры из Армении с экземплярами из типовой местности, просмотренными С. Билы, и убедиться в полной их идентичности.

A. aurulenta senicula Schrank. Восточный подвид средиземноморского вида, согласно Рихтеру [1], распространенный в юго-восточной Европе, на Украине, в Крыму и на Северном Кавказе; Билы [5] приводит эту форму также из Малой Азии. Для Закавказья оба эти автора указывают близкий вид—*A. intermedia* Obend. Изучение серий обоих видов показало, что внешние признаки часто оказываются недостаточными для идентификации этих двух форм, в то же время хорошо различающихся по строению лениса и овискапта. Выяснилось, что все экземпляры из АрмССР и НахАССР относятся к *A. aurulenta senicula*; ни одного экземпляра *A. intermedia* из АрмССР и Нах. АССР нам обнаружить не удалось. В то же время обнаружение его в северо-восточных р-нах Армении не исключено, так как он встречается в Грузии и Азербайджане.

Melanophila cuspidata Klug — Древнесредиземноморский вид, указанный из Армении Рихтером [1]. Единственный известный нам из Армении экземпляр собран С. М. Яблоковым-Хизоряном в Ереване.

Sphenoptera tschitscherini Jak. — Описан из «Закаспия (с. Михайловская)». В Армении найден нами на глинистых склонах выше Горованских песков близ п. Веди. В конце мая собраны остатки жуков и многочисленные личинки из корней солонки *Salsola ericoides* Bleb., изредка вместе с личинками усача *Apatophis caspica* Sem.

S. raica F. — Широко распространен по всему Средиземноморью. Найден в НахАССР С. М. Яблоковым-Хизоряном (в окр. с. Гилидара) и М. Л. Данилевским (окр. с. Бузгов).

Meliboeus graminis Panz. — Средиземноморский вид, приведен у Якобсона [3] из Талыша. В Армении найден нами в окр. с. Гохт Абовянского р-на и с. Бюракан Аштаракского р-на. Развивается на полипах *Artemisia* sp.

Agrius coerulescens Ratz. — Широко распространен в Европе. В Армении найден впервые С. М. Яблоковым-Хизоряном (окр. с. Тала Иджеванского р-на, окр. с. Арзакан Разданского р-на) и нами (окр. с. Бюракан).

A. transverseculcatus Reitt. — Описан из Тбилиси. Указан из долины р. Аракс Обенбергером [6]. Найден в окр. п. Мегри. Мы обнаружили этот вид в ряде пунктов Араратской равнины: Горованские пески; п. Джрвеж; окр. с. Зовуни Абовянского р-на. Развивается, по нашим наблюдениям, на *Kochia prostrata* (L.) Schrad.

Trachys splendidula Reitt. — Описан по двум экземплярам из долины р. Аракс. Насколько нам известно, после описания найдено всего 2 экземпляра этого вида: 1 самка в окр. п. Джрвеж — С. М. Яблоковым-Хизорьяном и 1 самка в Хосровском заповеднике — нами. Оба экземпляра сравнены с типами.

Ереванский государственный университет,
кафедра зоологии

Поступило 29.IV 1985 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рихтер А. А. Фауна СССР. 13, 2. М., 1949.
2. Яблоков-Хизорьян С. М. Опыт восстановления генезиса фауны жесткокрылых Армении. Ереван, 1961.
3. Якобсон Г. Жуки России и Западной Европы. 10, СПб., 1912.
4. Bily S. Acta ent. bohemoslov., 77, 400—407, 1980.
5. Bily S. Acta ent. bohemoslov., 79, 56—60, 1982.
6. Obenberger J. Buprestidae 5. In: W. Junk, S. Schenckling Coleopterorum Catalogus 152, 935—1246, 1936.

«Биолог. ж. Армении», XXXVIII, № 8, 1985

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 595.782

НОВЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ АРМЕНИИ ВИДЫ ТЛЕЙ

Г. А. АРУТЮНЯН

Ключевые слова: фауна Армении, тля.

Тли по своей биологии и вредоносности представляют весьма важный компонент энтомофауны республики.

В результате обследования вредной энтомофауны лесных и декоративных деревьев и кустарников нами выявлено 98 видов тлей, из которых 45 видов не были отмечены ранее для Армении. Материал по ряду видов уже опубликован [1—2], данные по некоторым другим приводятся ниже.

Prociphilus fraxini F. (*nidificus* Löw.) — Тли покрыты белым пушком. Сосут на концах побегов, на черешках и нижней поверхности листьев ясени (*Fraxinus excelsior*). От их деятельности черешки изгибаются, а листочки сложного листа сбиваются в комки.