Арегунийский хребет, 24.VI.1970 (кр., бескр.); Хосровский заповедник, Мангюк, 11.VI.1975 (бескр., кр.).

Chaetosiphon tetrarhodus Walk.— Тли зеленого цвета живут на верхушках побегов шиповника (Rosa canina). По литературным данным [6], встречаются на нижней поверхности листьев.

Bicaudella astragalensis Rus.—Живут рассеянно на листьях астрагала (Astragalus aureus). Собраны в июне (12.VI.1980) в окр. с. Личк Мегринского р-на с растений, разбросанных по сухим каменистым склонам. Русанова [7] этот вид собирала в Нагорном Карабахе с листьев астрагала (Astragalus xiphidium).

Таким образом, в результате сборов, проведенных в декоративных насаждениях и лесах Армении, приводятся еще 12 видов тлей, впервые отмечаемых для фауны республики.

Институт ботаники АН Армянской ССР

Поступило 18.X 1984 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Арутюнян Г. А.* Биолог. ж. Армении, *20*, 3, 1967.
2. *Арутюнян Г. А.* Бюлл. Бот. сада АН АрмССР, 22, 1970.
3. Вредители леса. Справочник, 11, 1955.
4. *Мордвилко А. К.* Кормовые растения тлей СССР и сопредельных стран. Л., 1929.
5. *Невский В. П.* Тли Средней Азии. Ташкент, 1929.
6. Определитель насекомых европейской части СССР, 1, 1964.
7. *Русанова В. И.* Изв. Азерб. фил. АН СССР, 4, 1943.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 598.31

О НАХОДКАХ СУЛТАНКИ PORPHYRIO PORPHYRIO SEISTANICUS ZAR. В АРМЯНСКОЙ ССР

М. С. АДАМЯН

Ключевые слова: султанка, миграция.

В пределах Советского Союза султанки обитают преимущественно в Кызл-Агачском заповеднике Азербайджанской ССР и Астраханской области у дельты Волги. Основные гнездовья расположены в Кура-Араксинской низменности, где птица держится в основном оседло. По свидетельству Спангенберга*, султанка гнездится также в устьях рек Куры и Аракса, где является преимущественно оседлой птицей. Птицы северных популяций совершают обычно сезонные перемещения, миграции и перелеты.

* Спангенберг Е. П. Птицы СССР, т. 4, М., 1952 г.

На территории Армении султанка была отмечена неоднократно начиная с 1967 года нами, сотрудниками Севанской гидробиологической станции АН АрмССР, охотниками и любителями-орнитологами.

Впервые в Армении в окрестностях с. Личк Мартунинского района примерно в 80 км от г. Севана в камышовых зарослях прибрежных болот оз. Севан 15 сентября 1967 г. был добыт самец султанки, чучело которого хранится в музее Института зоологии АН АрмССР.

Рис. 1 Султанка в долине р. Аракса.

В октябре 1982 г. султанка была добыта на западном берегу озера Севан в местах с водноболотной растительностью в окрестностях г. Севана недалеко от пристани. Чучело этого экземпляра хранится в музее Национального парка «Севан». 19 декабря 1982 г. неизвестным охотни-

ком в районе оз. Айгерлич среди густого тростника была добыта одна самка султанки, которая хранится в Музее природы Армении. Еще одна встреча с султанкой была зарегистрирована в окрестностях оз. Айгерлич в июне 1983 г. любителем-орнитологом С. Петросяном. Места последних двух встреч с султанкой находятся примерно на 200 км южнее от места ее первой встречи.

22 августа 1983 г. в районе г. Чаренцавана вдоль реки Раздан в 35—40 км южнее г. Севан был добыт еще один самец султанки, который также хранится в зоологическом музее Института зоологии АН АрмССР.

Во время очередной экспедиции в тростниковых зарослях Армашского карпового хозяйства сотрудником Института зоологии АН Арм. ССР Х. Степаняном 23 сентября 1983 г. была добыта еще одна самка султанки, которая питалась водноболотной растительностью. 12 июня 1984 г. в разгар гнездового сезона Г. В. Казаряном в момент питания в зарослях тростника была сфотографирована султанка (рис. 1). 11 сентября того же года в Армашском карповом хозяйстве местным сторожем была зарегистрирована пара кормящихся султанок.

Приведенные сведения о добыче и встречах с султанкой на территории Армянской ССР свидетельствуют о стабильной миграции и расселении ее в западном и юго-западном направлениях от основных гнездовий вида. Основываясь на фактическом материале, мы предполагаем, что султанка является гнездящейся птицей нашей республики.

Рис. 2. Карта путей миграции и расселения султанки.

Хотя проникновение султанки на территорию Армянской ССР было зарегистрировано в направлении с востока республики к юго-западу, наиболее вероятным путем движения мигрирующих птиц все же необходимо признать русла рек Куры и Аракса, т. е. с юго-востока на северо-запад (рис. 2). Биоэкологические условия прибрежных территорий этих рек отвечают минимальным требованиям султанки.

Таблица

Промеры добытых султанок, мм

Масса, г	Длина крыла	Длина хвоста	Длина цевки	Размер крыльев	Длина клюва	Высота клюва	Длина тела	Дата добычи	Место добычи
780	263	96	85	780	44	27.8	310	15 IX	Личк
—	270	95	97	—	47	26.0	—	10 XII	Севан
950	270	84	95	—	44	25.0	—	19 XII	Акналич
—	273	105	90	—	50	—	340	23 IX	Армаш

Таким образом, в настоящее время процесс расселения и миграции султанки в указанном направлении продолжается, что, вероятно, будет способствовать формированию способной к воспроизводству популяции на вновь освоенной территории.

Экологическая ситуация водноболотных биотопов долины р. Аракс, подходящие климатические условия и обильный корм, по всей вероятности, являются основными факторами привлечения этой ценной птицы и расселения ее на территории нашей республики.

Одной из причин расселения является также перенаселение вида на родине.

Внешнеморфологические признаки добытых и визуально зарегистрированных экземпляров султанок соответствуют описанным в литературе.

Институт зоологии АН Армянской ССР

Поступило 5.XI 1984 г.

«Биолог. ж. Армении», XXXVIII, № 8, 1985

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 597.639.215

КАРАСЬ В ОЗЕРЕ СЕВАН

Р. О. ОГАНЕСЯН, А. И. СМОЛЕЙ

Ключевые слова: оз. Севан, карась, рыбное сообщество.

Озеро Севан характеризуется уникальной ихтиофауной с преобладанием рыб-эндемиков: севанская форель, севанская храмуля, севанский усач. И только сиг является гибридной формой сига-ладоги и чудского сига, завезенных в озеро в 20-х годах из северных водоемов.

Летом 1983 года в р. Личк, впадающей в оз. Севан, был пойман карась, никогда ранее не встречавшийся в водоеме.

Как известно*, карась подвержен значительной изменчивости в зависимости от условий существования. В водоемах с неблагоприят-

* Никольский Г. В. Частная ихтиология. М., 1971.