

крупных популяций, как это можно наблюдать у многих видов других семейств (за исключением некоторых видов из рода *Dactylorhiza*). Принимая во внимание это обстоятельство, а также сложную биологию размножения орхидных, хотелось бы особо подчеркнуть необходимость охраны местобитаний этих редких и высокодекоративных растений нашей флоры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Габриэлян Э. Ц., Гусян К. Е. Биолог. ж. Армения, 33, 5, 535—537, 1980.
2. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, 2 изд., 2, Баку, 1940.
3. Гроссгейм А. А. Определитель растений Кавказа. М., 1949.
4. Елснерский А. Г. Ботанические материалы, 19, 554—557, Л., 1959.
5. Карапетян Р. А. Изв. АН АрмССР, сер. биол. наук, 12, 35—38, 1959.
6. Торосян Г. К. Биолог. ж. Армения, 36, 11, 1087—1089, 1983.
7. Торосян Г. К. Бот. журн. 5, 71, 1986.
8. Файвуш Г. М. Уч. зап. ЕГУ, 2, 117—123, 1981.
9. Renz J. In: Flora Iranica, 126, 1978.
10. Renz J., Tanenheilm G. In: Flora of Turkey, 6, 1984.
11. Soo R., Moore D. M., Webb D. A. In: Flora of Europaea, 5, 1980.

Поступило 22.X 1985 г.

Биолог. ж. Армения, т. 39, № 7, с. 610, 1986

УДК 582.736

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ПО РОДУ *ASTRAGALUS* L. ИЗ АРМЯНСКОЙ ССР

И. Г. АРЕВШАГЯН

Институт ботаники АН Армянской ССР, Ереван

Ключевые слова: флора Армении, род *Astragalus*

При обработке гербарного материала по роду *Astragalus* L. выявлены новый вид флоры Армении *A. chalilovii* Grossh. и новые местонахождения редких видов, дополняющие данные «Флоры Армении» [3] и «Флоры Еревана» [4] об этом роде. Сообщаем также об интересных находках, которые оказались среди коллекции А. А. Ахвердова и Н. В. Мирзоевой. Эти сборы были определены знатоком рода *Astragalus* А. А. Ахвердовым, однако не отражены ни во «Флоре Армении», ни во «Флоре Еревана», о них нет и других специальных публикаций.

A. chalilovii Grossh. — Новый вид флоры Армении. Редкий вид астрагала из секции *Trachycercis* Bunge, описанный с г. Карагут Нахичеванской АССР и известный до сих пор только из *locus classicus*. Собиран в Загсезурском флористическом районе: Сиспанский р-н, близ Сиспана, северо-восточный склон, 20.6.1968. Э. Ф. Шур-Багдасарян, определил А. А. Ахвердов, ERE № 123274; там же, 23.6.1968, Долуханиян, определил А. А. Ахвердов, ERE №№ 123275, 123276. Находка этого вида подтвердила предположение Н. П. Манденовой о возможности нахождения его в Армении [3].

A. karakuschensis Gontsch.—Новый вид Ереванского флористического района. Эндемик Южного Закавказья, где был известен лишь из Нахичеванской АССР и Дарелегисского флористического района Арм. ССР. Собиран: Арташатский р-н, к северо-западу от развалин с. Чатмы, 23.5.1946, Э. Габриэлян, определил А. А. Ахвердов, ERE № 123853.

A. fabaceus Bieb.—Новый вид Дарелегисского и Мегринского флористических районов. Его ареал охватывает Восточное и Южное Закавказье, Восточную Турцию и Северо-Западный Иран. В Армении собиранся лишь в Ереванском флористическом районе. Новые местонахождения: Ехегнадзорский (Дарелегисский) р-н, между Ехегнадзором и Малишкой, сухие склоны, покрытые растительностью типа томил-ляр, 8.5.1935, А. Л. Тахтаджян, ERE № 35041; Мегринский р-н, между селениями Шванидзор и Чювади, каменистые склоны, 1000 м над ур. моря, 2.4.1971, В. А. Манакин, ERE № 123864.

A. angustiflorus C. Koch. — Новый вид для Ширакского флористического района. Довольно редкий астрагал, распространенный в Анатолии и Закавказье, где собиранся в Карабахе, Нах. АССР и в Ереванском флористическом районе АрмССР. Новое местонахождение: Анийский р-н, от станции Ани вдоль железной дороги, 8.6.1956, А. А. Ахвердов, Н. В. Мирзоева, ERE № 123626, 123748.

A. alpinus L.—Новый вид для Арагацкого флористического района. Голарктический элемент с довольно широким ареалом, редкий вид флоры Армении. В пределах республики до сих пор собиранся дважды—в высокогорьях Зангезурского и Мегринского флористических районов. Новое местонахождение: юго-восточный макросклон северной вершины г. Арагац, на пологом мезофильном мелкощебнистом макросклоне, 3700—3800 м над ур. моря, 19.8.1961, А. А. Ахвердов, ERE № 123281, 123282.

A. arguricus Bunge.—Новый вид для флоры Еревана. Довольно редкий вид, произрастающий в Северо-Восточной Анатолии и на Кавказе, где собиранся в Карабахе, Нах. АССР и Дарелегисском флористическом районе АрмССР. Новые местонахождения: Араратский р-н, окр. с. Дайназ, на холодных мезофильных скалистых склонах, 1700—1800 м, А. А. Ахвердов, 7.7.1947, ERE № 123526, 123580; там же, 7.6.1949, он же, ERE № 123525, 123528; Ведиский р-н; южный макросклон Урцского хребта, на увлажненных скалах, 6.6.1948, А. А. Ахвердов, Н. В. Мирзоева, ERE № 123527, 123840; там же, северный макросклон, на щебнистых местах, 1500—1600 м, 16.6.1959, А. А. Ахвердов, Н. Г. Гохтунц, ERE № 123524, 123579, 123581, 123582, 123834; там же, окр. с. Зинджерлу, 1800—2000 м, 23.5.1960, А. А. Ахвердов, Н. В. Мирзоева, ERE № 123523; Восточная часть Урцского хребта, ур. Кармир кар, 24.5.1960, они же, ERE № 123578.

A. camploceras Bunge.—Новый вид для Дарелегисского флористического района. Его ареал охватывает Малую и Среднюю Азию, Северный Иран и Кавказ, откуда был известен лишь из Восточного Закавказья, Нах. АССР и Ереванского флористического района АрмССР. На территории республики данный сбор является вторым: АрмССР, окр. Ехегнадзора, на глинистых склонах, 6.6.1977, А. Тахтаджян, Э. Габриэлян, ERE № 120404.

A. oxygiottis Stev. ex DC.—Новый вид для Дарелегисского флористического района. В его ареал входят нижние районы Волги, Крым, Сирия, Северный и Центральный Иран, Малая и Средняя Азия и Кавказ, где собирался в Восточном и Южном Закавказье. В АрмССР был известен из Ереванского флористического района. Новые местонахождения: Ехегнадзорский р-н, с. Арени, справа от дороги на с. Хачни, 31.5.1977, Э. Габриэлян, К. Таманян, ERE № 123865.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа. 5, Л., 1952.
2. Флора Азербайджана. 5, Баку, 1954.
3. Флора Армении. 4, Ереван, 1962.
4. Флора Еревана. Л., 1972.
5. Flora of Turkey., 3, Edinburgh, 1970.

Поступило 27.XI 1985

Бiolог. ж. Армении, т. 39, № 7, с. 612—614, 1986

УДК 502.72:581.9(479.25)

РЕДКИЕ ДЛЯ АРМЕНИИ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ИЗ ХОСРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

М. Г. ГРИГОРЯН

Институт ботаники АН Армянской ССР, Ереван

Ключевые слова: Хосровский заповедник, флористические находки.

В процессе последовательного и систематического сбора и определения гербарных материалов Хосровского заповедника нами обнаружены новые для Ереванского и Гегамского флористических районов и редкие для Армении, Кавказа и СССР виды растений, перечень которых приводится ниже. Гербарные образцы этих видов хранятся в гербариях БИН АН АрмССР (ERE) и Хосровского заповедника (KSRV) под соответствующими номерами.

Centaurea ruthenica Lam.—Очень редкий для флоры Армении и новый для Ереванского флористического района вид (третья находка). Географический тип—панноно-сарматский. В заповеднике впервые собран нами: Араратский р-н, на северном макросклоне Урцского хребта, горная степь, 1850 м над ур. м., 19.8.1984, (ERE № 126651). Согласно данным «Флоры СССР» [7], в пределах Кавказа этот вид распространен в Предкавказье и Южном Закавказье. В Армении известен только из Ширакского флористического района (сс. Джаджур, Баграван, Саракан).

Colchicum zangezorum Grossh.—Новый для флоры Араратской котловины и редкий для Армении, Кавказа и СССР вид. Географический тип—атропатенский. Этот эндемичный для Армении вид на территории Советского Союза приводился только для Мегри, где произрастает на сухих холмах в долине р. Аракс [3]. Собран нами в Араратском р-не: северная окраина пос. Веди, гора Гявур кала, северный склон, 940 м над ур. м., 16.3.1982, (ERE № 126629); там же, западная оконеч-