

A. oxygiottis Stev. ex DC.—Новый вид для Дарелегисского флористического района. В его ареал входят нижние районы Волги, Крым, Сирия, Северный и Центральный Иран, Малая и Средняя Азия и Кавказ, где собирался в Восточном и Южном Закавказье. В АрмССР был известен из Ереванского флористического района. Новые местонахождения: Ехегнадзорский р-н, с. Арени, справа от дороги на с. Хачни, 31.5.1977, Э. Габриэлян, К. Таманян, ERE № 123865.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа. 5, Л., 1952.
2. Флора Азербайджана. 5, Баку, 1954.
3. Флора Армении. 4, Ереван, 1962.
4. Флора Еревана. Л., 1972.
5. Flora of Turkey., 3, Edinburgh, 1970.

Поступило 27.XI 1985

Бiolог. ж. Армении, т. 39, № 7, с. 612—614, 1986

УДК 502.72:581.9(479.25)

РЕДКИЕ ДЛЯ АРМЕНИИ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ИЗ ХОСРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

М. Г. ГРИГОРЯН

Институт ботаники АН Армянской ССР, Ереван

Ключевые слова: Хосровский заповедник, флористические находки.

В процессе последовательного и систематического сбора и определения гербарных материалов Хосровского заповедника нами обнаружены новые для Ереванского и Гегамского флористических районов и редкие для Армении, Кавказа и СССР виды растений, перечень которых приводится ниже. Гербарные образцы этих видов хранятся в гербариях БИН АН АрмССР (ERE) и Хосровского заповедника (KSRV) под соответствующими номерами.

Centaurea ruthenica Lam.—Очень редкий для флоры Армении и новый для Ереванского флористического района вид (третья находка). Географический тип—панноно-сарматский. В заповеднике впервые собран нами: Араратский р-н, на северном макросклоне Урцского хребта, горная степь, 1850 м над ур. м., 19.8.1984, (ERE № 126651). Согласно данным «Флоры СССР» [7], в пределах Кавказа этот вид распространен в Предкавказье и Южном Закавказье. В Армении известен только из Ширакского флористического района (сс. Джаджур, Баграван, Саракан).

Colchicum zangezorum Grossh.—Новый для флоры Араратской котловины и редкий для Армении, Кавказа и СССР вид. Географический тип—атропатенский. Этот эндемичный для Армении вид на территории Советского Союза приводился только для Мегри, где произрастает на сухих холмах в долине р. Аракс [3]. Собран нами в Араратском р-не: северная окраина пос. Веди, гора Гявур кала, северный склон, 940 м над ур. м., 16.3.1982, (ERE № 126629); там же, западная оконеч-

ность Урцского хребта, окрестности с. Горован, полынно-трагакантинковая ассоциация, северный склон, 950 м над ур. м., 22.3.1982, (ERE № 126630, 126857).

Galium pedemontanum (Bell.) All. (= *Cruciata pedemontana* (Bell.) Ehrend. — Новый для Гегамского флористического района вид и вторая находка этого редчайшего вида в Армении. Географический тип — древнесредиземноморский. Приводится для Армении по единственному экземпляру, собранному в Зангезуре (Горис) А. Ломакимым в 1895 году [4] и хранящемуся в БИН АН Груз. ССР (ТБИ). Обнаружен в Араратском р-не, в Хосровском заповеднике, в окрестностях развалин с. Хосров, на поляне в дубовом лесу по левому борту р. Хосров, на высоте 1630 м над ур. м., 5.7.1981, (ERE № 126632). Ближайшее известное местонахождение Нах.АССР (Шахбуз). Новое местонахождение этого редкого вида расширяет его ареал в Южном Закавказье.

Androsace elongata L. — Новый для Гегамского флористического района и редкий для Армении вид (четвертая находка). Географический тип — голарктический. Во «Флоре Армении» приводится для Ереванского (Бекан, Лаговский) и Зангезурского (с. Мусалам) флористических районов [6]. Позднее найден Э. Ц. Габриэлян в окрестностях Цахкадзора [1]. Новое местонахождение: Араратский р-н, ущ. р. Хосров, окрестности развалин с. Хосров, сухие места в аридном редколесье по правому берегу реки, 1600 м над ур. м., 10.6.1962, (ERE № 126660).

Lactuca inculata Ledeb. — Редкий для флоры Кавказа и Армении и новый для Ереванского флористического района вид. Географический тип — прано-туранский. Впервые был собран для флоры Еревана Э. Габриэлян из Арташатского р-на, в окр. с. Кахирашен, г. Кармир-сар, 7.6.1959 (ERE 87036). Нами собран в Араратском р-не: северная окраина пос. Веди, южный склон г. Гявур кала, слегка засоленные и гипсоносные места, высота 1015 м над ур. м., 7.6.1983, ERE 126651; там же, подножье южного макросклона Урцского хребта, окрестности обогатительной фабрики, сухие гипсоносные места, 900–1100 м над ур. м., 31.5.1983 (ERE 126652). Определены Э. А. Назаровой. Этот редчайший вид на Кавказе известен также из Нах.АССР [3]. Ранее в Армении собирался только из Севанского флористического р-на (ERE 63167), р-на Камо, с. Норадуз. Новое местонахождение расширяет его ареал и, являясь промежуточным пунктом, связывает приводимое ранее место произрастания с новым.

Schoenus nigricans L. — Очень редкий для флоры Армении вид. Средиземноморско-атлантический элемент. Собран нами, определен А. М. Барсегяном: Арташатский р-н, ущ. р. Азат, подножье г. Еранос, на влажных местах по левому берегу реки, 1100 м над ур. м., 15.7.1977 (ERE 126631). Единственное местонахождение в Хосровском заповеднике. В Арм.ССР известен из Араратского р-на (Веди, Арарат), а также из бассейна оз. Севан (с. Дзорагюх).

Salix wilhelmsiana Bleb. — Новый для Гегамского флористического района и редкий для флоры Армении вид. Географический тип — прано-туранский. Ареал вида охватывает Кавказ (Дагестан, Централь-

ное и Южное Закавказье), Восточную Турцию, Западный Иран, Афганистан, Среднюю и Центральную Азию. В Армении известны из Ширакского (Артени), Иджеванского (Алинджа), Ереванского (Зовашен) [5] и Дарсегинского (Заритап) [2] флористических районов. В пределах заповедника собраны нами в Араратском р-не, в ущ. р. Хосров, в окрестностях развалин с. Агаси-беглу, на речных наносах, 1350 м над ур. м., 25.8.1972 (ERE 126640, 126861).

ЛИТЕРАТУРА

1. Габриэлян Э. Ц., Таманян К. Г. Биолог. ж. Армении, 35, 3, 227—229, 1982.
2. Григорян А. А., Вирданян Ж. А. Биолог. ж. Армении, 33, 9, 1007—1008, 1980.
3. Гроссгейм А. А. Определитель растений Кавказа. М., 1949.
4. Мандекова И. П. Флора Армении, 7, Ереван, 1980.
5. Скворцов А. К. Флора Армении, 5, Ереван, 1966.
6. Смольяникова Л. А. Флора Армении, 6, Ереван, 1973.
7. Цвелев Н. Н. Флора СССР, 28, М.—Л., 1963.

Биолог. ж. Армении, т. 39, № 7, с. 614—616, 1986

УДК 581.9+501.7

О ФЛОРЕ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДОЛИНЫ РЕКИ ГРИДЗОР

В. Е. ВОСКАНЯН, М. Г. АРУТЮНЯН, А. А. УНАНЯН

Отдел охраны природы Армении ВНИИ охраны природы и заповедного дела
Госагропрома СССР, Ереван

Ключевые слова: флора Армении, редкие виды и фитоценозы.

Долина реки Гридзор является одним из интереснейших элементов природно-ландшафтного комплекса бассейна озера Севан. Находится на северо-восточном макросклоне Гегамского нагорья на высоте 2300—3200 м над ур. моря и входит в территорию административного района им. Камо. Низовье реки (в пределах высот 2400—2500 м) относительно узкое, склоны крутые, каменистые, местами представляют собой отвесные скалы. Верховье реки представляет собой ледниково-эрозионную глубокую долину, где хорошо сохранились следы последнего оледенения.

Долина характеризуется весьма интересными природными условиями, богатой разнообразной флорой и растительностью и давно привлекает внимание исследователей [1—3]. По нашим предварительным данным, флора сосудистых растений составляет 131 вид, относящийся к 99 родам и 28 семействам. Наиболее богато представлены семейства сложноцветных—21 вид, розоцветных—11, злаков и норичниковых—по 10 видов и др. Основными биоморфами являются травы—128 видов, в том числе 12 однолетников и двулетников.

Разнообразие типов растительности обусловлено сложностью рельефа, разностью высот территории долины и другими факторами. Хорошо представлены главным образом субальпийская и альпийская растительность. При этом в низовьях растительность ущелья значительно от-