7. Кононенко В. Я. Эндокринология сегодня, Киев, 1982.
8. Киприян Т. К. ДАН АрмССР, 57, 53, 1973.
9. Киприян Т. К. Нейрофизиология, 6, 3, 260, 1974.
10. Киприян Т. К. III съезд Арм. физиол. об-ва, Ереван, 1979.
11. Сергеев П. В., Пухальская Т. Г., Большов В. Н., Черных Н. С. Фармакол. и токсикол., 45, 6, 101, 1982.
12. Avanzino G. L., Celaseo G., Cogo C. E., Ermillo R., Ruggeri P. Neurosci. Lett., 10, 52, 1982.
13. Avanzino G. L., Celaseo G., Cogo C. E., Ermillo R., Ruggeri P. Neurosci. Lett., 38, 1, 45, 1983.
14. Chung S. H., Lettwin J. Y., Raymonds S. A. J. Physiol., 239, 2, 63, 1974.
15. Duncan G. E., Stumpf W. E. Brain Res., 307, 1-2, 321, 1984.
16. Feldman S., Sarne V. Brain Res., 23, 67, 1970.
17. Feldman S., Dafny N. Exptl. neurol., 27, 375, 1970.
18. Huxley A. F., Pascoe G. E. J. Physiol., 167, 2, 40P, 1963.
19. Mc Ewen B. C. Molec. cell. Endocr., 18, 151, 1980.
20. Munck A., Guyre P. M., Helbrook N. J. Endocr. Rev., 5, 1, 25, 1984.
21. Nelson D. H., Murray D. K., Wennhold A. R. Endocrinol., Neuroendocrinol., Neuropeptid. Ptl. Proc. 28th. Int. Congr. Physiol. Sci. Budapest 13-19 July 1980. Budapest; Oxford, 1981.
22. Slusher M. A., Hyde I. E., Zanfer M. J. Neurophysiol., 29, 157, 1966.

Поступило 5.1 1986 г.

Биолог. ж. Армении, т. 40, № 2, с. 128-132, 1987

УДК 615.225.577.17

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ЭФФЕКТ ДИБУТИРИЛ-цАМФ В ОТНОШЕНИИ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА И НА АКТИВНОСТЬ ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ цАМФ

Т. О. АСАТРЯН, С. С. АБРАМЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Миджояна АН Армянской ССР,
Ереван, Институт биохимии АН Армянской ССР, Ереван

Аннотация — Установлено, что дибутирил-цАМФ, вызывающий увеличение коронарного кровотока в контрольных опытах, не проявляет своего действия на фоне предварительного раздражения блуждающего нерва на шее. Стимуляция нерва приводит к повышению активности ФДЭ цАМФ, чем в значительной степени и можно объяснить отсутствие указанного эффекта.

Անոտացիա — Երևում է, որ դիբուտիրիլի ցիկլային ԱՄՖ-ը, որը ստուգողական փորձերում առաջացնում է պսակային արյան հոսքի ավելացում, չի ցուցաբերում իր ազդեցությունը պարանոթի շրջանում թափառող ներքի նախնական զրգրման ֆոնի վրա:

Ներքի խթանումը բերում է ցիկլային ԱՄՖ-ի ՖԴԷ-ի ակտիվության բարձրացման, ինչով և կարելի է բացատրել վերը նշված էֆեկտի բացակայությունը:

Abstract — It has been established that dibutyryl-cAMP, which causes an increase in the coronary blood flow in control experiments, does not display its action following a preliminary cervical vagal stimulation. The nerve stimulation brings about an increase in the activity of cyclic AMP-dependent phosphodiesterase, which, to a considerable extent, may be explained by the absence of the aforementioned effect.

Ключевые слова: блуждающий нерв, коронарный кровоток, фосфодиэстераза цАМФ.

В настоящее время принято положение о том, что большинство эф- фекторов (гормоны, нейромедиаторы, простагландины и др.) осуществ- ляют регуляцию функций клеток путем вовлечения в эффект внутри- клеточных посредников—универсальных и уникальных регуляторов ме- таболизма, пролиферации и дифференцировки клеток—циклических нуклеотидов, в частности 3',5'-аденозин- и гуанозинмонофосфата. Регу- ляция уровня циклических нуклеотидов осуществляется посредством специфических ферментов, катализирующих их синтез (аденилат- и гу- анилатциклазы) и гидролиз (фосфодиэстеразы цАМФ и цГМФ [4, 7]).

В экспериментах на собаках было показано [10], что внутрикоро- нарное введение цАМФ и его моно- и дибутирилпроизводных приводит к увеличению коронарного кровотока. Авторы пришли к заключению, что цАМФ может быть ответственным за расширение коронарных сосудов, что в дальнейшем было подтверждено во многих работах и нашло свое отражение в ряде обзоров [2, 11, 12].

Ранее нами было установлено [1], что раздражение правого блуж- дающего нерва на шее (его сердечных ветвей) приводит к изменению реактивности коронарных сосудов. Было высказано предположение, что этот процесс осуществляется на клеточном уровне посредством цик- лических нуклеотидов. В этой связи представлялось интересным изу- чение влияния стимуляции нерва на эффект дибутирил-цАМФ в отно- шении коронарного кровотока, а также на активность цАМФ-зависи- мых ферментов, в частности, фосфодиэстеразы цАМФ (ФДЭ цАМФ). Известно, что дибутирил-цАМФ, легко проникая через клеточную мем- брану, вызывает накопление в клетке цАМФ [14, 15], чем и обусловле- ны его эффекты.

Материал и методика. Эксперименты проводили в лаборатории фармакологии ко- ронарной недостаточности ИТОХ АН АрмССР и в лаборатории гормонов Института биохимии АН АрмССР в октябре—декабре 1985 г.

Определяли объемную скорость коронарного кровотока у наркотизированных уре- таном с хлоралозой кошек (1 г уретана, 60 мг хлоралозы на 1 кг массы животного) по модифицированному методу Кавершиной [5], в основу которого положено измере- ние объема крови, оттекающей из коронарного синуса за единицу времени (10 сек).

Раздражение периферических отрезков правого блуждающего нерва на шее произ- водили прямоугольными импульсами напряжением 5—7 В, частотой 30 Гц, длитель- ностью прохождения импульсов 2 мсек 2 раза по 20 сек с интервалом в 1 мин от сти- мулятора ИСЭ-01. Дибутирил-цАМФ фирмы ВДИ (Англия) вводили в левую ярем- ную вену животных.

Определение активности ФДЭ цАМФ проводили по методу Пёха и Куковецса [13] в модификации Гурвич [3] в гомогенатах желудочков сердца наркотизированных кошек. В эксперимент взяли 4 группы животных: контрольные кошки (без каких-либо вмешательств), животные с ваготомией, с раздражением правого вагуса на шее и по- сле применения ацетилхолина.

Активность фермента определяли по количеству гидролизованного субстрата (ПН-цАМФ) и процессе его инкубации с ферментом, источником которого служил су- пернатант гомогената сердца. Метод предусматривает разделение продуктов гидроли- за с помощью восходящей тонкослойной хроматографии на пластинках «Силуфол UV-254». О гидролизе ПН-цАМФ, использованного в качестве маркера, судили по на- делению его радиоактивности.

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что внутривенное введение дибутирил-цАМФ в дозе 10 мкг/кг приводит к увеличению объемной скорости коронарного кровотока на $82.7 \pm 2.1\%$ ($70.9 \div 89.5$) (средние данные 5 опытов). Эффект появляется с 5—10 мин, нарастает до максимальной величины к 50—60 мин и держится на этом уровне в течение 2 и более часов.

При введении дибутирил-цАМФ в той же дозе через 20 мин после стимуляции вагуса на шее увеличение коронарного кровотока в течение 2 и более часов не наблюдается (данные 6 опытов) (рис.).

Результаты экспериментов по определению активности ФДЭ цАМФ сердца наркотизированных кошек в различных условиях опыта приведены в таблице.

Активность ФДЭ цАМФ в желудочках сердца наркотизированных кошек.

Условия опыта	Правый желудочек	Левый желудочек
Контроль n=3	43.1 ± 1.7	41.9 ± 2.7
Ваготомия n=4	39.1 ± 2.2 p>0.05	40.5 ± 7.5 p>0.5
Раздражение вагуса на шее n=5	60.8 ± 5.0 p<0.01	55.1 ± 4.2 p<0.05
Внутривенное введение ацетилхолина 20 мкг/кг n=5	59.9 ± 4.3 p<0.002	51.9 ± 5.7 p>0.05

n—количество животных, взятых в эксперимент, p—сравнение с контролем (с использованием критерия Стьюдента).

Как видно из таблицы, электрическая стимуляция правого блуждающего нерва на шее приводит к статистически значимому повышению активности ФДЭ цАМФ в правом и левом желудочках сердца кошек на 41,1 и 31,5% соответственно (100% в контроле). Внутривенное введение ацетилхолина вызывает достоверное повышение активности фермента в правом желудочке на 39%, в левом наблюдается выраженная, но статистически незначимая тенденция к ее повышению (на 24,1%). Ваготомия вызывает слабое снижение активности, более выраженное в правом желудочке сердца, но статистически недостоверное (на 9,3%—в правом, 3,4%—в левом желудочке). Большая достоверность результатов, полученных на правом желудочке, объясняется, по-видимому, большим числом вагусных окончаний в периваскулярной области правой венечной артерии.

Как известно, в составе блуждающего нерва на шее кошки, как почти у всех видов животных и у человека, проходят волокна как парасимпатической, так и симпатической природы [6, 8, 9]. Однако нашими исследованиями было показано, что в изменении реактивности коронарных сосудов основную роль играет медиатор парасимпатической нервной системы—ацетилхолин [1].

В результате настоящих исследований установлено, что предварительная стимуляция вагуса на шее препятствует проявлению положи-

тельного влияния на кровоснабжение миокарда дибутирилпроизводного цАМФ, имитирующего эффект эндогенного цАМФ. Повышенная активность ФДЭ цАМФ сердца при раздражении вагуса способствует ускорению гидролиза цАМФ и тем самым препятствует проявлению его вазодилататорного эффекта.

А. Влияние дибутирил-цАМФ на коронарный кровоток. Регистрации сверху вниз: системное артериальное давление, отток из коронарного синуса (высота столбиков соответствует объемной скорости коронарного кровотока), отметка введения вещества и отметка времени. Б. Влияние дибутирил-цАМФ на коронарный кровоток после стимуляции правого вагуса из шее. Обозначения те же.

6

Таким образом, стимуляция гидролиза цАМФ в результате усиления тонической импульсации блуждающего нерва в отношении коронарных сосудов играет немаловажную роль в отсутствии вазодилататорного эффекта цАМФ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексини Р. А., Асатрян Т. О. Тез. докл. V Всесоюз. съезда «Физиологически активные вещества — медицина», 15—18 июня, Ереван, 1982.

2. Висильев В. Ю. Журн. Всесоюз. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева, 20, 3, 306, 1975.
3. Гурацц Б. Я. Автореф. канд. дисс., Ереван, 1979.
4. Дорощев Г. Н., Кожемякин Л. А., Ноакин В. Т. Циклические нуклеотиды и адаптация организма. Л., 1978.
5. Каверина Н. Б. Фармакология и токсикология, 21, 1, 39, 1958.
6. Смирнова В. М. Кардиология, 23, 10, 96, 1983.
7. Федоров Н. А. Биологическое и клиническое значение циклических нуклеотидов. М., 1979.
8. Agostoni E., Chinnici J. E., Daly M., de Lurgh, Murray J. G. J. Physiol., 125, 1, 182, 1957.
9. Daly M., de Burgh, Evans D. H. L. J. Physiol., 120, 4, 579, 1953.
10. Dietman K., Roesch E., Schanmann W., Juhren W. Biochem. Pharmacol., 21, 16, 2193, 1972.
11. Krause E.—i. Abh. Akad. Wiss. DDR; Abt. Math., Naturwiss., Geol., 1, 215, 1981.
12. Ople L. H. Cardiov. Res., 16, 9, 483, 1982.
13. Poch G., Kukovec W. R. Life Sci., 10, 133, 1971.
14. Singh J., Flithey F. W. Biochem. Pharmacol., 30, 12, 1475, 1981.
15. Warbanow W., Weidenberger A. Life Sci., 31, 15, 1603, 1982.

Поступило 16.VII 1986 г.

Биолог. ж. Армении, т. 40, № 2, с. 132—136, 1987

УДК 541.69.54 744.615.213

КОНСТАНТЫ АССОЦИАЦИИ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СУКЦИНИМИДОВ С ФЕНОЛОМ

Л. В. ХАЖАКЯН, С. К. ХАЧАТРЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Миджояна,
АН Армянской ССР, Ереван

Аннотация — Методом ИК-спектроскопии измерены константы ассоциации (K) производных сукцинимидов с фенолом. Полученные данные сопоставлены с противосудорожной активностью сукцинимидов. Выказано предположение, что сила биологического действия этих препаратов зависит от величины отрицательного заряда карбонильного сукцинимидов. Данные подтверждают также, что пространственное расположение рецептора, ответственное за стрихнинные судороги и ЛД₅₀, создает меньше затруднений при взаимодействии с изучаемыми препаратами сукцинимидов, чем рецепторы, ответственные за побочное наркотическое действие и коразоловые судороги.

Անոտացիա — Ի՛վ սպեկտրոսկոպի մեթոդով չափված են սուկցինիմիդների ասոցիան (K) հաստատունները ֆենոլի հետ: Համեմատելով ուսումնասիրվող կլոթիերի հակացնդոմային հատկությունների և K-ը հաստատունների կորերի ընթացքը կարելի է նկատել, որ կորագույնի և մկնդեղալին ցնդումների համար պատասխանատու կենսաբանական ընկալիչների թիմիական կառույցը ստեղծում է ավելի մեծ տարածական զմայրություններ ուսումնասիրվող կլոթիերի հետ փոխներդրմանը, քան թմրադեղի և ԼԼԾ₅₀-ի ազդեցության համար պատասխանատու ընկալիչների հետ փոխազդելիս:

Abstract — The association constants ("K") of succinimide derivatives with phenol have been measured by IR-spectroscopy.

The obtained data have been compared with the anticonvulsive activity of succinimides. It is suggested that the strength of the biologi-