ЛИТЕРАТУРА

1. Владимиров Ю. А., Арчаков А. Н. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. М., 1972.
2. Дроздов Н. С., Матерянская Н. П. Практикум по биологической химии. 73, М., 1970.
3. Меерсон Ф. З. Патогенез и предупреждение стрессорных и ишемических повреждений сердца. М., 1984.
4. Мейцлер Д. Биохимия, 2, 376, М., 1980.
5. Михлин Д. М. Биохимия клеточного дыхания. 161, М., 1960.
6. Нонхубел Д., Уолтон Дж. Химия свободных радикалов. 382, М., 1977.
7. Стальная И. Д., Гаришвилли Т. Г. В кн.: Современные методы в биохимии (под ред. В. Н. Ореховича), 66—68, М., 1977.
8. Фридович И. В. В кн.: Свободные радикалы в биологии (под ред. У. Прайора), 1, 272—314, М., 1979.
9. Carrel R., Winterbourn C., Rachmilewitz E. Br. J. Haematol., 30, 259—264, 1975.
10. Halliwell B. FEBS Lett., 92, 321—326, 1978.
11. Iain S. K., Shoner S. B. Biochim. et Biophys. Acta, 612, 45—54, 1981.
12. Little C., O'Brien P. J. Biochem. Biophys. Res. Commun., 31, 145—150, 1968.
13. McCord J. M., Day E. D. FEBS Lett., 86, 139—142, 1978.
14. Nicholls P. Biochim. et Biophys. Acta, 99, 286—287, 1965.
15. Segal H. Biochim. et Biophys. Acta, 363, 378—381, 1974.
16. Stocks J., Dormandy P. L. Br. J. Haematol., 29, 95—111, 1971.

Поступило 10.XI 1985 г.

И-цолг. ж. Армении, т. 10, № 3, 209—213, 1987

УДК 577.352.315+23

ΔΨ-ЗАВИСИМЫЙ ПЕРЕНОС ИОНОВ КАЛИЯ У *BREVIBACTERIUM FLAVUM*

А. Г. ВАРДАНЯН, С. С. ДУРГАРЬЯН, М. И. ОГАНЕСЯН

Научно-исследовательский технологический институт аминокислот, Ереван

Аннотация — Изучен характер транспорта K^+ у аэробных бактерий *B. flavum*. Показано наличие трех фаз поглощения K^+ . Значения K_M и V_{max} для поглощения K^+ близки к характеристикам Trk системы *E. coli*. Калпневый равновесный потенциал соответствует измеренному ΔΨ. Введение в среду протонифора приводит к реверсии процесса поглощения K^+ . В присутствии ЛЦКД не наблюдается поглощения K^+ . Арсенат натрия уменьшает вход K^+ . Предполагается, что ионы K^+ поступают в клетки *B. flavum* по градиенту электрического поля, при этом АТФ является, видимо, регулятором этого переноса.

Ստուգաթիւ — Քանոնափոխում է K^+ -ի տրանսպորտի բնույթը *B. flavum* սեւոր բակտերիաների մոտ: Ցույց է տրված K^+ -ի կլանման երեք փուլերի առկայությունը: K^+ -ի կլանման համար K_M և V_{max} -ի արժեքները մոտ են *E. coli* բակտերիաների *Trk* սրտանմի բնութագրերին: Կալիումային հավասարակշռային պոտենցիալը համապատասխանում է չափված ΔΨ-ին: Փրոտոնաֆորի ներմուծումը միջավայր հանգեցնում է K^+ կլանման ուներսին: N_2O_5 -դիցիկլոհեքսիլկարբոդիմիդի ներկայությամբ չի դիտվում K^+ -ի կլանում: Նատրիումի արսենատը առաջացնում է K^+ սրտի նվազում, ենթադրվում է, որ K^+ -ի իոնները թափանցում են *B. flavum* բջիջների մեջ կիկտրական դաշտի գրադիենտի շնորհիվ, ընդ որում, ԱնՖ-ը հանգեցնում է այդ պրոցեսի կարգավորչի:

Abstract — The character of K^+ -transport in respiring bacteria *B. flavum* has been investigated. It has been revealed the presence of three phases of K^+ -uptake. The values of K_m and V_{max} for K^+ -uptake are close to *E. coli* *Trk* system characteristics. The equilibrium potassium potential corresponds to the measured $\Delta\psi$. The application of protonophore with glucose available has led to a K^+ -uptake reverse. In the presence of N,N' -dicyclohexylcarbodiimide no K^+ -uptake has been observed. Application of sodium arsenate has caused a K^+ -uptake decrease. It is assumed that the potassium ions enter the *B. flavum* cells by electrical field gradient, and this transfer may be regulated by ATP.

Ключевые слова — гиперполяризация мембраны, мембранный потенциал ($\Delta\psi$), ионы K^+ .

У грамположительных аэробных бактерий *Brevibacterium flavum* аппликация метаболизируемых сахаров вызывает резкий и кратковременный выброс ионов водорода и гиперполяризацию мембраны [1, 2]. Этот процесс сопровождается потоком ионов калия внутрь клеток, причем стехиометрия ионного обмена H^+ : K^+ равна единице. Эти данные являются предварительным указанием на то, что поглощение K^+ у аэробных бактерий происходит по градиенту электрического поля, в то время как анаэробы используют для транспорта K^+ энергию гидролиза АТФ [5].

В данной работе показано, что в аэробных бактериях *B. flavum* ионы калия действительно распределяются между клеткой и средой пассивно по градиенту электрического поля.

Материал и методика. В работе использовали клетки *Brevibacterium flavum* штамм АТСС 14067 [6]. Бактерии выращивали в течение 18—20 ч в мясопептонном бульоне при 30° на клячке. Дальнейшая процедура подготовки клеток к опыту описана ранее [1]. Количество жизнеспособных бактерий определяли методом посева на твердые питательные среды. Титр клеток в эксперименте достигал $3-5 \times 10^9$ кл./мл. Потоки ионов и разность электрических потенциалов ($\Delta\psi$) определяли с помощью катионселективных электродов по описанным ранее методикам [4, 7, 9]. Внутриклеточную концентрацию ионов калия оценивали по количеству K^+ , вытекающему из клеток, обработанных толуолом в концентрации 2,0 мкл./мл. Такая обработка ведет к освобождению 95% внутриклеточного K^+ [8]. Использовали N,N' -дихлороксикарбодимид (ДНКД), валлиномицил, арсенат натрия, карбонилцианид-*m*-хлорфенилгидразон (КХФГ) (все Sigma, США), тетрафенилфосфоний (ТФФ+) (Chemapol, ЧССР).

Результаты и обсуждение. Ранее было показано, что добавление глюкозы к суспензии клеток *B. flavum* вызывает резкую секрецию H^+ и гиперполяризацию мембраны с одновременным поглощением ионов калия, совпадающим по характеру с изменением $\Delta\psi$ [1]. Однако это совпадение не может служить достаточным доказательством того, что только наличие $\Delta\psi$ обеспечивает наблюдаемое поглощение и распределение ионов калия у *B. flavum*. Одним из основных доказательств того, что K^+ у этих бактерий распределяется пассивно между клеткой и средой является соответствие наблюдаемого распределения этих ионов с измеренной величиной $\Delta\psi$ (табл.).

Установлено также, что скорость поглощения K^+ и количество ионов, поглощенное клетками, прямо пропорционально активности этого иона в среде в пределах 0,5—5,0 мМ. Соотношение начальных скоро-

Распределение ионов калия между клеткой и средой и $\Delta\psi$ у *B. flavum* в средах с различным содержанием K^+ в отсутствие глюкозы

$[K^+]_o$ (мМ)	$[K^+]_{in}$ (мМ)	$[K^+]_{in}/[K^+]_o$	E_{K^+} (мВ)	$\Delta\psi$ (мВ)
0.46	203	443	159	155±8
0.81	227	280	147	147±8
1.91	133	133	127	130±6

Примечание: $[K^+]_o$ — концентрация ионов калия в среде; $[K^+]_{in}$ — концентрация внутриклеточного K^+ ; величину равновесного калиевого потенциала рассчитывали по формуле

$$E_{K^+} = \frac{RT}{F} \ln ([K^+]_{in}/[K^+]_o).$$

стей потоков H^+ : K^+ в изученной нами области концентраций K^+ близко к единице [1]. Из серии этих опытов по методу Лайнуивера-Берка определены значения $K_{0.5} = 2,4$ мМ и $V_{max} = 0,2$ мМ/мин. кл., близкие к характеристикам переноса ионов калия через Ttk систему у *E. coli*, которая представляет собой K^+ -нонофор [10].

Введение в экспериментальный раствор 10^{-5} М разбавителя окислительного фосфорилирования КХФГ приводит к реверсии процесса поглощения K^+ в присутствии глюкозы (не приведено). При этом скорость секреции ионов водорода, обычно наблюдаемая в течение гликолиза, уменьшается после добавления КХФГ, что объясняется электродиффузионным обратным током протонов, возникающим в результате образования дополнительных H^+ -каналов вследствие обработки клеток протонофором КХФГ. Из этого опыта следует, что наличие $\Delta\psi$ необходимо для поглощения и поддержания ионов K^+ внутри клеток. Поэтому ожидалось, что в присутствии валлиномицина (10^{-6} М), создающего дополнительные каналы проводимости для ионов калия в мембране, будет усиливаться поток K^+ внутрь клеток под действием электрического поля. Однако при указанной концентрации валлиномицина мы не наблюдали заметного изменения потоков H^+ и K^+ по сравнению с контролем.

На рис. 1 показан характер изменения $\Delta\psi$ и соответствующих потоков ионов K^+ и H^+ после добавления глюкозы при 30° и 20°. На всех трех кривых обращает на себя внимание наличие трех фаз, строго совпадающих во времени. Первая фаза поглощения K^+ полностью соответствует характеру изменения $\Delta\psi$. Регистрируемая гиперполяризация мембран аэробных *B. flavum*, как было показано [1, 2], создается усилением секреции H^+ через дыхательную цепь при аппликации глюкозы. Когда мембранный потенциал у этих бактерий достигает некоторого порогового уровня, включение H^+ -АТФазы в режим синтеза АТФ ведет к небольшому падению $\Delta\psi$ с последующей его стабилизацией, очевидно, благодаря уравновешиванию потоков H^+ , направленных из клетки в среду и из среды в клетку, соответственно через дыхательную цепь и H^+ -АТФазу. Подтверждением последнего предположения может слу-

жить то, что, как уже было показано, в присутствии ДЦКД, блокирующего H^+ -АТФазу и повышающего $\Delta\psi$, секретиция ионов H^+ после добавления глюкозы происходит без изменений скорости [2], и при этом наблюдается некоторое поглощение ионов K^+ .

Рис. 1.

Рис. 1. Изменения активностей ионов H^+ и K^+ в среде и гиперполяризация мембраны *B. licheni* при аппликации глюкозы (G , 2,0 мМ) при 30° (сплошная линия) и 20° (пунктир). Экспериментальная среда содержала (в мМ): трис—10,0, H_2PO_4 —3,0, KCl —1,0, $NaCl$ —1,0, $MgSO_4$ —1,0, ТФФ— 2×10^{-3} (рН 7,3). Переходный уровень $\Delta\psi$ практически не зависит от температуры и составляет—145 мВ. Фазы I, II, III показаны только для кривых при 30°.

Рис. 2.

Рис. 2. Изменения мембранного потенциала и активностей ионов H^+ и K^+ в среде у *B. licheni* при аппликации глюкозы (G , 2,0 мМ) до и после добавления арсената натрия (A , 3,0 мМ). Условия эксперимента идентичны описанным в подписях к рис. 1 при 30°.

Снижение температуры приводит к замедлению секретиции H^+ , соответственно уменьшается гиперполяризация и замедляется вход K^+ (рис. 1), но при этом начальный уровень $\Delta\psi$ до аппликации глюкозы остается постоянным (—145 мВ). Для первой фазы поглощения K^+ нами определен коэффициент Вант-Гоффа Q_{10} , равный 1,3. Это значение температурного коэффициента почти совпадает со значением $Q_{10} = 1,4$ для физической диффузии [3], что еще раз указывает на неферментативный характер переноса ионов калия внутрь клеток и период первой фазы поглощения.

При аппликации глюкозы в присутствии арсената натрия амплитуда гиперполяризационных ответов увеличивается (рис. 2), хотя как скорость, так и количество выходящего H^+ уменьшаются. В этом случае уменьшается также поток K^+ внутрь, что, очевидно, можно объяснить отсутствием АТФ. Как было показано ранее [2], ионы K^+ , поступая в клетки в ответ на гиперполяризацию мембраны, уменьшают амплитуду гиперполяризации. Поэтому в отсутствие потока ионов K^+ , направлен-

ного из среды в клетку, наблюдается реальная величина амплитуды гиперполяризации—большая по сравнению с контролем (рис. 2).

Таким образом, ионы калия поступают в клетки *B. flavum* по градиенту электрического поля, но при этом ЛТФ, возможно, является регулятором этого переноса. Причем регуляция может быть как аллостерической, так и происходящей за счет фосфорилирования какого-то белка Trk системы, как это детально обсуждается Стьюартом и др. [10].

ЛИТЕРАТУРА

1. Варданян А. Г., Мартиросов С. М. Биофизика, 31, 5, 833, 1986.
2. Варданян А. Г., Гончегулян А. Е., Петросян П. К., Мартиросов С. М. Биофизика, 31, 6, 993, 1986.
3. Ленинджер А. Биохимия. 700, М., 1974.
4. Мартиросов С. М., Трчунян А. А., Варданян А. Г. Биофизика, 27, 1, 48, 1982.
5. Мартиросов С. М., Трчунян А. А. Биофизика, 31, 3, 464, 1986.
6. Штаников А. В., Лившиц В. А., Жданова Н. Н. Генетика, 17, 1419, 1981.
7. Durgaryan S. S., Martirosov S. M. Bioelectrochem. Bioenerg., 5, 554, 1978.
8. Eisenstadt E. I. Bacteriol., 112, 264, 1972.
9. Martirosov S. M., Petrosian L. S., Tchountun A. A., Vardanian A. G. Bioelectrochem. Bioenerg., 8, 613, 1983.
10. Stewart L. M. D., Hukker E. P., Booth I. R. J. Gen. Microbiol., 131, 77, 1985.

Поступило 30.IX 1986 г.

Биолог. ж. Армении, т. 40, № 3, 213—219, 1987

УДК 663.1.577.112.38.2

БИОСИНТЕЗ L-ПРОЛИНА ИЗОЛЕЙЦИНЗАВИСИМЫМИ МУТАНТАМИ *BREVIBACTERIUM FLAVUM* НА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ, СОДЕРЖАЩИХ МЕЛАССУ

Э. М. АКОПЯН, Б. И. КАРАБЕКОВ, В. Е. АКСЕНОВСКАЯ,
А. А. БУДУЛЯН, А. Г. МУРАДЯН, Ф. Н. ТХРУНИ

Научно-исследовательский технологический институт аминокислот, Ереван

Аннотация.—Изучена возможность осуществления биосинтеза L-пролина изолейцинзависимыми мутантами *B. flavum* на питательных средах, содержащих в качестве источника сахара свекловичную и тростниковую мелассу. Установлено, что свекловичная меласса обладает выраженной ингибирующей активностью в отношении биосинтеза этой аминокислоты, в то время как тростниковая, наоборот, стимулирует этот процесс. Эффект от применения этих видов мелассы зависит от их содержания в питательной среде. Определены условия практического применения этих видов сырья для получения L-пролина.

Սնտեսիս — Ստանալիքով է L-պրոլինի թիոսինթեզը *Brevibacterium flavum* իզոլեյցինից կախված մուտանտների կողմից սնուցող միջավայրում՝ որպես շաքարի աղբյուր օգտագործելով ճակնդեղի և շաքարեղևի մելասսաները: Հաստատված է, որ այդ ամրնաթթվի թիոսինթեզի եկատմամբ ճակնդեղի մելասսան օժտված է արտա-հատիչ արգելակող հատկությամբ, այն ղեկարսւմ, երբ շաքարեղևի մելասսան ընդհակառակն, օժտված է խթանող հատկությամբ: Այդ երկու տեսակի մելասսաների օգտագործման էֆեկտը կախված է սնուցող միջավայրում երանց պարունակութան մակարդակից: Որոշված էն այդ երկու տեսակի հումքերի գործնական կիրառման պայմանները L-պրոլինի ստացման համար: