3. Braulie J. J., Brooks R. B. Gleanings in bee culture, 7, 410—412, 1969.
4. Goolsbey M. American Bee Journal, 108, 9, 352—353, 1968.
5. Schley P. Die Biene, 10, 418—420, 1979.

Поступило 3.1 1987 г.

Бiolог. ж. Армении, т. 40, № 9, 785—787, 1987

УДК 595.7

НОВЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ АРМЕНИИ ВИДЫ НАСЕКОМЫХ

Г. А. АРУТЮНЯН

Институт ботаники АН Армянской ССР, Ереван

Ключевые слова: фауна Армении, насекомые.

В результате изучения вредной литофауны деревьев и кустарников республики нами выявлены еще ряд видов, впервые отмечаемых для фауны Армении.

Отряд Чешуекрылые

Сем. Tortricidae

Epinotia bilunana Hw. В Ереванском ботаническом саду гусеницы этого вида нами были отмечены в середине апреля (15. IV. 1981) на различных видах берез, в мужских сережках, которые они повреждали. В конце апреля (29. IV. 1981) они окуклились в местах обитания. Вылет бабочек в лабораторных условиях наблюдался в первой половине июня (12. VI. 1981). Зимуют взрослые гусеницы в сережках. В год дает одно поколение.

Epinotia cruciana L. Гусеницы собраны 9. VI. 1982 г. в свернутых листьях ивы (*Salix caprea*) в лесу, в окр. с. Цахкадзор (Разданский р-н). Окукление отмечено в местах обитания 22. VI., вылет бабочек в конце июня (29. VI. 1982). По всей вероятности, вид развивается в двух поколениях.

Olethreutes arcuella Cl. Бабочки выловлены сачком в лесу в окр. с. Цахкадзор (Разданский р-он) 9. VI. 1982 на (*Salix caprea*) и в Севанском ботаническом саду 17. VI. 1982 на алыче. По литературным данным [1], гусеницы в лесной подстилке, многоядны.

Gypsonoma simulantana Stgr. Приводится из Малой Азии [2]. В Армении гусеницы найдены в Ереванском ботаническом саду в свернутых листьях ивы (*Salix caprea*) 31. V. 1984, окукление отмечено там же 11. VI., вылет бабочек 18. VI. 1984. В год дает два поколения.

На Кавказе отмечается впервые.

Сем. Gelechiidae

Teleiodes nephelaspis (Meyrick), Comb. n. Вид описан по самцу Мейриком из северной Индии [3]. Намн отмечен в Хосровском заповеднике (Арагатский р-н, Аспн, Ураиоц) на туполистной фисташке (*Pistacia tutilica*). Гусеницы питаются листьями и мякотью плодов (4. VI. 1974).

коконе 16. VI. 1974. Вылет бабочек в конце июня (29. VI. 1974). Зимуют гусеницы в поврежденных листьях в рыхлом шелковом ют гусеницы в коконах в трещинах коры деревьев, в подстилке и в почве. В год дает два поколения.

Самка этого вида отмечается впервые для науки (В. И. Пискунов, Витебск).

Вид отмечается для СССР впервые.

Vladimirea submacula Povolny. Вид описан Повольным [4] из северо-восточной части Ирана и Афганистана. Гусеницы этого вида нами обнаружены 13. VI 1969 на парнолистнике в окр. Еревана, листьями и плодами которого они питались (*Zygophyllum fabago*). Окукление отмечалось в плодах 23. VI, вылет бабочек 7 VII 1969. Вероятно, в год дает два поколения.

Найден в СССР впервые.

Ornativulva basistriga Sattler. Вид описан недавно из Монголии [5]. Гусеницы нами были найдены в окр. г. Арарата (Араратский р-н) на гребенщике (*Tamarix ramosissima*), где они питались листьями, 18. VIII 1978, окукление 29. VIII. Зимуют куколки. Вылет бабочек в лабораторных условиях отмечался 19. II—14. V. 1979. Вероятно, в год дает два поколения.

Найден в СССР впервые.

Ornativulva grisea Sattler. Описан Заттлером [6] из Афганистана. Нами гусеницы обнаружены в окр. г. Арарата (Араратский р-он) 19. VIII. 1979 на гребенщике (*Tamarix ramosissima*), листьями которого они питаются. Окукление 30. VIII, вылет бабочек в первой половине мая (11. V. 1979) следующего года.

Найден в СССР впервые.

Отряд Перепончатокрылые

Сем. *Torymidae*

Megastigmus juniperi Nik. Арчевый семяед. Приводится из Средней Азии [1]. В Армении нами отмечен на г. Арагац, на высоте 2500 м. Личинки в семенах можжевельника (*Juniperus depressa*). Лет взрослых насекомых отмечается обычно в середине июля и продолжается весь август. Яйца откладываются в шишковаягоды урожая текущего года. Личинки питаются незрелыми ядрами шишковаягод и зимуют внутри семян. Окукливание в косточке. В год одно поколение. Вредит сильно.

Отряд Двукрылые

Сем. *Tephritidae*

Carpomyia vesuviana A. Costa. Нами отмечен в окр. с. Гетап Ехегнадзорский р-н) и с. Асли (Араратский р-н). Личинки этой мухи развиваются в мякоти плодов унаби (*Zizphus jujuba*). В одном плоде развиваются по две-три личинки. В процессе питания личинки съедают всю мякоть плода. В конце августа (28. VIII. 1979) личинки выходят из плодов и окукливаются в почве. Вылет взрослых мух отмечался во

второй половине июня (20. VI. 1980) следующего года. В год одно поколение. Вредит сильно.

Таким образом, в результате сборов, проведенных в ботанических садах и редколесьях Армении, приводится 10 видов насекомых-вредителей, впервые отмечаемых для фауны Армении, из них два вида для Кавказа, три для Советского Союза.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Вредители леса. Справочник, 1. М.—Л., 1955.
2. *Staudinger O., Rebel H.* Katalog der Lepidopteren des palaarktischen Faunengebietes, Berlin, 1901.
3. *Clarke J. F., Gates* Catalogue of the type specimens of Microlepidoptera in the British Museum (Natural History), described by Edward Meyrick, 7. Gelechiidae (D—Z), 1—IV, 1—531, London, 1969.
4. *Povolny D.* Acta Entomologica Musei Nationalis., 37, 147—159, Prague, 1967.
5. *Sattler K.* Bull. Brit. Mus. (Natur. Hist.) Entomol., 34, 2, 85—152, 1—27, 1976.
6. *Sattler K.* Beitr. naturk., Forsch. SW—Deutschl. Karlsruhe, 26, 3, 33—90, 1967.

Поступило 1.IV 1987 г.