

О ВИДОВОМ СОСТАВЕ ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВОГО ПОКРОВА В БУКОВЫХ ЛЕСАХ АРМЕНИИ

К. А. ТЕР-ГАЗАРЯН, Р. С. ПЕТРОСЯН

Институт ботаники АН АрмССР, Ереван

Согласно проведенным в 1985—1986 гг. исследованиям, травяно-кустарничковая флора в буковых лесах Армении насчитывает 211 видов, относящихся к 47 семействам и 152 родам. Наиболее представительны семейства *Asteraceae*, *Fabaceae*, *Lamiaceae*, *Poaceae*, *Apiaceae*. Под пологом сомкнутых букняков (полюта 0,8—1,0) произрастают 42 вида из 21 семейства, из них доминируют 25 видов (*Poa nemoralis* L., *Galium odoratum* L., *Impatiens noli-tangere* L. и др.), а на открытых местобитаниях преобладают 20 видов из 8 семейств (*Potentilla reptans* L., *Lotus caucasicus* Kurijan. ex Vuz., *Achillea millefolium* L. и др.) Остальные 166 видов явного преобладания не обнаруживают и присутствуют главным образом в качестве сопутствующих.

В эколого-ценотическом отношении видовой состав травянистой растительности очень разнообразен. 84 вида из 33 семейств являются типично лесными. Содержание луговых видов достигает 38% (81 вид), сорных 11% (24 вида), тогда как стенных и полупустынных элементов очень мало (по 2 вида).

Из общего количества 170 видов (80,5%) — многолетники, 8,5% — однолетники и лишь 3% — двулетники. Остальные 8% представлены видами, обладающими возможностью изменять свой жизненный цикл в зависимости от условий среды.

Подавляющая часть растений (64,5%) — летневегетирующие с ранним окончанием вегетации, мало (13 видов) эфемеров и эфемероидов. Остальные виды относятся к категории летневегетирующих с поздним окончанием вегетации (гемиэфемериды).

Из общего числа видов 50 являются лекарственными растениями, 24 — кормовыми, 26 — декоративными, 13 — медоносами, 10 — пищевыми. К редким и исчезающим видам относятся *Crocus speciosus* Bieb., *Cephalaria longifolia* (L.) Fritsch., *Dactylorhiza urvilleana* (Stendel.) Baumann et Kunkell.

26 с., ил., библиогр. 14 назв.

Полный текст статьи депонирован в ВНИИТИ, № 8286-В88 от 24.11.1988 г.

Поступило 23.VI.1988 г.