

живущих инфузорий как при комнатной, так и при высоких (35° — 37°) температурах.

9 с., библиогр. 7 назв.

Полный текст статьи деп. в ВИНТИИ, № 8020-B87 от 28.X 1987 г.

Поступило 19.V 1987 г.

Биол. ж. Армении, т. 41, № 4, 1988

УДК 632.937.1:595.78(479.24)

ПАЗАРИТЫ ОСНОВНЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЯБЛОНИ И ГРУШИ В ЛОРИ-ПАМБАКСКОЙ ЗОНЕ АРМЯНСКОЙ ССР

А. ДЖ. ГРИГОРЯН

Кировакенский государственный педагогический институт, биологический факультет

В статье приводятся состав энтомофагов вредных чешуекрылых плодовых садов, в частности яблони и груши Лори-Памбакской зоны Арм. ССР, значимость и динамика по годам (за 1977—1980 гг.) для яблонной плодовой гни, рябиновой и яблонной моли, медведицы госпожи и златогузки.

Общая паразитированность опасных вредных чешуекрылых за отмеченные годы в среднем колеблется в пределах, %: яблонной плодовой гни—7,9—19,5; рябиновой моли—0,21, медведицы госпожи—5,3—80,0; яблонной моли—10,5—43,5; златогузки—0—14,2.

На яблонной плодовой гни выявлены 5 видов паразитических насекомых (*Pimpla turionellae* L., *Ascogaster quadridentata* Wesm., *Cremnops desertor* L., *Microdus rufipes* Nees., *Neoplectons pomonella* Schn. et Molt.), рябиновой моли—2 (*Microgaster* sp. aff. *polita* Marsh.), медведице госпоже 8 (*Pimpla instigator* F., *Netaropelma amictum* Fabry., N. sp. cf. *amictum* Fabry., *Ichneumon* sp. cf. *deliratorius* L., *Apanteles* sp. aff. *acuminatus* Reinh., *Carcelia lucorum* Mg., *Huebneria affinis* Fell., *Nemora pellucida* Mg.), златогузке 7 (*Meteorus versicolor* Wesm., *Bracon anthracinus* Richter., *Townsendiellomyia nidiicola* T. T., *Ctenophorocera pavidus* Mg., *Compsilura concinnata* Mg., *Blondelia nigripes* Fl., *Tachina praecox* Mg.), а яблонной моли 5 (*Itopectis tunetana* Schmied., *Habrobracon variegator* Spin., *Tetrestichus evonymellae* Bouche., *Aeniaspis fuscicollis* Dalm., *Pseudosareophaga mamillata* Pand.) видов паразитов.

Таким образом, на отмеченных вредных насекомых в общей сложности выявлены 26 видов паразитических насекомых, принадлежащих к двум отрядам и 6 семействам, в том числе *Ichneumonidae*—6 видов *Braconidae*—7, *Eulophidae*—1, *Encyrtidae*—1, *Tachinidae*—10, *Sarcophagidae*—1 вид.

Для каждого вида приводятся фенология и литература по АрмССР.

9 с., библиогр. 10 назв.

Полный текст статьи деп. в ВИНТИИ, № 9068-B87, от 24.XII 1987 г.

Поступило 1.X 1987 г.