Фактический материал позволил сделать заключение, что усиление возбудимости коры головного мозга кофеином приводит к торможению стимулирующего действия сульфадиметоксена на желудочную секрецию. При этом, увеличивается количество Ca , Mn , Mg , Fe , Ca , что, возможно, может обеспечить нормальное течение обменных процессов.

6 с., библиогр. 3 назв.

Полный текст статьи деп. в ВИНИТИ, № 3509 В-88 от 7 VII 1985.

Поступило 9.IV 1988 г.

Бюлог ж. Армения, т. 41, № 7, 1988 г.

УДК 582.28.581.9(479.25)

НОВЫЕ ДЛЯ АРМЕНИИ ВИДЫ МИКРОМИЦЕТОВ ИЗ ЗАСУШЛИВЫХ МЕСТОБИТАНИИ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ И ЕЕ ПРЕДГОРИИ

С. А. СИМОНЯН, Т. О. МАМИКОНЯН

Институт ботаники АН АрмССР, Ереван

В процессе исследований микромицетов Араратской равнины и ее предгорий сборы микологического материала проводились и на территории Хосровского заповедника (в пределах Араратского и Абовянского районов); обнаружено 11 видов сумчатых и несовершенных грибов, новых для микофлоры Армении. Систематический список грибов представлен следующими видами: *Microsphaera baeumleri* Magn., *Diaporthe arctii* (Lasch.) Nits. var. *achilleae* (Auers.) Wehm, *Physalospora festucae* (Lib), *Pyrenophora trichostoma* (Fr.) Fuck., *Ovularia tuberculiformis* Hoehn, *Coniothyrium artemisiae* Kalymb., *Gloeosporium decipiens* Sacc, *Hendersonia serbica* Bubak et Ranojevic, *Selenophoma bupleuri* Petrak, *S. euphorbiae* Pissar.

Большинство отмеченных грибов ведут сапротрофный образ жизни на перезимовавших стеблях травянистых растений, подготавливая субстрат для дальнейшего его разложения, два вида (*Microsphaera baeumleri* Magn. и *Ovularia tuberculiformis* Hoehn) — паразиты листьев вики и астрагала соответственно.

4 с., библиогр. 8 назв.

Полный текст статьи деп. в ВИНИТИ, № 5517—В88 от 7 VII 1988.

Поступило 5.IV 1988 г.