

вида нуктерибид, на *E. ognevi*, *T. teniotis* и *P. kuhlii* — единичные экземпляры *Ph. biarticulatum*. Интересно отметить, что эти три вида летучих мышей впервые отмечены в качестве хозяев для *Ph. biarticulatum*.

При оценке нуктерибид Армении с точки зрения широты трофических связей с прокормителями из шести рассматриваемых видов можно выделить *N. schmidlii* как паразита с высокой степенью специфичности в отношении хозяина (на территории Армении зарегистрирован только на *M. schreibersii*) и широкого олигофага *Ph. biarticulatum* (зарегистрирован на шести из семи видов летучих мышей).

И в заключение несколько слов о видовом составе нуктерибид Армении. Предположительно общее число видов на ее территории может быть равно 8—10. Пока здесь не обнаружены представители рода *Vasilia* (возможно нахождение 2 видов), и, конечно, не исключена вероятность обнаружения новых видов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дубовченко Т. А. В кн.: Проблемы паразитологии, 395—397, Киев, 1967.
2. Дубовченко Т. А., Гаджиев А. Т. В кн.: II Всесоюз. съезд паразитологов. Киев, окт. 1983. Тез. докл., 85, Киев, 1983.
3. Hurka Karel. Věst. es. Společ. zool., 18, 90—101, 1984.
4. Theodor Oskar. Trustees of the British Museum (Nat. Hist), 504, London, 1967.

Поступило 21.XII 1988 г.

Биолог. ж. Армении, № 4 (42), 1989

УДК 591.9

НАХОДКИ КОЖАНОВИДНОГО НЕТОПЫРЯ *PIPISTRELLUS (VESPERTILIO) SAVII* BONAPARTE, 1837

Э. Г. ЯВРУЯН

Ереванский государственный университет, кафедра зоологии

Фауна Армении — нетопырь кожановидный — прокормимые.

Находки *Pipistrellus savii* известны преимущественно из горных и предгорных районов Южного Крыма, Кавказа, Средней Азии, Южного и Юго-Восточного Казахстана, Южного Приморья, Южной Европы, Передней, Центральной и Восточной Азии, Северной Индии, Северо-Западной Африки и Италии [2—4, 6, 9].

Столь широкое распространение кожановидного нетопыря, а также единичные находки его в ГрузССР потребовали более тщательной ревизии территории нашей республики [3, 5].

До настоящего времени мы не располагали достоверными данными относительно находок кожановидного нетопыря на территории Ар. ССР и НахАССР [1, 2, 7, 8]. Лишь Де Блаз [9] приводит сведения о находке единичного экземпляра в Северной Армении. Однако наши попытки выяснить, кем и когда добыт зверек и где находится этот материал, остались безрезультатными.



Карта распространения кожно-паразитического животного *Papistivulus (Asperidius) Saxon* (Бончаров, 1937).

В 1974 году два экземпляра ♂♂ были добыты нами близ села Енокаван (Иджеванский р-он). В 1976 году две ♀♀ и один ♂ были добыты из-за наличников окон разрушенного дома на окраине г. Раздан. В 1977 году на чердаке хлебозапасной комнаты г. Ноемберян, были добыты четыре ♀ ad и два ♂♀ juv. С 1985 года и до ноября 1986 года лет этих нетопырей наблюдали в Эчмиадзинском, Октемберянском, Вединском, Ехегнадзорском, Ализбековском, Кафанском, Мегринском районах АрмССР.

В указанных южных районах Армении за 1985—86 гг. нами было окольцовано 28 зверьков и лишь 4 зверька окольцованы на северо-восточной окраине г. Мартуни (бассейн оз. Севан).

Таким образом, ареал этого вида в Армении довольно широк (рис.). Он тянется от северной границы с ГрузССР и до границ с Турцией и Ираном. В НахАССР за 1984—86 гг. были добыты 5 зверьков: 2 ♀♀ из грота на склоне горы Каракуш, 1 ♂ — из дупла бука в 2,5 км от г. Орду-бад и 2 ♀ из-под пешеходного мостика близ с. Аза.

Как отмечают некоторые авторы [3, 6], кожанокрылый нетопырь предпочитает селиться на чердаках домов, в сараях, овчарнях и т. д. Наши же наблюдения позволяют предполагать, что эти убежища занимаются самками в период беременности и родов. Но как только детеныши начинают летать, подавляющее большинство колоний самок с подростком молодняком покидают крыши и чердаки. В с. Арени (Ехегнадзорский р-он) после покидания чердаков они небольшими группами селятся в окрестных гротах, у входов пещер и в щелях скал. Именно в это время их замещают на чердаках и крышах одиночные самцы, до этого единицами живущие в гротах, расщелинах скал и в дуплах.

У отловленных зверьков отмечено заметное варьирование окраски меха и ушей: от светло-желтой с желтовато-белесыми ушами до коричнево-бурой с темно-коричневыми ушами. Таких зверьков можно встретить как в северных районах Армении, так и на юге НахАССР.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дали С. К. Насекомоядные и рукокрылые Армянской ССР и Нахичеванской АССР. Ереван, 1940.
2. Дали С. К. Животный мир Армянской ССР. Ереван, 1951.
3. Куликян А. П. Летучие мыши. М., 1950.
4. Кузнецов Б. А. Определитель позвоночных животных фауны СССР. Млекопитающие. 3. М., 1975.
5. Сагунян К. А. S. De Blase A. F. The Bat of Iran. Oklahoma, 1972. I. Wet neue Säugethiere aus Transkaukasien, 1901.
6. Стрелков П. П. Каталог млекопитающих СССР. Рукокрылые, Л., 1981.
7. Яруян Э. Г. Рукокрылые Армении и их охрана. М., 1977.
8. Яруян Э. Г. Современное состояние рукокрылых Армении и НахАССР. М., 1978.
9. De Blase A. F. The Bat of Iran. Oklahoma, 1972.

Поступило 21 XII 1988 г.