

О НАХОЖДЕНИИ БЕЛОХВОСТОЙ ПИГАЛИЦЫ—
(*VANELLOCHETTISIA LUCURA* LICHTENSTEIN, 1823)
В АРМЕНИИ

М. С. АДАМЯН, К. А. МЕЛНИКЯН

Институт зоологии АН Армении, Ереван

Фауна Армении—белохвостая пигалица

По последним данным, белохвостая пигалица в пределах СССР распространена в Казахстане от северо-восточного побережья Аральского моря до долины Илек, Сыр-Дарьи, хребта Қаратау, Аму-Дарьи и в Восточном Закавказье [2].

В Узбекистане в низовьях Аму-Дарьи довольно обстоятельно разработаны основные параметры экологии гнездования белохвостой пигалицы [1].

Залеты отмечены на Волге, реке Илек; во Франции, Мальте и в Алжире. Вне СССР область гнездования распространяется на Сирию, Иран, Пакистан [3, 4].

В Армении эта птица впервые была отмечена с 21 по 22 июля 1989 г. в районе Армашского рыболовного хозяйства.

Хозяйство расположено на юго-востоке долины р. Аракс недалеко от с. Суренаван. Ландшафт местности солончаков-полупустынного типа с глинистой почвой. Высота местности над ур. м. более 800 м, климат континентальный с жарким летом. Растительность местности, где были встречены птицы, чахлая и низкорослая. Основными представителями являются прибрежница, тамарикс, верблюжья колючка, рогоз и гротник. Весной местность сильно заболачивается из-за поднятия уровня грунтовых вод. Летом затопленные водой территории частично высыхают, образуя многочисленные лужицы.

В момент обнаружения белохвостые пигалицы находились на высоте 20–30 м и с беспокойным криком кружились над небольшой территорией, что свойственно птицам при охране потомства.

Наши поиски с надеждой обнаружения их гнезда оказались безуспешными. Однако за все время наблюдений птицы по-прежнему продолжали летать над нами и издавать тревожные крики. 22 июля поведение птиц оставалось прежним. В тот же день обе птицы были добыты сотрудниками хозяйства. По их сообщению, 19-го июля на том же участке были добыты еще три птицы.

Описанное поведение птиц, наличие наседного пятна и размеры гонад (левый семенник—10×5 мм, правый—7×2 мм, яичник—10×

7 мм, фолликула 1—3 мм) свидетельствуют о гнездовании белохвостой пегалицы в долине Аракса, а следовательно, и о значительном расширении границ ее гнездования к западу.

У добытых экземпляров белохвостой пегалицы отмечена сильная обношенность оперения в области головы, на щеках, затылке, второстепенных и третьестепенных маховых, рулевых и кроющих перьев спины. При этом степень обношенности рулевых перьев самки по сравнению с самцом незначительна. У последнего обношены также кончики первостепенных маховых перьев.

Примеры частей тела самца и самки белохвостой пегалицы приводятся в таблице.

Примеры частей тела белохвостой пегалицы, мм

Пол	Длина крыла	Длина клюва	Длина хвоста	Длина ноги	Масса
Самец	180,0	32	80,0	75	138,5
Самка	175,0	31	75	70	114,0

Приведенные данные позволяют считать эту птицу гнездящейся в пределах республики.

Судя по датам сроков весеннего прилета белохвостой пегалицы в низовья Амударьи [1], наиболее вероятным сроком ее появления весной на юге Армении следует считать апрель—май месяцы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аметов М. Б. Узбек биологический журнал. 3, 44—47, 1987.
2. Гладков Н. А. Кулики. Птицы СССР. М., 3, 106—108, 1951.
3. Иванов А. И. Каталог птиц СССР. 77—78. М., 1976.
4. Степанян Л. С. Состав и распределение птиц фауны СССР. 173, М., 1975.

Поступило 20.11.1991 г.