ВЛИЯНИЕ СУКЦИНАТА НАТРИЯ НА КОМПОНЕНТЫ МЕМБРАН РАЗМОРОЖЕННЫХ И ОТМЫТЫХ ЭРИТРОЦИТОВ

И.А.КАЗАРЯН, М.А.САРКИСЯН, С.Р.ГАСПАРЯН, А.В.СААРЯН,
А.В.АНТОНЯН

Республиканский гематологический центр МЗ Армении, 375014, Ереван

Исследовано влияние сукцината натрия на скорость гемолиза, содержание 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах, уровень фосфолипидов мембран и скорость перекисного окисления липидов. Предлагается использование сукцината натрия как нового ингредиента в составе ресуспендирующего раствора размороженных и отмытых эритроцитов для увеличения сроков хранения их до трех суток при 4°C.

Հետազոտվել է նատրիումի սուկցինատի ազդեցությունը հեմոլիզի արագության, էրիթրոցիտներում 2,3-դիֆոսֆոգլիցերատի պարունակության, մեմբրանների ֆոսֆոլիպիդների մակարդակի և լիպիդների գերօքսիդացման արագության վրա: Առաջարկվում է, օգտագործել նատրիումի սուկցինատը որպես նոր բաղադրամաս հետաառնեցված և լվացված էրիթրոցիտների վերակախույթային լուծույթի կազմում նրանց պահպանման ժամկետը 4°C-ում մինչև 3 օր երկարացնելու նպատակով:

The influence of sodium succinate on the hemolysis rate, on the content of 2,3-diphosphoglycerate in erythrocytes, on the level of membranes phospholipids and the peroxidation rate of lipids has been studied. The application of Na-succinate as a new ingredient in the composition of resuspended solution of defrosted and washed erythrocytes for increasing the terms of their storage till 3 days at 4°C is suggested.

Мембраны эритроцитов - сукцинат натрия

Как известно, современные методы консервации эритроцитов путем замораживания жидким азотом (при -196°C) позволяют сохранять их пригодными для переливания в течение ряда лет. Вместе с тем эти методы не лишены недостатков и не всегда обеспечивают надежную воспроизводимость результатов. Так, размороженные и отмытые эритроциты, ресуспендированные специальными растворами, содержащими компоненты, близкие к плазме крови (сахароза, NaCl, фосфатные соли и т.д.), восстанавливают свои функции в течение 24 часов после их замораживания. Дальнейшее хранение эритроцитов при 4°C не рекомендуется, так как при этом происходит значительное

усиление процессов гемолиза эритроцитов, деградация липидных компонентов мембран, активация перекисного окисления липидов (ПОЛ), снижение уровня АТФ, 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) - основного энергетического субстрата эритроцитов, с нарушением их кислород-транспортной функции.

Сказанное свидетельствует о необходимости создания больших запасов крови, особенно редких групп, которые тем более необходимы при чрезвычайных ситуациях (острая необходимость возникла, например, при землетрясении в Армении). В связи с этим особый интерес представляют изучение факторов повреждения размороженных эритроцитов, разработка новых методов повышения их функциональной полноценности с одновременным увеличением сроков хранения при 4°.

Наша повеки в этом направлении привели к заключению, что эффективным может оказаться применение сукцината натрия - важнейшего метаболита цикла Кребса - активатора клеточного метаболизма. Выбор данного препарата обосновывался литературными данными [1,3,6,9].

Действие сукцината натрия на состояние размороженных эритроцитов изучали в процессе их хранения при 4° с целью определения его влияния на процесс гемолиза, содержание 2,3-ДФГ, состояние метаболизма фосфолипидов мембран эритроцитов и на скорость ПОЛ.

Материал и методика. Процесс кислотного гемолиза размороженных и отмывных эритроцитов изучали методом [5], содержание 2,3-ДФГ в эритроцитах - методом [4], фракционирование индивидуальных фосфолипидов - методом юнкослойной хроматографии [8] в модификации Казаряна и Элоая [2], на закрепленном слое силикатами марки ЛС - 5/40 мк (Чехословакия), липидный фосфор - по методу [7], активность перекисного окисления - по реакции мальонового диальдегида с тиобарбитуровой кислотой [10]. Полученные результаты статистически обработаны с использованием критерия достоверности и ранжий Финкел-Стьюдента.

Сукцинат натрия использовали в различных концентрациях (от 0,85 до 1,7 мМ/мл) в составе общепринятого ресуспендирующего раствора N 8в ЦНИИТК. Пронесъ раствора N 8в (г/г): сахара - 70,0; NaCl - 3,0; NaHPO₄ · 2H₂O - 2,0; NaH₂PO₄ · 2H₂O - 1,0; вода бидистиллированная - до 1000 мл. Размороженные и отмывные эритроциты исследовали сразу после размораживания, а также после ресуспендирования раствором N 8в в условиях присутствия сукцината натрия и с добавлением различных концентраций его через трие суток после хранения при 4°. Контролем служили эритроциты, выделенные из донорской крови.

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных исследований показали, что влияние сукцината натрия на скорость гемолиза в зависимости от применяемых концентраций неоднозначно - (рис.1). Максимальный эффект отмечался при использовании 1,45-

1,7мМ/мл сукцината натрия.

Такое же положительное действие оказывал сукцинат на уровень 2,3-ДФГ в эритроцитах (рис.2). Повышение этого показателя, по-видимому, связано как со сдвигом рН в щелочную сторону [6], играющим

Рис.1 Изменение скорости гемолиза размороженных и отмытых эритроцитов на третий день хранения при 4°.

Рис.2 Изменение содержания 2,3-дифосфоглицерата размороженных и отмытых эритроцитов на третий день хранения при 4°.

К-контроль: 1-эритроциты без сукцината натрия; 2,3,4-эритроциты с различными концентрациями (0,85; 1,0 и 1,5мМ/мл) сукцината натрия.

определенную роль в поддержании синтеза 2,3-ДФГ [9], так и за счет предотвращения утечки ионов калия из эритроцитов [7], что в конечном итоге может влиять на кислород-транспортную функцию эритроцитов.

При хранении размороженных и отмытых эритроцитов при 4° повышается активность ПОЛ (рис.3). Добавление к среде ресуспендирования сукцината натрия частично предотвращает этот процесс, что связано, по всей вероятности, с увеличением глутатиона в SH-группы [3,9], т.е. с антиоксидантными свойствами препарата.

Действие сукцината натрия характеризуется также поддержанием уровня α-глицерофосфата (рис.4) - основного исходного метаболита биосинтеза фосфолипидов биомембран, связанного с достаточным содержанием АТФ в эритроцитах. Хранение размороженных и отмытых эритроцитов при 4° приводит к

Рис.3 Изменение концентрации малонового диальдегида размороженных и отмытых эритроцитов на третий день хранения при 4°.

К-контроль: 1- эритроциты без сукцината натрия; 2,3,4-эритроциты с различными концентрациями (0,85; 1,0 и 1,5мМ/мл) сукцината натрия.

нарушению липолиза в результате намечающейся деградации фосфолипидов мембран.

Добавление сукцината натрия к эритроцитарной массе приводит к нормализации концентрации как лизофосфатидилхолинов - цитотоксичных продуктов липолиза, так и некоторых других важнейших структурных фосфолипидов, в том числе фосфатидилинозитов, сфингомиелинов и, частично, фосфатидилхолинов мембран размороженных и отмытых эритроцитов на третий день хранения при 4° (рис. 5). Эти изменения сопровождаются нормализацией фосфолипид-фосфолипидных отношений и восстановлением проницаемости эритроцитарных мембран. В пользу этого свидетельствуют литературные

Рис. 4 Изменение уровня глицерофосфата размороженных и отмытых эритроцитов на третий день хранения при 4°.

К - контроль; 1-эритроциты без сукцината натрия; 2,3,4-эритроциты с различными концентрациями (0,85; 1,0 и 1,5мМ/мл) сукцината натрия.

Рис. 5 Изменение уровня отдельных фракций фосфолипидов в мембранах размороженных и отмытых эритроцитов на третий день хранения при 4°.

1-лизофосфатидилхолины; 2-фосфатидилинозиты; 3-сфингомиелины; 4-фосфатидилхолины; 5-фосфатидилсеринами; 6-фосфатидилсерины; 7-полиглицерофосфолипиды.

данные об участии янтарной кислоты в регуляции K^+ , Na^+ -ого насоса [9] и в окислительно-восстановительных превращениях НАД [1], способствующей установлению баланса ее окисленных и восстановленных форм и тем самым регулирующей фосфатидогенез и процессы ПОД. Полученные данные, на наш взгляд, являются обоснованием необходимости более глубокого и разностороннего исследования эффективности применения этого препарата в отношении поддержания стабильности биомембран и, следовательно, функциональной активности эритроцитов.

ЛИТАРАТУРА

1. *Церкачев Э.Ф.* В кн.: Терапевтическое действие янтарной кислоты. 36-49, Пуццино, 1976.
2. *Казарян П.А., Элоян Д.В.* Хроматографические методы (распределительная и адсорбционная хроматография). М., 1982.
3. *Кондрашова М.Н.* Автореф. докт. дисс., Пуццино, 1971.
4. *Луганова И.С., Блинов М.Н.* Лабор. дело, 652-654, 1975.
5. Определение кинетических параметров гемолиза эритроцитов методом непрерывной автоматической регистрации. Методич. рекомендации (составители: Адамян К.Г., Оганесян С.С. и др.), Ереван, 1981.
6. *Розенфельд А.С., Маевский Е.И.* В кн.: Терапевтическое действие янтарной кислоты 150-152, Пуццино, 1976.
7. *Светишев В.И.* Автореф. канд. дисс., Владивосток, 1973.
8. Хроматография в тонких слоях. Под. ред. Э.Цтляля, М., 1965.
9. *Фрейдман С.Л., Хлебников А.Н.* В кн.: Терапевтическое действие янтарной кислоты. 49-55, Пуццино, 1976.
10. *Brit J. Nematology*, 20, 95-111, 1971.

Поступила 10.IX.1995

Биолог. журн. Армении, 1-2 (50), 1997

УДК 579.66.578.81.579.871.8

ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ
 ФТОРПИРОВАТЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МУТАНТОВ У
BREVIBACTERIUM LACTOFERMENTUM

Ջ.Լ. ԱԳԱԵԿՅԱՆ, Մ.Բ. ՇԻՏՅԱՆ, Դ.Դ. ՕԳԱՆԵՅՈՎԱ, Ս.Ա. ՕԳԱՆԵՅԱՆ, Շ.Վ. ԿԱԶՅԱՆ, Ն.Տ. ԱՎԵՏԻՅԱՆ

НИИ "Биотехнология", ООО "Фармаген", 375056, Ереван

Получена коллекция ФП-чувствительных мутантов на основе продуцента лизина *B. lactofermentum* НИТИА-88. Мутанты классифицированы по чувствительности к дозе аналита и лизинсинтезирующей активности.

Ստացված է ֆտորպիրովատի (ՖՊ) նկատմամբ զգայուն մուտանտների հավաքածու, որի հիմքն է հանդիսանում լիզին-արտադրիչ *B. lactofermentum* ՆԻՏԻԱ-88 շտամը: Մուտանտները դասակարգված են ըստ ՖՊ-ի նկատմամբ զուցաբերած զգայունության և լիզին սինթեզող ակտիվության:

On a base of the strain *B. lactofermentum* NITIA-88, a lysine producer, the fluoropyruvate (FP) sensitive mutants collection was obtained. The mutants were classified by the level of FP sensitivity and lysine production.