ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ТЕРАПИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОПТИКО- СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛОПРОТЕИНОВ КРОВИ

СЕРГЕЙ С. АЛЕКСАНИЯ

Институт биохимии НАН РА, 375014, Ереван

Лекарственные препараты (ЛП), используемые для терапии сердечно-сосудистых заболеваний (строфантин, преднизолон, тринитроглицерин, вурдон и дигоксин), по-разному изменяют опτικο-спектральные показатели и биологическую активность металлопротеинов - регуляторов метаболизма активных форм кислорода в крови после четырехдневного инкубирования при 4° растворов этих металлопротеинов (МП) и ЛП в аэробных условиях *in vitro*.

Սիրտ-անոթային հիվանդությունների բուժման ժամանակ օգտագործվող դեղամիջոցները (ստրոֆանտին, պրեդնիզոլոն, տրինիտրոգլիցերին, վուրդոն, դիգոքսին) տարբեր կերպով են փոփոխում արյան մեջ թթվածնի ակտիվ միացությունների նյութափոխանակությունը կարգավորող մետաղապրոտեինների օպտիկական-սպեկտրալ բնութագրերը և կենսաբանական ակտիվությունը այդ դեղամիջոցների և մետաղապրոտեինների լուծույթների ախրոբ պայմաններում 4 օր 4°-ում ինկուբացման հետևանքով *in vitro*։

The medicinal preparations (strophanthin, prednisolone, trinitroglycerin, vurdon, digoxin) which are used during therapy of the cardio-vascular diseases charge differently the optical-spectral characteristics and biological activity of metalloproteins – the regulators of metabolism of reactive oxygen species after incubation of solutions of these metalloproteins and medical preparations in aerobic conditions during 4 days at 4° *in vitro*.

Металлопротеины - лекарственные препараты - активный кислород

Лекарственные препараты (ЛП) лазикс (фуросемид) фирмы «Aventis», тринитроглицерин фирмы «Шварц Фармааг», преднизолон фирмы «Никомед», строфантин фирмы «Галичфарм», вурдон и дигоксин фирмы «Глаксо Смит Клине» в настоящее время используются при терапии сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, сердечная аритмия, гипертония, атеросклероз, сердечная недостаточность) [1-3]. Однако под воздействием этих ЛП наблюдаются некоторое отклонение от нормы эндогенных уровней металлопротеинов (МП) крови - регуляторов метаболизма активных форм кислорода, а также изменение антиоксидантного и прооксидантного статусов сыворотки крови и эритроцитов больных с возникновением соответственного фона оксидативного стресса. Для выявления механизмов воздействия ЛП *in vivo* необходимо определить характер их действия на опτικο-спектральные показатели и биологическую активность МП крови *in vitro*.

Целью работы являлось определение изменений опτικο-спектральных характеристик, активности антиоксидантного действия МП (Cu, Zn - СОД, каталаза, церулоплазмин и трансферрин) и прооксидантного действия МП крови (цитохром b 558 III (цит. b 558 III) мембран эритроцитов и супероксидпродуцирующий липопротеин сыворотки - супрол) под воздействием соответствующих доз ЛП *in vitro*.

Материал и методика. Металлопротеины (МП) антиоксидантного действия (СОД и каталаза - из растворимой фракции эритроцитов, церулоплазмин - ЦП и трансферрин - ТФ из сыворотки крови) и МП прооксидантного действия (супрол и цит. b 558) получали биотехнологическим способом, без использования детергента [5-9]. При этом белковые фракции сыворотки, растворимой фракции эритроцитов и мембран эритроцитов подвергали ионообменной хроматографии на целлюлозах ДЕ-52 и КМ-52 («Whatman», Англия), сефадексе ДЕАЕ А-50 («Pharmacia», Швеция) и гель - фильтрации на биогеле Р-100 («Reanal», Венгрия) и сефадексе G-100 («Pharmacia»). Эти МП (кроме супрола) очищены до электрофоретически гомогенных состояний и растворены в 0,01 М калий - фосфатном буфере, рН 7,4 (КФБ). Лазик (10 мг/мл), тринитрогллицерин (10мг/мл), преднизолон (10 мг/мл), строфантин (0,25 мг/мл), вурдон (10 мг/мл) и дигоксин (0,25 мг/мл) по 0,5 мл смешивали с 0,5 мг/мл раствора МП (по 3 мл) и инкубировали в течение 4-х дней при 4°. К контрольным пробам МП были добавлены 0,5 мл воды или физиологического раствора.

Количество МП определяли измерением плотности характерного максимального оптического поглощения для цит. b 558 III при 530 нм, супрола - 430 нм, ТФ - 470 нм и ЦП - 610 нм. Супероксиддисмутазную (СОД) активность фракций и супероксидпродуцирующую активность супрола и цит. b 558 III определяли с использованием нитротетразолиевого синего (НТС), путем вычисления процента подавления (в случае СОД) или методом стимулирования (в случае супрола или цит. b 558 III) образования формазана (при 560 нм). За единицу СОД активности принимали то количество фракции, которое вызывает 50%-ное ингибирование образования формазана в результате восстановления НТС супероксидными радикалами. За единицу супероксидпродуцирующей активности супрола или цит. b 558 III принимали то количество белка, которое способно стимулировать на 50% образование формазана. Каталазную активность определяли перманганатометрическим титрованием раствора перекиси водорода, рассчитывая то количество белка, которое расщепляет 0,1 М перекиси водорода за 1 мин при 20°. Удельная активность СОД или каталазы была определена в расчете на 1 мл эритроцитов. Удельная супероксид - продуцирующая активность супрола или цит. b 558 III была определена в расчете на 1 мл сыворотки или 1 мл эритроцитов соответственно. СОД-миметическая активность ЛП была определена в расчете на 1 мг этих препаратов. Метгемоглобин (мет.Нв, с $A_{560}=0,6$) восстанавливающая активность цит. b 558 III ($A_{530}=0,02$) была определена кинетическим методом, путем измерения прироста величины плотности максимального оптического поглощения образовавшегося феррогемоглобина (ферроНв) при 555 нм в течение 4-х дней при 20° [13, 11], в отсутствие и при наличии определенного количества (1 мг) ЛП. Степень рилизинг эффекта цит. b 558 III из эритроцитарных мембран (степень отщепления цит. b 558 из этих мембран при рН 7,4 при инкубировании последних в отсутствие и при наличии ЛП (1 мг/мл) в течение 4-х дней при 4° в аэробных условиях) определяли оптическим спектральным методом, путем измерения плотности максимального оптического поглощения отщепленного цит. b 558 в гомогенной фазе при 530 нм. При этом использовали очищенные от следов Нв эритроцитарные мембраны (по 2 мл, смешанные с 0,04 М КФБ) из свеженабранной донорской крови. Оптические спектральные измерения осуществляли на спектрофотометре «Spesord UV-VIS (Германия) с длиной оптического пути 1 см. Ионообменную хроматографию и гель-фильтрацию белковых фракций осуществляли, поместив смолы в стеклянные колонки различных размеров (3x20, 2x20, 1x15 см). В ходе получения и очистки МП были также использованы центрифуги К-24 и К-70 (Германия).

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли методом вариационной статистики Стьюдента-Фишера с определением критерия «Р».

Результаты и обсуждение. После 4-дневного инкубирования ЛП,

используемых при терапии сердечно-сосудистых заболеваний (лазикс, тринитроглицерин, преднизолон, строфантин, вурдон и дигоксин) с МП донорской крови антиоксидантного действия (СОД, каталаза, ЦП и ТФ) и с МП прооксидантного действия (цит. в 558 III и супрол) в подавляющем большинстве случаев наблюдается снижение активности СОД, каталазы и плотности максимального поглощения ЦП (при 610 нм) и цит. в 558 III (при 530 нм), а также метHb - восстанавливающей активности цит. в 558 III (табл.).

Таблица. Относительные изменения (%) уровней и активности МП под воздействием ЛП, по сравнению с 100%-ными контрольными показателями (P < 0,05, n=12)

МП и активность	Лазикс	Тринитроглицерин	Преднизолон	Строфантин	Вурдон	Дигоксин
O ₂ -продуцир. активн. супрола	-62,5±6,1 P<0,01	+2,1±0,2	-12,3±1,4	-7,5±0,3	-87,5±8,4 P<0,03	не влияет
O ₂ -продуцир. активн. цит. в 558 III	-15,4±2,1	-20,0±2,3	не влияет	-25,0±3,3 P<0,001	-101,0±8,3	-30,1±3,1 P<0,03
Мет. Hb-восстановл. активн. цит. в 558 III	не влияет	-12,4±1,6	-16,1±2,0	не влияет	-31,5±2,9	не влияет
ЦП	-21,3±2,4	не влияет	-61,1±3,4 P<0,01	не влияет	-30,3±3,1 P<0,001	не влияет
Cu, Zn - СОД активность	-12,4±1,1	+5,4±0,2	-21,1±2,3	не влияет	-26,7±2,4	-8,7±1,0
Каталаза активность	-29,3±2,1	-33,2±2,4 P<0,03	не влияет	-64,7±3,1	-71,7±4,3 P<0,03	не влияет

Эти ЛП по-разному взаимодействуют с МП. Заметно снижается супероксидпродуцирующая активность супрола под воздействием лазикса и вурдона, остальные ЛП практически не инактивируют супрол. Понижение супероксидпродуцирующей активности супрола так или иначе снижает уровень липидной пероксидации этого НАДРН-содержащего липопротеина высокой плотности, продуцирующего супероксиды в присутствии следов ионов переходных металлов (Fe³⁺, Cu²⁺), предотвращая этим самоагрегацию супрола [8]. Это в свою очередь предотвращает повышение вязкости сыворотки, что является положительным эффектом для организма. Супероксидпродуцирующая активность цит. в 558 III ощутимо снижается под воздействием ЛП. Это может быть положительным эффектом с точки зрения того, что продуцируемые супероксиды могут вызывать дестабилизацию (липидную пероксидацию) эритроцитарных мембран [12, 14]. Однако снижение супероксидпродуцирующей активности может и отрицательно влиять на метаболические процессы в мембранах эритроцитов, происходящие с участием супероксидных радикалов. Какие из этих явлений более доминирующие, покажут дальнейшие исследования. Выявленная недавно метHb-восстанавливающая активность цит. в 558 III [13, 11] практически мало изменяется под воздействием ЛП (табл.), за исключением вурдона,

Рис. 1. Оптические спектры ЦП после 4-дневного инкубирования при 4° с ЛП: в отсутствие ЛП (1) и в присутствии лазикса (2), вурдона (3) и преднизолона (4).

Рис. 2. Оптический спектр цит. b 558 III, после его 4-дневного инкубирования при 4° с ЛП: в отсутствие ЛП (1) и в присутствии строфантина (2), дигоксина (3), лазикса (4), нитроглицерина (5) и преднизолона (6).

Рис. 3. Изменение оптического спектрального индекса (A_{412}/A_{530}) цит. b 558 III: в отсутствие ЛП (1) и в присутствии 1 мг строфантина (2), лазикса (3), дигоксина (4), нитроглицерина (5) и преднизолона (6).

который снижает эту активность. Изменение метHb-восстанавливающей активности цит. b 558 III так или иначе может влиять на кислородный гомеостаз крови. МетHb не способен перенести молекулярный кислород, уровень его повышается при злокачественных новообразованиях. Лазикс, преднизолон и вурдон необратимо снижают интенсивность поглощения ЦП (при 610 нм) - белка острой фазы, деградируя его (рис.1) [4]. Это может вызывать увеличение уровня супероксидов и ионов меди в крови, создавая определенный фон оксидативного повреждения различных компонентов крови.

Высокотолерантное действие против приведенных ЛП оказывает ТФ (не изменяются его опико-спектральные показатели). ЛП снижают активность ключевых МП антиоксидантного действия, особенно каталазы, что крайне нежелательное явление и может быть причиной накопления перекиси водорода, а также вызывать оксидативный стресс (табл.).

Механизм воздействия упомянутых ЛП во многом связан с их СОД - миметической активностью, что для лазикса составляет $22,7 \pm 2,1$ ед/мг, строфантина - $110 \pm 8,5$ ед/мг и вурдона - $120 \pm 9,0$ ед/мг. Тринитроглицерин, преднизолон и дигоксин не обладают СОД-

миметической, а также каталазной активностью. ЛП неодинаково влияют на опико-спектральные показатели цит. b 558 III (рис. 2). Возможно, они влияют на хромофорную группу цит. b 558 III, снижая интенсивность поглощения

при 530 нм. Этот эффект более выражен под воздействием преднизолона, вызывая деградацию цит. в 558 III, основного гемопротейна мембран эритроцитов, и снижение текучести этих мембран. Однако такой вывод носит предварительный характер, так как было выявлено непосредственное действие преднизолона на цит. в 558 III в гомогенной фазе, а не в эритроцитарных мембранах (в гетерогенной фазе). ЛП по-разному изменяют и величину оптического индекса цит. в 558 III в гомогенной фазе (рис. 3). Они несколько изменяют и окислительно-восстановительные характеристики цит. в 558 III под воздействием дитионита натрия (рис. 4).

Рис. 4. Оптический спектр цит. в 558 III в окисленном (1) и восстановленном (2) дитионитом натрия (0,5 мг) состояниях: а — для нативного цит. в 558 III, б — отношение плотности поглощения при 558 нм к плотности поглощения при 525 нм на оптическом спектре поглощения цит. в 558 III после восстановления дитионитом натрия в отсутствие (1) и присутствии по 1 мг дигоксина (2), строфантина (2), лазикса (3), нитроглицерина (4) и преднизолона (5).

Этот эффект более выражен при действии преднизолона, снижая отношение A_{558}/A_{525} как фактора некоторого подавления процесса восстановления ионов железа в протетический группе цит. в 558 III. Для определения характера действия ЛП на эритроцитарные мембраны при процессе рилизинга (отщепления) цит в 558 из этих мембран были инкубированы ЛП с эритроцитарными мембранами при 4° в течение 4-х дней. Как показано на рис.5, процесс рилизинга цит. в 558 подавляется больше теми ЛП, у которых СОД-миметическая активность выше, например, вурдон подавляет рилизинг на 50%. Действительно, МП антиоксидантного действия (СОД и ЦП) и другие соединения такого же действия (ДМСО и богатый пролином полипептид из секреторных гранул мозга ПБП) заметно

Рис. 5. Процент подавления рилизинга цит. в 558 из эритроцитарных мембран: в отсутствие ЛП (К) и в присутствии 1 мг тринитроглицерина (1), преднизолона (2), дигоксина (3), лазикса (4), строфантина (5) и вурдона (6). Время инкубирования смеси эритроцитарных мембран с ЛП 4 дня при 4°.

подавляют рилизинг цит. в 558 из эритроцитарных мембран [10]. Можно констатировать, что последний обратно пропорционален СОД - миметической активности ЛП. Вероятно, он связан с липидной перекисидацией эритроцитарных мембран, которая подавляется антиоксидантными действиями препаратов [10]. Подавление рилизинга цит. в 558, несомненно, положительное мембраностабилизирующее явление. Таким образом, ЛП различного характера по-разному влияют (положительно или отрицательно) на уровень и активность МП анти- и прооксидантного действия - регуляторов метаболизма активных форм кислорода в крови. Возможно, такое различие характера действия ЛП на МП и эритроцитарные мембраны *in vitro* и *in vivo* отражается и на эффективности терапии сердечно-сосудистых заболеваний, что часто не приводит к достаточно желательным результатам [1-3].

Полученные результаты могут быть использованы для коррекции доз используемых ЛП при терапии сердечно-сосудистых заболеваний, особенно учитывая по-новому оцененные побочные эффекты ЛП.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексанян Сергей С., Симосян Г.М., Степанян А.А., Алексанян С.С., Симосян М.А. Вестник МАНЭБ Санкт-Петербурга., 9, 136-139, 2004.
2. Алексанян С.С., Степанян А.А., Симосян М.А. Вестник МАНЭБ Санкт-Петербурга, 8, 164-167, 2003.
3. Алексанян С.С., Симосян Р.М., Степанян А.А., Симосян М.А. Мед. наука Армении, 2, 62-65, 2003.
4. Мжельская Т.И. Бюлл. Эксп. Биол. Мед., 130, 124-132, 2000.
5. Симосян М.А., Симосян Г.М. Способ получения металлопротеинов. Лицензия изобретения N341 Армпатента, Ереван, 1997.
6. Симосян М.А., Симосян Г.М., Симосян Р.М. Способ получения цитохромов в из мембран эритроцитов. Лицензия изобретения N908 Армпатента, Ереван, 2001.
7. Симосян М.А., Бабаян М.А., Симосян Г.М. Биохимия, 60, 1977-1987, 1995.
8. Симосян Г.М., Бабаян М.А., Симосян Р.М., Симосян М.А. Биолог. журн. Армении, 52, 1, 18-21, 1999.
9. Симосян М.А., Карапетян А.В., Бабаян М.А., Симосян Р.М. Биохимия, 61, 932-938, 1996.
10. Симосян Р.М., Симосян Г.М., Бабаян М.А., Симосян М.А., Галоян А.А. Мед. наука Армении, 3, 13-18, 2003.
11. Симосян Р.М., Симосян Г.М., Бабаян М.А., Симосян М.А. Мед. наука Армении, 1, 43-46, 2004.
12. Miura T., Ogiso T. Chemical and Pharmaceutical Bulletin (Japan), 30, 3662-3670, 1982.
13. Simonyan G.M., Simonyan R.M., Babayan M.A., Simonyan M.A., Galoyan A.A. Intern. Conf. The roll of the Biologically Active Substances in the integrative Activity of the Organizm in Normal Conditions and in the Process of Adaptive Syndrome Formation. Yerevan State Med. University, 148-149, 2003.
14. Tien M., Svingen B.A., Aust S.D. Fed. Proc., 40, 179-182, 81.

Поступила 15.IV.2004