



Биолог. журн. Армении, 4 (61), 2009

НОВЫЕ ДАННЫЕ К ФАУНЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ ДАЛЬНОГО ВОСТОКА СЕМЕЙСТВ ВОДОЛЮБОВ И ЩЕЛКУНОВ (COLEOPTERA: HYDROPHILIDAE, ELATERIDAE)

М.А.МАРДЖАНИЯ

Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН Республики Армения

Для фауны Сахалина впервые указаны 6 видов из семейств водолюбов (1) и щелкунов (5).

Щелкун - водолюбы – распространение - новые данные - о. Сахалин

Առաջին անգամ Սախալինի ֆաունայի համար նշվում է բզեզների 6 տեսակ՝ ջրասերների(1) և չրխկանների(5) ընտանիքներից

Չրխկաններ – ջրասերներ – տարածվածություն - նոր տվյալներ – Սախալին կղզի

1 species of Hydrophilidae and 5 species of Elateridae are recorded in the fauna of Sakhalin island.

Liver – endotheliocytes - Kupffer cell -lipocyte

Elateridae – Hydrophilidae - distribution - new data - Sakhalin island

Щелкуны Дальнего Востока изучались рядом специалистов, в основном Гурьевой [1-3], Криволицкой [4]. Обобщенные сведения по водолюбам находим в Определителе насекомых Дальнего Востока [5]. В материалах, любезно предоставленных М.Ю. Калашняном, нами были выявлены 6 видов водолюбов и щелкунов, оказавшихся новыми для фауны о. Сахалин. Ниже приводим данные их этикеток. Сокращения географических названий приводятся согласно Определителю насекомых Дальнего Востока [2-5].

Hydrophilidae - водолюбы

Cercyon symbion Shatr.

Распространение: Япония; Ц. Сахалин, 7 км ЮЮЗ п. Восточный, берег Охотского моря, 18-19.07.2003., И. Мельник.

Примечание: этот вид отличается от близкородственных видов *C. dix* Sharp. и *C. numerosus* Shatr. лишь по строению эдеагуса., причем все три вида указаны из Японии, а для вида *C. dix* Sharp. Шатровский А.Г. с сомнением указывает Курильские острова.

Elateridae - шелкуны*Crepidophorus rufiventris* Eschz

Распространение: Саяны, Алтай, Амур., Прим.: Сахалин – Стланиковый хр., дол. ручья Прямой, 50°47'40N 143°05'26E, 10.07.2003. И. Мельник.

Cr. expolitus Gur

Распространение: Саяны, Алтай, Прим.: Сахалин - Стланиковый хр., дол. руч. Прямой, 50°47'40N 143°05'26E, 10.07.2003, И.Мельник.

Cr. laetus Cand

Распространение: Прим.: Сахалин – Ю. Сахалин, 14 км ЭСЗ, п. Лесное, дол. р. Песновка, 46°57'33N 142°54'34E, 23-30.06.2003, И. Мельник.

Hypnoidus hyperboreus Gyll.

Распространение: Якут., Чит., Бур., ЮЗ Сиб., Магд., Камч., Хаб., Амур., Прим.; Сахалин - Ц. Сахалина, 7 км ЮЮЗ, п. Восточный, б. Охотского моря 48°12'09N 142°38'10E, 18-19.07.2003, И. Мельник.

Liotrichus affinis Payk.

Распространение: Якут., Чит., Бур., З. Сиб., хр. Тарбагатай, Магд., Камч., Хаб., Амур., Прим.; Сахалин – Ю. Сахалин п-в Крильон, окр. п. Шебунина, 46°24'47N 141°50'59E, 12,14.06.2003. И. Мельник.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гурьева Е.Л. Жуки – шелкуны (Elateridae). Подсемейство *Elaterinae*. Л., Наука, (Фауна СССР: Н.С. № 118. Жесткокрылые. 12, вып. 4). 1979.
2. Гурьева Е.Л. Жуки – шелкуны (Elateridae). Подсемейство *Athoinae*. Триба *Stenicerini*. Л., Наука, (Фауна СССР: Н.С. № 136. Жесткокрылые, 12, вып.3). 1989а.
3. Гурьева Е.Л. Семейство Elateridae – шелкуны. Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Л., Наука, 1989 б.
4. Криволицкая Г.О. Реф. докл. совещания по изучению лесов Дальнего Востока. Владивосток: ДВФ СО АН СССР, 256-259. 1967.
5. Шатровский А.Г. Семейство Hydrophilidae – водолюбы. Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Л., Наука, 1989.

Поступила 12.05.2009.