

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Г. Д. Ярошенко

Staphylea pinnata L. в лесах Сев. Армении

В Арм. ССР *Staphylea pinnata* до сих пор описана не была. *Staphylea pinnata* (клекачка, по армянски—*շոշլու*) широко распространена в Сев. Армении: в садах селений Иджеван, В. Агдан, Узунтала и др.—Иджеванского района, в сел. Геташен—Севкарского района и сел. Тегут—Алавердского района, где это растение разводится в качестве плодовой культуры. Соленые цветочные почки этого растения употребляются в качестве острой приправы к пище.

В садах *Staphylea pinnata* растет по большей части на искусственно орошаемых участках, а также в виде живых изгородей у канав. В этих условиях порослевые кусты клекачки достигают высоты 7—8 м. в возрасте 10—15 лет, по достижении каковой высоты, энергичный рост в высоту прекращается.

Все осмотренные нами растения имели порослевый характер. В первые годы порослевые побеги клекачки дают годичный прирост в высоту до 1 метра. Клекачка в садах развивает очень ровные порослевые побеги с весьма твердой тяжелой древесиной, исключительно пригодные для тростей. В садах клекачка очень обильно плодоносит и здесь, в особенности в сел. Узунтала, могут быть без труда заготовлены в большом количестве ее семена, которые созревают в начале сентября.

Расспросы крестьян с целью выяснить происхождение культурных садовых растений клекачки не привели к существенным результатам. Крестьяне показали, что клекачка здесь издавна культивируется в садах и материал для посадок берется в соседних садах из пневой поросли, а также молодые кусты клекачки пересаживаются в сады из леса. Однако, по словам стариков крестьян в лесу сейчас клекачка растет везде в одичавшем виде на местах садов старых заброшенных и разрушенных селений. Действительно, большинство мест обитания дикой клекачки в окрестностях сел В. Агдан и Геташен, повидимому, приурочивается к местам старых заброшенных селений.

Нами были подробно обследованы местообитания *Staphylea pinnata* в лесах, примыкающих к сел. Узунтала, Иджеванского района.

Здесь местообитания дикой (или одичавшей) клекачки приурочены к сырым ложбинам и мощным богатым почвам. Здесь местообитания клекачки можно подразделить на 2 группы. К первой относятся местообитания клекачки в участках Нор-Ахбюр, Хачи-Гяз и другие.

Здесь заросли клекачки встречаются вдоль ручьев по нижней опушке букового леса, на северных склонах, на высоте около 800 м над ур. моря. *Staphylea pinnata* здесь растет вместе с *Corylus avellana*, *Mespilus germanica*, *Crataegus pentagyna* и др. кустарниковыми породами, входящими обычно в состав подлеска в буковых лесах. В этих местах кустарники развились, повидимому, из подлеска на местах вырубленного букового леса. Из травянистых растений заросли клекачки здесь обычно сопровождаются зарослями *Sambucus ebulus*. Кроме того по нижней опушке букового леса, на высоте 800—850 м над ур. моря клекачка нередко встречается в подросте под пологом бука. Возраст подроста 5—10 лет; возраст букового леса 120—180 лет.

Другой характер имеет местообитание *Staphylea pinnata* в урочище Агабеки-мат—участок Джонджолкут, примерно в 4 километрах выше селения Узунтала. По преданию крестьян в этом месте в древние времена также находилось оставленное потом жителями село. Однако сейчас никаких следов от старого села нами не обнаружено. Здесь *Staphylea pinnata* растет в виде подлеска в буковом лесу вместе с *Sambucus nigra* и *Lonicera caucasica*, в сырых ущельях на северных и западных склонах. Буковый лес здесь имеет возраст около 120—150 лет; возраст клекачки 15—25 лет. Клекачка здесь поднимается до высоты примерно 1200 м над ур. моря. Она встречается в буковом лесу типа *Fagetum ruderales*, под пологом бука полноты 0,7 и удовлетворительно возобновляется семенным путем. Она является весьма теневыносливой породой, однако, в тени она растет очень медленно; высота кустов в возрасте 15—25 лет—1,0—1,5 м. Порослевые побеги в первом году дают прирост в высоту около 0,5 м, на следующем году годичный прирост падает до 25 см, а дальше падение прироста заметно еще более. Затененные кусты клекачки неровны—кривятся. Общий габитус таких экземпляров поэтому не имеет ничего общего с кустами клекачки, растущими на освещенных местах в садах.

Сейчас клекачка в ур. Агабеки-мат растет безусловно в диком виде. Так как буковый лес может возникнуть только под пологом какого-либо леса, то здесь вообще склоны покрыты лесом не менее, чем 300 лет; возраст же кустов клекачки сейчас не превышает 25 лет. Следовательно сейчас о культурном происхождении этой клекачки не может быть и речи. Из этого урочища, по словам крестьян, происходит большинство растений, культивируемых сейчас в садах селения Узунтала.

Вопрос о том, как занесен *Staphylea pinnata* в ур. Агабеки-мат

сейчас остается открытым, но этот вопрос существенного значения и не имеет. Сейчас клекачка нашла здесь для себя благоприятные экологические условия и растет безусловно в диком виде. Вообще же горы Сев. Армении издавна были населены, при чем в разные исторические периоды население гор Сев. Армении подвергалось сильным колебаниям, вследствие чего антропогенные факторы вообще играли в Армении всегда большую роль в лесных сукцессиях, в процессах расселения лесных растений. Не исключена поэтому возможность и участия человека в расселении *Staphylea pinnata*.

Ботанический Сад Академии наук
Арм. ССР

Գ. Գ. Յարոշենկո

Staphylea pinnata L. ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐՈՒՄ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

Staphylea pinnata-ն տարածված է Իջևանի և Ալավերդու շրջանների գյուղերի այգիներում. նրան երբեմն կարելի է հանդիպել նաև անտառների ծածկոցի տակ: Ըստ երևույթին *Staphylea pinnata*-ն սկզբնորում Հայաստան է մտցրվել որպես այգեգործական կուլտուրա. այժմ նրան տեղ-տեղ կարելի է հանդիպել վայրենացած դրուժյաժք. անտառներում նա բավարար կերպով վերածում է սերմերով:

G. D. Yaroshenko

Staphylea pinnata L. in the forests of Northern Armenia

S u m m a r y

Staphylea pinnata is spread in the orchards of the villages of the Idjevan and Alaverdy districts. However, one can also meet it in the wild-state in the beech forests of the same districts. Apparently, *Staphylea pinnata* originally has been introduced to Armenia as a culture-plant, but its wild form is being grown in the forests nowadays. It is here also because seeds can sufficiently favour its regrowth.