

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

А. А. Саркисов

К акклиматизации лесной куницы в Армянской ССР

Кавказская лесная куница (*Martes martes lorenzi* Ognev) (у пушников „желтодушка“) является среди заготавливаемых пушных видов животных Закавказья одним из лучших объектов. Поэтому, она во всех странах преследуется промышленниками. В Закавказьи же, по сведениям Е. Л. Маркова (1934), из года в год она сокращается в количестве ввиду его перепромысла.

На территории Союза добывается, считая и куницу-белодушку, около 50 тысяч шт., в западной Европе—до 100 тысяч штук в год (Б. М. Житков, 1928), а по Закавказью в 1932 году было заготовлено 4162 куницы.

К сожалению, область ее горизонтального распространения в Закавказьи не вполне выяснена.

К. А. Сатунин (1915) считает „существование лесной куницы в горах Малого Кавказа и Талыша недоказанным. Возможно, что ее исчезновение здесь произошло уже в недавнее время. При раскопках могил народа Урарту, относящихся приблизительно ко времени за 3000 лет тому назад, в совершенно безлесной теперь местности, к югу от озера Гокча, были найдены черепа лесной куницы. Она исчезла здесь вместе с лесом“.

А. Б. Шелковников (in litter, 1931) указывал на нахождение в лесах северо-западной Армении этой куницы. То же сообщает Марков, а именно: лет тридцать тому назад лесная куница в небольшом количестве встречалась в Чатахских лесах (б. Борчалинский уезд)“. Мы же считаем, что в настоящее время лесной куницы в Армении нет: все наши попытки выявить это животное в лесах западной Армении не дали никаких результатов, а в пушных заготовках по Республике она вовсе не встречается.

Лесная куница исключительно ночной хищник: изредка появляется также и днем. Любит самые глухие, безлюдные ущелья, покрытые дремучими вековыми буково-грабовыми лесами с примесью каштана, черешни и липы. В таких горных лесах она находит суховершинные дуплистые деревья, где устраивает свои гнезда. Изредка держится также вблизи людских поселений (большей частью осенью) и приносит большой вред, нападая часто не только на мелких птиц и млекопитающих, но и на животных, по размерам превышающих ее в два—три раза.

Основную пищу лесной куницы, по Н. К. Верещагану (1942), составляют: ящерицы, птицы, лесные мыши (*Apodemus flavicollis*, *A. Silvaticus*), полчки, лесные сони, кавказская белка, летом — ягоды, черешня, малина, кизил, алыча, осенью — буковые орешки, каштаны, и, наконец, мед диких пчел.

Продолжительность беременности обычно колеблется от 236—237 до 273—274 дней. Молодые появляются на свет (от 2 до 6) в апреле или в начале мая. В конце сентября выводки расходятся. Новое поколение способно к размножению, видимо, на следующее лето. Живет лесная куница от 10 до 12 лет.

Лесная куница может быть без особых трудностей акклиматизирована в условиях северо-западных лесных районов Армянской ССР. Однако следует завести животных и выпустить в соответствующие уголья после предварительного и детального изучения вопроса, т. к. в деле акклиматизации новых видов в пределах Армянской ССР наблюдаются некоторые ошибки выпуск 120 голов уссурийских енотовидных собак (*Nyctereutes procyonoides ussuriensis* Matsch.) в 1934 году в Кироваканском районе, где, вопреки утверждению С. К. Даля (1941), по данным Управления по делам охоты при Совете Министров Арм ССР, енотовидные собаки не только не размножались, но их здесь вообще нет; выпуск 40 голов (♂♂—15, ♀♀—25) южно-американского болотного бобра, или нутрия (*Myopotamus coypus* Molina), в районе тростниковой растительности оз. Айгер-лич в 1940 г., вопреки выраженному нами (1946) опасению, что грызун может стать вредителем полей, огородов и, в частности, рисовых полей, что и, к сожалению, произошло в самом деле. За этот сравнительно короткий срок нутрия размножилась до того, что заняв весь бассейн Айгерличского озера, проникла через Севджур и Раздан (Зангу) в Аракс и, по сообщениям давалинских охотников (Х. Саядян), появилась и в тростниковых зарослях близ с. Араздаан и даже на Араксе близ Минджевана и стала вредителем рисовых полей и огородов.

Таким образом, и в первом и во втором случае завоза в Армянскую ССР животных, не были детально разработаны вопросы акклиматизации здесь этих видов; поэтому их акклиматизация не дала ожидаемого эффекта.

В порядке обсуждения мы ставим вопрос о завозе в Армянскую ССР и выпуске в леса северо-западных районов Республики лесной куницы, исходя из следующих, благоприятных для акклиматизации зверька, моментов.

Лесная куница в Армянской ССР может быть только уничтожителем, в первую очередь, многочисленного количества видов грызунов, приносящих вред лесному хозяйству: кавказской белки (*Sciurus (Tenes) persicus anomalus* Gmelini), лесной сони (*Diromus nitedula tichomirovi* Sat.) полчека кавказского (*Glis glis tschetschenicus* Sat.) и, наконец, лесной мыши (*Sylvimus silvaticus* L.).

Леса северо-западных районов Армянской ССР могут полностью обеспечить кормом лесную куницу; здесь она имеет возможность получать в большом количестве буковые орешки, играющие в пищевом балансе зверька также большую роль.

Климат лесных районов северо-западной Армении по целому ряду пунктов вполне соответствует тому климату, в котором живет зверек: снеговой покров и низкая температура зимы лесных районов северо-западной Армении должны действовать исключительно благоприятно на опушение куницы. Вышедшие из этих районов куницы—белодушки по меховым качествам у пушников ценятся особо высоко.

Мы рекомендуем завезти в Армению лесную куницу из Северного Кавказа, первоначально в Кироваканский район, не более 100 голов (50 ♂♂ и 50 ♀♀).

Завезенную куницу необходимо некоторое время содержать в Кироваканском лисьем совхозе Министерства Внешней Торговли СССР или же лучше всего, после некоторой выдержки в условиях неволи, выпустить в соответствующие уголья в следующих пунктах: 1. Алавердский район—близ с. Лорут, в лесах Моткорской дачи, 2. Ноемберянский район—в лесах, расположенных близ с. Ахпат, 3. Иджеванский район—в лесах по долине реки Аксибар, 4. Кироваканский район—в Шагалинских лесах.

По нашему подсчету, если завезти в Армянскую ССР 50 пар лесной куницы и выпустить их в указанных выше пунктах, в течение пяти лет, при нормальной акклиматизации, число голов куниц дойдет до 6000, если в среднем годовой приплод от одной пары будет 3 головы и отход ежегодно выразится в 10% от общего количества куниц.

Таким образом, как видно по самому скромному подсчету, лесная куница в пределах Армянской ССР уже в течение первых пяти лет может быть предметом интенсивных заготовок и к тому же без особых затрат.

Управлению по делам охотничьего хозяйства при Совете Министров Армянской ССР необходимо заняться вопросом завоза и акклиматизации лесной куницы в Армению.

ЛИТЕРАТУРА

1. Верещагин Н. К. 1942. Каталог зверей Азербайджана.
2. Даль С. К. 1941. Данные о результатах акклиматизации снотовидных собак в Арм. ССР (Изв. Арм. ФАН АН СССР. № 1 (6)).
3. Житков В. М. 1928. Биология лесных зверей и птиц.
4. Марков Е. Л. 1934. Охотничье хозяйство Закавказья.
5. Саркисов А. А. 1946. Южно-америк. болотный бобр (*Myopotamus coypus* Molina) в Арм. ССР. Изв. АН Арм. ССР. Естеств. науки, № 5.
6. Сатунин К. А. 1915. Млекопитающие Кавказского края, том I.

Ա. Ա. Սարգիսյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԱԻՄ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԿԶԱՔՍԻ (Martes martes lorenzi Ognev) ՔԱՉՄԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

Հեղինակը գտնում է, որ այժմ Հայաստանի տնտեսներում հիմնականում գոյություն ունի այս թանկարժեք մուշտակավոր կենդանին։ Անասունների կրթությանը ապրում է խիստ անտառներում և հեղինակի կարծիքով հարող է բազմաճանաչ նաև Հայկական ՍՍՏ տնտեսներում։

Հեղինակն առաջարկում է Հայաստան ներմուծել 50 գույգ կրթության և բաց թողնել Կիրովականի, Ալավերդու, Նոյեմբերյանի և Իջևանի շրջաններում։