АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
АСТРОФИЗИКА

ТОМ 3

ФЕВРАЛЬ, 1967

ВЫПУСК 1

О ФАЗОВОЙ ПЛОТНОСТИ БЕЛЫХ КАРЛИКОВ НА
ДИАГРАММЕ ЦВЕТ — СВЕТИМОСТЬ

А. М. ЭЙГЕНСОН

Поступила 8 октября 1966

Исправлена 10 декабря 1966

При обычных предположениях относительно структуры белых карликов получена формула для их фазовой плотности на диаграмме цвет—светимость. Сопоставление результатов с наблюдательными данными свидетельствует в пользу правильности используемой модели.

Согласно обычной модели [1, 2], белый карлик состоит из выродившегося ядра и относительно тонкой оболочки. В таком случае светимость связана с внутренней температурой соотношением

$$L = A M T_{tr}^{3.5}, \quad (1)$$

где M — масса,

T_{tr} — температура переходного слоя, равная температуре практически изотермического ядра,

A — величина, зависящая от химического состава и равная [2]

$$A = 5.7 \cdot 10^4 \frac{\mu}{\mu_e^2} \cdot \frac{t/g}{Z(1+X)} \cdot \frac{1}{M_{\odot}}.$$

Здесь

$$\frac{1}{\mu} = 2X + \frac{3}{4}Y + \frac{1}{2}Z; \quad \frac{1}{\mu_e} = \frac{1}{2}(1+X),$$

g — множитель Гаунта,

t — гильотинный множитель, а остальные обозначения обычные.

С другой стороны, если единственным источником излучения является тепловая энергия атомных ядер, то светимость

$$L = - \frac{d}{d\tau} (B T_{\text{tr}} \cdot \mathfrak{M}). \quad (2)$$

$$\tau - \text{время}, \quad B = \frac{3}{2} \frac{k}{\mu_{\lambda} \cdot H}; \quad \frac{1}{\mu_{\lambda}} = X + \frac{1}{4} Y.$$

Исключая L из (1) и (2) и интегрируя, получаем

$$T_{\text{tr}} = \frac{1}{\left(\frac{1}{T_{\text{tr}(0)}^{2.5}} + 2.5 \frac{A}{B} \tau \right)^{0.4}}. \quad (3)$$

$$T_{\text{tr}(0)} = T_{\text{tr}} \text{ при } \tau = 0.$$

Подставим (3) в (1):

$$L = \frac{A \mathfrak{M}}{\left(\frac{1}{T_{\text{tr}(0)}^{2.5}} + 2.5 \frac{A}{B} \tau \right)^{1.4}}. \quad (4)$$

Перейдем к звездным величинам. Поскольку

$$M_{\text{bol}} = M_{\odot \text{bol}} - 2.5 \lg \frac{L}{L_{\odot}} = C_1 - 2.5 \lg L, \quad (5)$$

то, подставляя (4) в (5), получаем

$$M = C_1 - 2.5 \lg (A \mathfrak{M}) + 3.5 \lg \left(\frac{1}{T_{\text{tr}(0)}^{2.5}} + 2.5 \frac{A}{B} \tau \right). \quad (6)$$

(Здесь индекс при M_{bol} опускается).

Для дальнейшего полезно образовать из (6)

$$\frac{1}{T_{\text{tr}(0)}^{2.5}} + 2.5 \frac{A}{B} \tau = 10^{0.2857 \cdot M} \cdot 10^{-0.2857 \cdot C_1} \cdot A^{3/7} \mathfrak{M}^{5/7}. \quad (7)$$

Известно, что светимость связана с эффективной температурой соотношением

$$L = 4 \pi R^2 \cdot \sigma T_e^4. \quad (8)$$

Исключив L из (8) и (1), получим следующее соотношение между T_{tr} и T_e :

$$T_e = \left(\frac{A \mathfrak{M}}{4 \pi R^2 \sigma} \right)^{0.25} \cdot T_{\text{tr}}^{0.675}. \quad (9)$$

Примем такую систему цветов [3], при которой

$$CI \equiv C = \frac{\alpha}{T_{\text{цв}}} - \beta, \quad (10)$$

где $T_{\text{цв}}$ — цветовая температура, $\alpha = 7200$, $\beta = 0.55$.

Полагая $T_{\text{цв}} = T_e$, из (9) и (10) получаем с помощью (3)

$$C = \alpha \left(\frac{4\pi R^2 \sigma}{A \Sigma R} \right)^{0.25} \left(\frac{1}{T_{\text{тр}(0)}^{2.5}} + 2.5 \frac{A}{B} \tau \right)^{0.35} - \beta. \quad (11)$$

Образум функцию

$$\rho(M, C) = \rho_1(\Sigma R, \tau) \cdot \frac{1}{\frac{D(M, C)}{D(\Sigma R, \tau)}}, \quad (12)$$

имеющую смысл фазовой плотности звезд на M, C -диаграмме, причем $\rho_1(\Sigma R, \tau)$ — плотность на диаграмме масса — возраст. Здесь

$$\frac{D(M, C)}{D(\Sigma R, \tau)} = \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial M}{\partial \Sigma R} & \frac{\partial M}{\partial \tau} \\ \frac{\partial C}{\partial \Sigma R} & \frac{\partial C}{\partial \tau} \end{array} \right|. \quad (13)$$

Дифференцируя (6) и (11) и используя (7), после некоторых преобразований получаем для $\rho(M, C)$

$$\rho(M, C) = 10^{0.0857 \cdot M} \cdot (C + \beta) \Sigma R^{3/2} \left| \frac{\partial \Sigma R}{\partial R} \right| \rho_1(\Sigma R) N, \quad (14)$$

где

$$N = A^{-3/2} B \frac{1}{P};$$

$$P = 3.5 \cdot 0.43429 \cdot 2.5 \cdot 0.5 \alpha^2 (4\pi \sigma)^{0.5} 10^{0.0857 C_1},$$

причем нами использовано то обстоятельство, что вдоль линий постоянной массы фазовая плотность не меняется, то есть

$$\rho_1(\Sigma R, \tau) = \rho_1(\Sigma R).$$

Это допущение основывается на стационарности состава звездного населения нашей звездной системы.

Перепишем (14) в виде

$$\rho(M, C) = \varphi(M, C) \psi \rho_1(\Sigma R) N, \quad (15)$$

где

$$\varphi(M, C) = 10^{0.04857 \cdot M} (C + \beta)$$

$$\Psi = \mathfrak{X}^3, \left| \frac{\partial \mathfrak{X}}{\partial R} \right|.$$

Поскольку $R = R(M, C)$, то функция ψ может быть затабулирована для различных значений M, C . Действительно, исключая R из (8) и используя (5) и (10), получаем

$$R = \frac{10^{0.2(C, -M)}}{(4\pi\tau)^{0.5}} \cdot \frac{(C + \beta)^2}{a^2} \quad (16)$$

или, подставляя значения $L_{\odot} = 3.86 \cdot 10^{33}$ эрг/сек; $M_{\text{бел}\odot} = 4.74$, имеем для R

$$R = 3.98258 \cdot 10^{11} \cdot 10^{-0.2 \cdot M} \cdot (C + 0.55)^2. \quad (17)$$

Согласно [4—6], белые карлики сосредоточены в основном в области диаграммы, ограниченной неравенствами: $8 \leq M \leq 15$; $-0.3 \leq C \leq 0.5$. При малых M и больших C (положительных) радиусы, в соответствии с (17), оказываются большими, чем для конфигураций, рассчитанных Чандрасекаром [1]. Поэтому было выполнено решение уравнения, описывающего структуру белого карлика, также для центральной плотности, соответствующей значению параметра $1/y_0^2 = 0.9$. Уравнение

$$\frac{1}{\eta^3} \frac{d}{d\eta} \left(\eta^3 \frac{d\Phi}{d\eta} \right) = - \left(\Phi^2 - \frac{1}{y_0^2} \right)^{3/2} \quad (18)$$

с граничным условием $\Phi(\eta_1) = 1/y_0$ решалось при этом обычным численным методом, причем интегрирование начиналось из центра при помощи предложенного в [1] разложения в ряд. Для интересующего нас значения параметра $1/y_0^2 = 0.9$ получены следующие величины массы и радиуса: $\mathfrak{X}_{\odot} = 0.5157$; $R = 3.4346 \cdot 10^9$ см (при $\mu_e = 1$, что соответствует водородному составу).

Значения $\mathfrak{X}$ и $\frac{\partial \mathfrak{X}}{\partial R}$ для получения таблицы функции ψ снимались с графика $\mathfrak{X} = \mathfrak{X}(R)$ при $\mu_e = 1$ и $\mu_e = 2$, причем последний случай соответствует гелиевому составу. Табулирование функции ψ является тривиальным.

Таким образом, соотношение (14) должно давать для различных значений M и C числа, соответствующие вероятности „попадания“

звезд в определенные интервалы светимости и цвета, или, при соответствующей нормировке, просто числа звезд в интервалах

$$(M, M + dM), \quad (C, C + dC).$$

Величина $\rho_1(\mathcal{M})$ имеет смысл функции распределения белых карликов по массам; величина N для данного химического состава является постоянной.

Для сравнения результатов с наблюдательными данными необходимо ввести поправочный множитель, учитывающий эффект селекции: во-первых, абсолютно яркие звезды мы видим в большем объеме; во-вторых, мы обнаруживаем главным образом те белые карлики, которые обладают достаточно большими собственными движениями.

Будем считать, что мы вычерпываем белые карлики до видимой величины m_0 . Тогда для предельного расстояния это даст

$$r_0 = 10^{0.2(m_0 - M) + 1}. \quad (19)$$

Если считать пространственную плотность белых карликов в окрестностях Солнца постоянной, то значения функции $\rho(M, C)$, относящиеся к различным M , должны умножаться на объемы, определяемые соотношением $r_0^3 \sim 10^{-0.6M}$. Оказалось, однако, что это дает заниженные оценки для числа звезд с большими M .

Просмотр списка белых карликов в [4—6] показывает, что, согласно [4], большинство их имеет собственные движения, большие, чем 0.1. Будем считать, что мы обнаруживаем белые карлики с собственными движениями, большими некоторого предельного значения μ_0 . Тогда, если скорость есть v , то для расстояния получаем неравенство $r_0 \leq \frac{v}{\mu_0}$. Теперь для учета эффекта селекции имеются два неравенства

$$\begin{aligned} r_0 &\leq 10^{0.2(m_0 - M) + 1} \\ r_0 &\leq \frac{v}{\mu_0}. \end{aligned} \quad (20)$$

При этом, если v выражается в км/сек, а μ_0 в угловых секундах в год, то для расстояния в парсеках вместо второго неравенства имеем

$$r_0 \leq 0.211067 \frac{v}{\mu_0}.$$

Таким образом, для каждого значения M функцию $\rho(M, C)$ надо теперь умножать на объем, удовлетворяющий обоим неравенствам.

При этом нас интересуют не сами объемы, а их отношения, соответствующие различным M .

Полагая $m_0 = 16$, для μ_0 и ν мы принимали значения $\mu_0 = 0.1$; $\nu = 30$ км/сек. Тогда функция $V(M, \mu_0)$, где V — отношение объемов, будет равна

$$\begin{array}{lll} V(M, \mu_0) \approx 1 & \text{при} & 8 < M < 12 \\ 10^{-0.6} & \text{„} & M = 13 \\ 10^{-1.2} & \text{„} & M = 14 \\ 10^{-1.8} & \text{„} & M = 15. \end{array}$$

Ниже приводится таблица функции $\varphi(M, C) \cdot \psi \cdot V(M, \mu_0)$. Эта таблица представляет собой теоретическое распределение белых карликов для случая $\rho_1(\mathcal{M}) = \text{const}$. Функция Ψ подсчитывалась для водородного состава, причем масса выражалась в единицах солнечной массы, а радиус в единицах 10^6 см.

Таблица

$M \backslash C$	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
8	0.78	1.14	0.61	0.14	<0.07				
9	0.45	1.54	1.74	1.11	0.38	<0.11			
10	0.43	1.38	2.39	2.70	2.16	1.07	0.44	<0.17	
11	0.37	0.84	2.16	2.99	4.17	4.05	2.72	1.51	0.76
12	0.37	0.77	1.31	3.24	4.42	5.74	6.39	6.18	4.27
13	0.08	0.15	0.30	0.49	0.64	1.52	1.74	2.21	2.46
14	0.02	0.04	0.07	0.11	0.15	0.20	0.34	0.59	0.66
15	0.005	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.07	0.08	0.13

В соответствии с таблицей построена искусственная диаграмма цвет — светимость для белых карликов (рис. 1).

Были получены также таблицы и диаграммы для функции ψ , соответствующей гелиевому составу. Сравнение показало, что химический состав мало влияет на характер диаграммы.

Добавим еще, что при других разумных значениях μ_0 и ν , например при $\nu = 20$ км/сек, $\mu_0 = 0.05$ величина $V(M, \mu_0)$, а следовательно и диаграмма, меняются незначительно.

Введение функции распределения белых карликов по массам $\rho_1(\mathcal{M})$ в виде, например, гауссовой кривой может изменить дисперсию звезд на диаграмме. В связи с этим отметим, что, согласно [4], имеет место разделение белых карликов на диаграмме на две различные группы,

соответствующие, как полагают авторы, различным средним массам. Нетрудно видеть, что введение, например, двухвершинной функции $\rho_1(M)$ в $\rho(M, C)$ даст возможность учесть это обстоятельство.

Далее, привлечение большего наблюдательного материала и более точный учет эффекта селекции может позволить в принципе определить характер функции $\rho_1(M)$, если считать левую часть (14) заданной.

Рис. 1. Количество кружков в клеточках приблизительно соответствует числам таблицы, а полуоткрытые кружки относятся к числам порядка 0.5.

Кружок в правом верхнем углу диаграммы условно обозначает сумму чисел в этой области, два закрытых кружка в первом столбце—сумму чисел в (8—12) строках этого столбца.

Рассмотрение таблицы и диаграммы показывает удовлетворительное согласие с наблюдательными данными [4—6], на основании чего можно сделать следующий вывод.

Распределение на диаграмме цвет—светимость соответствует гипотезе о том, что свечение белых карликов происходит за счет внутренней энергии, то есть за счет остывания. Источники энергии не играют существенной роли, точнее, не влияют существенно на характер диаграммы.

В заключение приношу искреннюю благодарность В. А. Амбарцумяну за руководство работой.

Астрономическая обсерватория
Львовского университета

ON THE PHASE DENSITY OF WHITE DWARFS ON THE
COLOR-LUMINOSITY DIAGRAM

A. M. EIGENSON

By considering the usual assumptions about the structure of the white dwarfs, a formula for their phase density on the color-luminosity diagram is obtained. Comparing the results with observational data we see that the employed model is valid.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. С. Чандрасекар, Введение в учение о строении звезд, М., 1950.
2. М. Шварцшильд, Строение и эволюция звезд, М., 1961.
3. Курс астрофизики и звездной астрономии, т. II, М., 1962.
4. O. Eggen, J. Greenstein, Ap. J., 141, 83, 1965.
5. O. Eggen, J. Greenstein, Ap. J., 142, 925, 1965.
6. E. Schatzman, White Dwarfs, Amsterdam, 1957.