КАРЛИКИ ТИПА СКУЛЬПТОРА В СКОПЛЕНИЯХ
ГАЛАКТИК

В. Е. КАРАЧЕНЦЕВА

Поступила 3 апреля 1967

Исправлена 19 сентября 1967

На основании данных каталога [1] рассмотрены распределения карликовых галактик типа Скульптора в близких скоплениях. Получены некоторые средние характеристики распределений. Отмечена связь галактик типа Скульптора с нормальными эллиптическими галактиками. Построены функции диаметров галактик типа Скульптора в скоплениях.

В предыдущей работе [1] были приведены результаты поисков карликовых галактик типа Скульптора на картах Паломарского атласа (область $\delta > -27^\circ$). Сравнение распределений 241 карликовой галактики типа Скульптора и нормальных галактик с $m_{\text{PK}} < 12^{\text{m}0}$ дало возможность утверждать, что в большинстве своем ($\sim 80\%$) галактики типа Скульптора находятся в скоплениях нормальных галактик Virgo, Virgo S, UMa. и в поясе Pisces, Cetus, Fornax. Настоящая работа посвящена анализу распределения карликов типа Скульптора в этих скоплениях и связи их с нормальными галактиками.

Исходным материалом служили диаграммы (отдельно для каждого скопления, на которые в координатах α , δ были нанесены галактики ярче $13^{\text{m}0}$ из каталога [2] и карлики типа Скульптора из списка [1]. Поскольку у карликов типа Скульптора, в отличие от ярких галактик, нет измеренных лучевых скоростей, искать связь между индивидуальными карликовыми и яркими галактиками было невозможно. Поэтому наиболее удобным явился статистический подход, позволивший выявить общие особенности распределения.

Приводим основные результаты по отдельным скоплениям.*

1. Южная протяженность Virgo ($\alpha: 12^h - 14^h$, $\delta: 0^\circ - -27^\circ$). На площади, занимаемой скоплением, отмечено 58 ярких галактик с $m_{\text{rg}} \leq 13^m 0$ (17 E, 41 S + Irr) и 25 карликовых галактик типа Скульптора. Вокруг каждой галактики типа Скульптора проводилась окружность радиусом $R = 200$ кпс (здесь и далее принято значение параметра Хаббла $H = 75$ км·сек⁻¹·мпс⁻¹). Для выявления связи карликовых галактик с яркими делались подсчеты ярких галактик, попавших в данные окружности. В предположении случайного взаимного распределения вычислялось математическое ожидание числа ярких галактик в окружностях радиуса R вокруг галактик типа Скульптора: $M.O. = sN_1/\Sigma$, где s — суммарная площадь кружков около галактик типа Скульптора, Σ — площадь скопления, N_1 — количество ярких галактик в скоплении. Затем $M.O.$ сравнивалось с наблюдаемым числом ярких галактик в окружностях n (табл. 1). Как видно из таблицы, превышение наблюдаемого числа галактик над ожидаемым велико, следовательно, существенная часть галактик типа Скульптора ассоциируется с яркими. Величина этого превышения и у эллиптических галактик, и у спиральных примерно одинакова.

Таблица 1

Т и п	М. О.	n	$n/M.O.$
E	0.9	3	3.4
S+Irr	2.0	7	3.4
Все галактики	2.9	10	3.4

На рис. 1 приведено распределение галактик типа Скульптора по угловым диаметрам. Если бы пространственное распределение их в этой области было однородным (а не связанным со скоплением), то логарифм числа галактик с диаметрами больше данного d представлялся бы прямой $\lg N = -3 \lg d + C$ (пунктирная линия на рисунке). Однако видно, что наблюдаемое распределение существенно отличается от однородного. Следовательно карлики типа Скульптора в Virgo S.

* Средние лучевые скорости в скоплениях: $\bar{V}_{\text{Virgo}} = +1182$ км/сек (по 90 членам), $\bar{V}_{\text{Virgo S}} = +1175$ км/сек (по 12 членам), $\bar{V}_{\text{UMa}} = +1018$ км/сек (по 50 членам), то есть скопления находятся на примерно одинаковом расстоянии ~ 15 мпс, что позволяет делать сравнительный анализ.

образуют физическую систему, и зависимость $\lg N(d)$ дает представление о функции линейных диаметров карликовых галактик в этой системе.

Рис. 1. Распределение галактик типа Скульптора по угловым диаметрам ● — в скоплении Virgo S, ▲ — в UMa, ○ — в Virgo. Здесь и на остальных рисунках диаметры выражены в единицах 0.1 м. (1 м. = 1.12).

2. Скопление UMa ($\alpha: 11^h - 13^h 30^m$, $\delta: +25^\circ - +60^\circ$). На площади, занимаемой скоплением, отмечено 113 галактик ярче $13^m 0$ (22 E, 91 S + Irr) и всего 16 карликовых типа Скульптора. Так же, как и в случае скопления Virgo S, делались подсчеты ярких галактик, попавших в окружности радиуса $R = 200$ клс около карликовых галактик.

Таблица 2'

Т и п	М. О.	n	n/М. О.
E	0.9	3	3.4
S+Irr	3.6	7	1.9
Все галактики	4.5	10	2.2

Результаты приведены в табл. 2. Здесь тоже заметно превышение наблюдаемого числа галактик над ожидаемым. Наибольшее превышение приходится на эллиптические галактики. Возможно, это обусловлено предпочтительной связью карликов типа Скульптора именно с

данном типом ярких галактик. Интересно, что относительное число карликовых галактик в UMa втрое меньше, чем в Virgo S.

Распределение карликовых галактик по $lg d$ дается на рис. 1. Оно отличается от однородного (пунктир) и похоже на распределение в Virgo S.

3. Скопление Virgo ($\alpha: 12^h - 13^h$, $\delta: 0^\circ - +25^\circ$). На площади, занимаемой скоплением, расположено 126 галактик ярче $13^m.0$ (40 E, 86 S + Irr) и 104 галактики типа Скульптора. Это скопление — самое богатое карликовыми галактиками, поэтому оказалось возможным сделать более подробный анализ их распределения.

Наблюдается монотонное уменьшение поверхностной плотности числа галактик типа Скульптора от центра к периферии скопления (за центр скопления принято положение галактики NGC 4486). Результаты подсчетов даются в табл. 3 (1 строка). Из этой же таблицы видно, что средний диаметр галактик типа Скульптора остается практически постоянным вдоль радиуса скопления (2 строка). Относительная доля карликовых галактик (3 строка) заметно больше в центральных областях скопления, чем на его периферии.

Таблица 3

R кольца	$0^\circ - 2^\circ$	$2^\circ - 4^\circ$	$4^\circ - 6^\circ$	$6^\circ - 7^\circ$	Южная периферия	Северная периферия
Число галактик типа Скульптора на кв. градус	1.80	0.99	0.45	0.10	0.09	0.02
Средний диаметр галактик типа Скульптора в м.м.	0.60	0.52	0.50	0.62	0.48	0.75
% содержание галактик типа Скульптора	20%	38%	27%	4%	10%	2%

Около каждой галактики типа Скульптора описывались концентрические окружности радиуса $R_1 = 200$ клс и $R_2 = 100$ клс. Как и в предыдущих случаях, вычислялось математическое ожидание попадания ярких галактик в окружности R_1 , R_2 . Результаты сравнения М. О. с наблюдаемым числом ярких галактик даны в табл. 4. Превышение наблюдаемого числа над ожидаемым особенно заметно для эллиптических галактик, что подтверждает высказанное в [3] предположение о более тесной связи карликовых галактик типа Скульптора с эллиптическими галактиками, чем со спиральными.

Заметим, что относительное число карликовых галактик в Virgo превосходит таковое в скоплениях Virgo S и UMa, соответственно, в 2 и 6 раз. Следовательно, степень богатства скоплений карликами типа Скульптора существенно меняется от скопления к скоплению.

Таблица 4

Т и п	М. О.	<i>n</i>	<i>n</i> /М. О.
$R_1 = 200$ кпс			
Е	18	70	3.9
S+Irr	40	101	2.5
Все галактики	58	171	3.0
$R_2 = 100$ кпс			
Е	7	30	4.3
S+Irr	15	26	1.7
Все галактики	22	56	2.5

Функция логарифмов диаметров галактик типа Скульптора в Virgo приведена на рис 1.

Известно, что де Вокулер [4] считает скопление Virgo состоящим из проектирующихся друг на друга подскоплений эллиптических и спиральных галактик со средними лучевыми скоростями соответственно (935 ± 70) км/сек и (1405 ± 166) км/сек. Одну из проверок этого утверждения может дать анализ распределения галактик типа Скульптора по диаметрам в выделенных де Вокулером областях. С этой целью в области радиусом $R = 6^\circ$ и центром в NGC 4486 (что почти точно совпадает с областью де Вокулера) отдельно подсчитывались диаметры галактик типа Скульптора, расположенных вблизи эллиптических и спиральных галактик. Отбирались только те случаи, когда расстояние от карлика до данной яркой галактики было по крайней мере в три раза меньше, чем до любой другой яркой галактики.

Средний диаметр галактик типа Скульптора, расположенных вблизи спиральных галактик $\bar{d}_{СК(S)}$, оказался равным 0.55 мм со средним квадратичным отклонением среднего $\sigma = 0.05$ мм. Если бы существовало два комплекса ярких галактик, с лучевыми скоростями, отличающимися примерно в 1.5 раза, то диаметры карликов типа Скульптора, расположенных в подскоплении эллиптических галактик, были бы в среднем в 1.5 раза больше, чем у карликов в подскоплении спираль-

ных галактик ($\bar{d}_{\text{ск}(E)} = 0.83$ м.м.). Однако для совокупности карликов типа Скульптора вблизи эллиптических галактик мы получили средний диаметр $\bar{d}_{\text{ск}(E)} = 0.59$ м.м с $\sigma = 0.05$ м.м, что практически совпадает со значением $\bar{d}_{\text{ск}(S)}$. Наблюдаемое различие $\bar{d}_{\text{ск}(E)} - \bar{d}_{\text{ск}(S)} = 0.04$ м.м при ожидаемом $\bar{d}_{\text{ск}(E)} - \bar{d}_{\text{ск}(S)} = 0.24$ м.м и указанном σ могло бы случайно реализоваться лишь с вероятностью $7 \cdot 10^{-4}$. Следовательно, гипотеза существования в Virgo отдельных E и S подскоплений с этой точки зрения маловероятна.

На рис. 2 приведено суммарное распределение галактик типа Скульптора по диаметрам для скоплений Virgo S, UMa, Virgo. Распределение показывает превышение над однородным (пунктир) в области больших значений диаметров.

Рис. 2. Суммарное распределение галактик типа Скульптора по угловым диаметрам в скоплениях Virgo S, UMa, Virgo.

4. Пояс Pisces, Cetus, Fornax ($\alpha: 0^h - 4^h$, $\delta: -27^\circ - +30^\circ$). Как и рассмотренные выше скопления, пояс расположен в области экватора Сверхгалактики де Вокулера. В этой области отмечено 98 ярких галактик с $m_{\text{rg}} \leq 13^m0$ (24 E, 74 S + Irr) и 42 карлика типа Скульптора. Результаты подсчетов ярких галактик в окружностях $R = 1^\circ$ около карликовых содержатся в табл. 5. Как и в случае скоплений UMa и Virgo, заметна более выраженная связь карликовых галактик типа Скульптора с яркими эллиптическими.

На рис. 3 приведена функция диаметров для галактик типа Скульптора. Близость распределения к однородному вероятно объясняется тем, что в данной области мы наблюдаем карлики, принадле-

Таблица 5

Т и п	М. О.	n	n/М. О.
Е	0.7	9	12.5
S+Irr	2.2	16	7.2
Все галактики	2.9	25	8.6

жащие нескольким системам ярких галактик (группа NGC 1068, северная часть скопления Fornax и др.), расположенных на различных расстояниях.

Рис. 3. Распределение галактик типа Скульптора по угловым диаметрам в поясе галактик Pisces, Cetus, Fornax.

Подводя итоги, отметим следующее.

а. Совпадение общих картин распределения карликовых галактик типа Скульптора и нормальных галактик не вызывает сомнения [1]. Однако возникает вопрос, является ли это выражением индивидуальной связи карликовых галактик с нормальными или же следствием регулярного распределения обеих подсистем в совместном гравитационном поле. Статистический анализ взаимного распределения карликов типа Скульптора и ярких галактик показывает, что примерно $(54 \pm 27)\%$ всех галактик типа Скульптора в изученных скоплениях ассоциируется с нормальными галактиками ярче 13^m . Приведенные данные позволяют заключить также, что галактики типа Скульптора

чаще встречаются вблизи нормальных эллиптических, чем нормальных спиральных галактик. Интересно, что в работе ван ден Берга [5] обнаружена связь карликов поздних типов (S и Irr) с нормальными спиральными галактиками. Следовательно, намечается более тесная связь карликовых и нормальных галактик, обладающих сходным типом звездного населения.

б. Среднее число систем типа Скульптора с линейными диаметрами $D > 2.0$ клс, располагающихся в круге радиуса 200 клс около нормальной галактики, колеблется от 0.1 в скоплении UMa до 1.2 в Virgo. Известно, что у нашей Галактики имеется 6 карликовых спутников этого типа с $D > 2.0$ клс и расстоянием менее 200 клс. Следовательно, наша Галактика относительно богата спутниками типа Скульптора.

в. В скоплении Virgo замечено монотонное убывание плотности числа галактик типа Скульптора от центра к периферии. В остальных случаях сделать какое-либо заключение о распределении галактик типа Скульптора вдоль радиуса скопления нельзя из-за недостаточного статистического материала и трудности точного определения центра скопления. Однако несомненно, что распределение их в общих чертах повторяет распределение нормальных галактик.

г. Статистические характеристики распределения галактик типа Скульптора существенно меняются от скопления к скоплению. Это может объясняться рядом причин: различием в преобладающем морфологическом типе нормального населения скоплений, неодинаковостью динамических условий в разных скоплениях, или же различной активностью ядер гигантских галактик, если происхождение карликов типа Скульптора связано с такими процессами.

Автор выражает благодарность академику В. А. Амбарцумяну за обсуждение результатов работы и полезные советы.

Бюраканская астрофизическая
обсерватория

SCULPTOR-TYPE DWARFS IN THE CLUSTERS OF GALAXIES

V. E. KARACHENTSEVA

Using the data of catalogue [1], the distributions of Sculptor-type dwarfs in the near clusters of galaxies are considered. Some average characteristics of the distributions are obtained. The connection of Sculptor-type galaxies with the normal elliptical galaxies are given.

The functions of diameters of Sculptor-type galaxies in the clusters are compiled.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. В. Е. Караченцева, Сообщ. Бюро. общ., 39, 78, 1967.
2. A. de Vaucouleurs, G. de Vaucouleurs, Reference Catalogue of Bright Galaxies, The University of Texas Press, 1964.
3. И. Д. Караченцев, Астрофизика, 1, 203, 1965.
4. G. de Vaucouleurs, Ap. J., Suppl. ser., 56, VI, 213, 1961.
5. S. van den Bergh, A. J., 71, 922, 1966.