

Об асимптотических оценках числа решений систем булевых уравнений с зависимыми переменными

Э. В. Егизарян

Кафедра дискретной математики и теоретической информатики ЕГУ

Известно, что многие вопросы функционирования дискретных управляющих систем сводятся к решению систем булевых уравнений, либо к определению числа их решений. Таковы, например, некоторые задачи синтеза цифровых автоматов, нахождения внутренних и внешних устойчивых множеств в графе, вопросы теории тестов и др. Естественно предполагать, что множество решений системы будет сужаться с ростом числа уравнений и при достаточно большом количестве последних будет пустым. В работах [1,2] обосновывается это предположение для "типичного" случая, а также приводятся оценки числа решений "почти всех" систем из l неэквивалентных уравнений как с n независимыми, так и с m зависимыми (и n независимыми) переменными. В настоящей работе исследуется класс уравнений с "неявными" m зависимыми переменными.

Приведем необходимые определения.

Пусть $\{M(r)\}_{r=1}^{\infty}$ — такое семейство множеств, что $|M(r)| \rightarrow \infty$ при $r \rightarrow \infty$ ($|M|$ обозначает число элементов множества M), а $M^E(r)$ — подмножество тех элементов из $M(r)$, которые обладают заданным свойством E . Говорят, что почти все элементы множества $M(r)$ обладают свойством E , если $|M^E(r)|/|M(r)| \rightarrow 1$ при $r \rightarrow \infty$ ("типичный" случай).

Всюду под $\log$ понимается логарифм по основанию 2.

Обозначим через $S_{n,l}$ множество всех систем из l уравнений вида

$$\begin{cases} f_i(x_1, \dots, x_n) = 1 \\ i = 1, \dots, l \end{cases}$$

где $f_i(x_1, \dots, x_n), i = 1, \dots, l$ — попарно отличающиеся булевы функции от переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Пусть $B = \{0,1\}, B^n = \{\tilde{\alpha} / \tilde{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \alpha_i \in B, 1 \leq i \leq n\}$. Набор

$\tilde{\alpha}_l = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in B^n$ называется решением системы (1), если
$$\begin{cases} f_i(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 1 \\ i = 1, \dots, l \end{cases}$$

Сопоставим каждой системе S множества $S_{n,l}$ целочисленный параметр $\tau(S)$, равный числу ее решений. Справедлива следующая

Теорема 1 (см [1,2]).

1. Если $n - l \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, то для почти всех систем S множества $S_{n,l}$ имеет место $\tau(S) \sim 2^{n-l}$.

2. Если $n-l \rightarrow -\infty (n \rightarrow \infty)$, то почти все системы S множества $S_{n,l}$ не имеют решений.

3. Если $n-l$ ограничено при $n, l \rightarrow \infty$, то для почти всех систем S множества $S_{n,l}$ число решений ограничено сверху произвольной функцией $\varphi(n)$, удовлетворяющей условию $\varphi(n) \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$.

Обозначим через $S_{n,l,m}$ множество всех систем из l уравнений вида

$$\begin{cases} f_i(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 1 \\ i = 1, \dots, l \end{cases}, \quad \text{где } y_j = \varphi_j(x_1, \dots, x_n) \quad (j = \overline{1, m}) \text{ — неизвестные булевы}$$

функции, зависящие от переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$; $f_i \neq f_j$, при $i \neq j$.

Набор булевых функций $(\varphi_1(x_1, \dots, x_n), \dots, \varphi_m(x_1, \dots, x_n))$ называется решением систем (4), если при подстановке в (4) вместо переменных y_j функций $\varphi_j(x_1, \dots, x_n)$ ($j = \overline{1, m}$) все уравнения обращаются в тождества.

Сопоставим каждой системе S множества $S_{n,l,m}$ целочисленный параметр $t(S)$ равный числу ее решений. Справедлива следующая

Теорема 2 (см [2]).

1. Если $m-l-n \rightarrow \infty (m, n \rightarrow \infty)$, то для почти всех систем S множества $S_{n,l,m}$ имеет место $t(S) \sim 2^{(m-l)2^n}$.

2. Если $m-l - [\log n(1+2^{-l}) \ln 2] \geq 1$ для достаточно больших m и n , то почти все системы S множества $S_{n,l,m}$ имеют хотя бы одно решение.

3. Если $m-l - [\log n(1+2^{-l}) \ln 2] \leq 0$ для достаточно больших m и n , то почти все системы S множества $S_{n,l,m}$ не имеют решений.

Рассмотрим теперь множество $S'_{n,l,m}$ всех систем уравнений вида

$$\begin{cases} f_i(y_1, \dots, y_m) = 1 \\ i = 1, \dots, l \end{cases}, \quad f_i \neq f_j \text{ при } i \neq j.$$

Относительно числа решений $t(S')$ систем из $S'_{n,l,m}$ справедлива следующая

Теорема 3.

1. Если $\log(m-l) - n \rightarrow \infty (m, n \rightarrow \infty)$, то для почти всех систем множества S' имеет место $t(S') \sim 2^{(m-l)2^n}$.

2. Если $m-l \rightarrow -\infty (m, l \rightarrow \infty)$, то почти все системы S множества $S'_{n,l,m}$ имеют решений.

Список Литературы

- Егизарян Э.В. Оценки, связанные с числом решений булевых уравнений. Вопросы кибернетики, комбинаторный анализ и теория графов, Москва, 1981.
- Егизарян Э.В. Метрические свойства систем булевых уравнений. ДАН Арм.ССР 72, N2, 1981.