

Асимметрия и ядро кодированного метрического пространства

Ю. Г. Григорьян

Европейская образовательная региональная академия

E-mail: yurgrig@yahoo.com

В работе рассматриваются вопросы, связанные с понятиями асимметрии и ядра дискретного метрического пространства $\mathbb{N}(D)$ [1,2,3], имеющими важное значение для последующего развития данного направления.

Определение 1. Множество действительных чисел $\mathbb{R}$ без нуля называется асимметрическим множеством, если существует хотя-бы один элемент $A \in \mathbb{R}$ такой что $-A \notin \mathbb{R}$. Например, $\mathbb{R}(D) = \{D\} \cup (|D|, \infty)$ является асимметрическим множеством с фиксированным $D < 0$.

Зафиксируем целое число $D \leq -2$ и рассмотрим бесконечное множество целых чисел:

$$\mathbb{N}(D) = \{D, -D+1\} \cup \{D^2 - D + i, i = 0, 1, 2, \dots\} \quad (1)$$

В [1,2] показано, что множество $\mathbb{N}(D)$ для каждого фиксированного $D_0 \leq -2$ образует асимметрическое метрическое пространство с метрикой

$$r(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x+y}, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases} \quad (2)$$

Структура множества $\mathbb{N}(D)$ при $D = -2$ приведена на Рис. 1.




Рис. 1

В пространстве $\mathbb{N}(D)$ при фиксированном D_0 вводятся понятия трех дискретных объектов $\varepsilon, \bar{\varepsilon}, \mathcal{P}$ со своими определяющими точками: $\varepsilon\{D_0, K, A, B\}$, $\bar{\varepsilon}\{D_0, K, A, B, C\}$, $\mathcal{P}\{D_0, K, A, B, C, E, F\}$, удовлетворяющими системам уравнений (3)

$$\left. \begin{aligned} K + D_0 &= 1 \\ A + D_0 &= B + K \\ AD_0 + BK &= 0 \\ KC + D_0C + KD_0 &= 0 \\ K^2 + D_0^2 + C^2 &= E^2 \\ A^2 + B^2 + C^2 &= F^2 \end{aligned} \right\} \begin{matrix} \varepsilon \\ \bar{\varepsilon} \\ \mathcal{P} \end{matrix} \quad (3)$$

$$\varepsilon \supset \varepsilon \supset \mathcal{P} \quad (4)$$

Определение 2. Множество $\mathcal{P}\{D_0, K, A, B, C, E, F\}$ при фиксированном $D_0 \leq -2$ называется ядром пространства $\aleph(1)$, если существует совершенное число $H \in \aleph(D_0)$, удовлетворяющее уравнению:

$$D_0^2 + K^2 + A^2 + B^2 + C^2 + E^2 + F^2 = H^2 \quad (5)$$

Показано, что диофантово уравнение (5) имеет решение в целых числах, что согласно определению 2 обеспечивает существование ядра дискретного асимметрического пространства $\aleph(D)$.

Список литературы

- [1] Grigoryan Yu.G. "Principles of inhomogeneous geometry", J. Algebra, Geometry and their Appl. Seminar Proc. — 2004 — 3-4, — p. 40-53.
- [2] Григорьян Ю.Г. "Пространство дискретных геометрий", Кибернетика и системный анализ, — 2006 — N5 — С. 22-32.
- [3] Григорьян Ю.Г. "Неклассические свойства пространства дискретных геометрий", Кибернетика и системный анализ, — 2009 — N5 — С. 51-59.