

Գ. Մ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, Ռ. Կ. ՌԱՅԱՅԵԼՅԱՆ

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՄԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԲԱԶՄԱՄՅԱ ԹԻԹԵՈՆԱԾԱՂԿԱՎՈՐ ԽՈՍՏԱՐՈՒՅՍԵՐԻ ԲԵՐՔԻ ՎՐԱ

Բազմամյա թիթեռնածաղկավոր խոտաբույսերը՝ հատկապես առվույտը և կորնզանը, մեր ուսպուրիկայի անասնապահության կերային բազայում ունեն մեծ տեսակարար կշիռ, ուստի այդ կուլտուրաների բերքի բարձրացումը, պարարտանյութերի կիրառման միջոցով, համարվում է կարևոր միջոցառում:

Առվույտը և կորնզանը տալիս են սպիտակուցներով, ածխաջրերով, հանքային նյութերով և վիտամիններով հարուստ խոտ:

Կորնզանի պարարտացման վերաբերյալ գրականության մեջ գոյություն ունեն տարբեր կարծիքներ: Որոշ հետազոտողներ (2, 3, 4) գտնում են, որ հանքային պարարտանյութերը թույլ ազդեցություն են գործում կորնզանի բերքի վրա, իսկ սուպերֆոսֆատը նույնիսկ բացասաբար է ազդում:

Ըստ Գ. Ն. Պրյանիշնիկովի և Ի. Վ. Յակուշինի (8) կորնզանը մեծ ընդունակություն ունի յուրացնելու հողի զովարալուծ ֆոսֆատները:

Գ. Շ. Ասլանյանը (1) Հայկական ՍՍՌ-ի տարբեր հողային պայմաններում կորնզանի պարարտացման փորձերի իր ուսումնասիրություններից եկել է այն եզրակացության, որ հանքային պարարտանյութերը ընդհանուր առմամբ բարձրացնում են կորնզանի բերքատվությունը:

Գ. Բ. Բաբայանի, Ս. Ա. Կարազուլյանի (5) կողմից դրված պարարտացման փորձերի արդյունքները ցույց են տալիս, որ շագանակագույն հողերում ազոտական և կալիումական պարարտանյութերը զգալի չափով բարձրացնում են կորնզանի բերքատվությունը:

Մ. Գ. Դավիդովսկին (7) գտնում է, որ լենինականի բարձրավանդակի պայմաններում, կորնզանը սուպերֆոսֆատի կարիք չունի: Կորնզանը անգամ տուֆից կլանում է ֆոսֆոր:

Առվույտի պարարտացման հարցերով զբաղվել են շատ գիտնականներ (6, 9, 10, 11 և ուրիշներ), որոնք գտնում են, որ հանքային պարարտանյութերը բարձրացնում են առվույտի բերքատվությունը:

Գ. Շ. Ասլանյանը (1) նշում է, որ սուպերֆոսֆատը ամենուրեք բարձրացնում է առվույտի բերքը: Կալիումից նույնպես ստացվում է զրական արդյունք, բայց ավելի պակաս չափով:

Սույն աշխատանքում բերվում են առվույտի և կորնզանի պարարտացման գաշտային փորձերի արդյունքները Սպիտակի և Ապարանի շրջաններում:

Սպիտակի շրջանը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1500—1700 մ բարձրության վրա, մթնոլորտային տեղումների տարեկան միջին քանակը տատանվում է 335—482 մմ սահմաններում: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը՝ 6,2—7,4:

Ապարանի շրջանը ծովի մակերևույթից բարձր է 1400—1800 մ, մթնոլորտային տեղումների տարեկան միջին քանակն է 496—597 մմ, օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը կազմում է՝ 5,2—8,5 աստիճան:

Հետադոտոլթյունները կատարվել են դաշտային փորձի մեթոդով: Փորձերը դրվել են մեկ ժապավենով շորս կրկնողությամբ: Փորձամարզերի մեծությունները եղել են 126 քմ. ( $6 \times 21$ ), հաշվառման փորձամարզը՝ 100 քմ ( $5 \times 20$ ): Փորձերի տվյալները հնթարկվել են մաթեմատիկական մշակման վարիացիոն ստատիստիկայի ընդունված մեթոդով:

Հանքային պարարտանյութերը կորնզանի և աուվույտի փորձերում տրվել են մակերեսային սնուցման ձևով, հիմնականում վաղ դարնանը:

Մեր ուսումնասիրության տարիներից 1960 թվականը եղել է մթնոլորտային տեղումների տեսակետից նպաստավոր, որի պատճառով այդ տարում ստացվել է համեմատաբար բարձր բերք, իսկ 1961 թվականը՝ խիստ երաշտ, որի հետևանքով ինչպես գյուղատնտեսական բոլոր կուլտուրաների, այնպես էլ բազմամյա թիթեռնածաղկավոր խոտաբույսերի բերքը եղել է շատ ցածր:

### Հանքային պարարտանյութերի ազդեցությունը կորնզանի և աուվույտի բերեալության վրա

Սպիտակի շրջանում կորնզանի փորձերը դրվել են Սպիտակի սովխոզի շագանակագույն, կարբոնատային հողերի վրա: Փորձերի տվյալները (աղյուսակ 1) ցույց են տալիս, որ վարիանտում, ստացված բերքի հավելումը տատանվում է սխալի սահմաններում, ոչ բարձր էֆեկտ է ստացվել ֆոսֆորի չափավոր դոզաներից, իսկ բարձր դոզաների կիրառումից նկատվում է բերքի որոշ նվազում: Համարյա նույն օրինաչափությունը նկատվում է նաև երկրորդ տարում (հետազոտությունից):

Ինչպես երևում է բերված տվյալներից (աղյուսակ 2) պարարտանյութերի կիրառումից ամենաբարձր էֆեկտը ստացվել է  $N_{30}P_{60}K_{45}$  վարիանտում, որտեղ բերքի հավելումը կազմում է 3,4—7,3 ց/հ: Պարարտանյութերը որոշ չափով բարձրացրել են նաև կորնզանի սերմի բերքատվությունը:

Այսպիսով շագանակագույն կարբոնատային հողերի վրա դրված կորնզանի պարարտացման փորձերի արդյունքները ցույց են տալիս, որ սնուցման կարգով տրված պարարտանյութերի արդյունավետությունը բարձր չէ, իսկ ֆոսֆորական պարարտանյութերի բարձր դոզաները բացասաբար են ազդում բերքատվության վրա:

Կորնզանի պարարտացման փորձեր են դրվել նաև Սպիտակի շրջանի Գեղարտի սովխոզի սևահողերի վրա:

Բերված տվյալները ցույց են տալիս (աղյուսակ 3), որ պարարտացման շնորհիվ ստացվել են խոտի բերքի որոշ հավելում: Սերմադաշտի պարարտացումից, թեև ավելացել է կորնզանի խոտի բերքը, սակայն, սերմի բերքատվության վրա, այն համարյա չի ազդել:

Ապարանի շրջանում աուվույտի և կորնզանի պարարտացման փորձերը դրվել են Հարթավան և Քուլակ գյուղերի արտադրական պայմաններում:

Քուլակ գյուղում «Չալախներ» կոչված հանդամասում՝ մուգ շագանակագույն ոչ կարբոնատային սևահողերի վրա, առաջին տարվա աուվույտի և կորնզանի դաշտերում:

Աղյուսակ 1

Մնուցման ազդեցությունը կորնդանի խոտի և սերմի բերքի վրա  
Սպիտակի սովխոզ 1960 թ.

| Կրճի<br>նման                                   | Խ ո տ    |                              |                       |        | Բ ե բ բ բ ց/հ    |            |          |          |                           |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------|--------|------------------|------------|----------|----------|---------------------------|
|                                                | M±m      | բերքի<br>հավել.<br>լումբ ց/հ | Հետազդեցու-<br>թյունը |        | բնդհանուր<br>M±m | հավելում   | սերմ M±m | հավելում | 1000 հատիկի<br>կշիռը գ-ով |
|                                                |          |                              | M±m                   | հավել. |                  |            |          |          |                           |
| ց պա-<br>սացման                                | 32,3±1,3 | —                            | 5,1±0,1               | —      | 30,6±7,20        | —          | 4,3±1,0  | —        | 18,5                      |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub>                  | 35,2±2,6 | 2,9                          | 6,2±0,5               | 1,1    | 31,1±4,10        | 0,55,9±1,0 | 1,6      | 18,4     |                           |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub> P <sub>60</sub>  | 41,1±3,3 | 8,8                          | 7,4±0,9               | 2,3    | 39,3±6,70        | 8,77,1±1,3 | 2,8      | 19,3     |                           |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub> P <sub>90</sub>  | 37,8±0,9 | 5,5                          | 8,1±0,6               | 3,0    | 34,4±7,5         | 3,86,8±1,6 | 2,5      | 18,5     |                           |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub> P <sub>120</sub> | 42,0±0,8 | 9,7                          | 8,5±0,7               | 3,4    | 35,0±8,4         | 4,47,0±0,8 | 2,7      | 18,5     |                           |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub> P <sub>150</sub> | 39,0±0,7 | 6,7                          | 7,7±0,5               | 2,6    | 31,4±4,0         | 0,85,9±1,8 | 1,6      | 18,3     |                           |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub> P <sub>180</sub> | 35,8±2,6 | 3,5                          | 6,5±0,9               | 1,4    | 29,6±4,0         | 1,05,3±0,7 | 1,9      | 18,5     |                           |

Աղյուսակ 2

Պարարտանյութերի ազդեցությունը կորնդանի խոտի և սերմի բերքի վրա  
Սպիտակի սովխոզ 1960 թ.

| Կրճի<br>նման                                   | Խ ո տ ց/հ |          |                |        | Բ ե բ բ բ ց/հ    |          |          |          |                           |
|------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|--------|------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
|                                                | M±m       | հավելում | Հետազդեց. 1961 |        | բնդհանուր<br>M±m | հավելում | սերմ M±m | հավելում | 1000 հատիկի<br>կշիռը գ-ով |
|                                                |           |          | M±m            | հավել. |                  |          |          |          |                           |
| ց պա-<br>սացման                                | 33,5±1,5  | —        | 7,3±1,0        | —      | 28,2±1,6         | —        | 4,5±0,2  | —        | 18,3                      |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub>                  | 34,6±1,5  | 1,1      | 8,2±1,4        | 0,9    | 30,1±3,5         | 1,9      | 5,7±1,1  | 1,2      | 18,4                      |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub> P <sub>60</sub>  | 37,7±0,9  | 4,2      | 10,5±1,8       | 3,2    | 30,6±2,5         | 2,4      | 6,1±0,6  | 1,6      | 19,0                      |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub> P <sub>90</sub>  | 40,8±2,1  | 7,3      | 10,7±0,5       | 3,4    | 30,7±3,5         | 2,5      | 6,1±0,7  | 1,6      | 18,3                      |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub> P <sub>120</sub> | 39,3±1,9  | 5,8      | 10,4±0,4       | 3,1    | 32,5±7,1         | 4,3      | 6,3±1,4  | 1,8      | 18,9                      |

Աղյուսակ 3

Մնուցման ազդեցությունը կորնդանի խոտի և սերմի բերքի վրա  
Գեղարտի սովխոզ, 1960 թ.

| Կրճի<br>նման                                   | Խ ո տ ց/հ |          |                |        | Բ ե բ բ բ ց/հ    |          |          |          |                           |
|------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|--------|------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
|                                                | M±m       | հավելում | Հետազդեց. 1961 |        | բնդհանուր<br>M±m | հավելում | սերմ M±m | հավելում | 1000 հատիկի<br>կշիռը գ-ով |
|                                                |           |          | M±m            | հավել. |                  |          |          |          |                           |
| ց պա-<br>սացման                                | 46,1±2,7  | —        | 14,8±2,9       | —      | 30,8±2,6         | —        | 2,5±0,3  | —        | 16,7                      |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub>                  | 46,3±3,1  | 0,2      | 18,4±2,8       | 3,6    | 37,7±1,9         | 6,9      | 3,9±0,3  | 1,4      | 15,6                      |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub> P <sub>60</sub>  | 51,2±3,9  | 5,1      | 19,7±2,7       | 4,9    | 41,3±2,2         | 10,5     | 4,2±0,2  | 1,7      | 16,6                      |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub> P <sub>90</sub>  | 53,3±2,4  | 7,2      | 18,4±2,4       | 3,6    | 42,0±2,2         | 11,2     | 2,5±0,8  | 0        | 14,4                      |
| <sup>60</sup> K <sub>45</sub> P <sub>120</sub> | 49,0±2,0  | 2,9      | 20,3±2,7       | 5,5    | 40,6±3,7         | 9,8      | 2,5±0,9  | 0        | 14,4                      |

Մեռացման ժամկետների ազդեցությունը կորնզանի սերմի բերքի վրա Քուչակ գյուղ

| Փորձի<br>սխեման      | 25 սեպտեմբերի 1960 թ. |                 |                               | 9-ր մայիսի 1961 թ. |                 |                               |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
|                      | $M \pm m$             | Հավելում<br>g/5 | 1000 հատիկի<br>կշիռը<br>գր-ով | $M \pm m$          | Հավելում<br>g/5 | 1000 հատիկի<br>կշիռը<br>գր-ով |
| Առանց պարարտացման    | $4,7 \pm 0,3$         | —               | 19,8                          | $4,3 \pm 0,7$      | —               | 19,6                          |
| $P_{60}$             | $6,8 \pm 0,5$         | 2,1             | 20,1                          | $6,9 \pm 0,5$      | 2,6             | 20,9                          |
| $P_{60}K_{43}$       | $6,7 \pm 1,0$         | 2,0             | 20,8                          | $6,1 \pm 0,5$      | 1,8             | 20,2                          |
| $N_{30}P_{60}K_{43}$ | $4,8 \pm 0,2$         | 0,1             | 19,9                          | $5,6 \pm 0,6$      | 1,3             | 19,4                          |
| $N_{60}P_{60}K_{43}$ | $5,6 \pm 0,2$         | 0,9             | 19,8                          | $6,2 \pm 0,8$      | 1,9             | 19,8                          |

Բերված տվյալները (աղյուսակ 4) ցույց են տալիս, որ առավել բարձր բերքը ստացվել է ֆոսֆորի կիրառումից, այստեղ ևս ազդեցական պարարտացումը իջեցրել է կորնզանի սերմի բերքը:

## Աղյուսակ 5

Պարարտանյութերի ազդեցությունը  
առվույտի խոտի բերքի վրա  
Քուչակ գյուղ, 1960 թ.

| Փորձի<br>սխեման      | $M \pm m$      | Հավելում<br>մր g/5 |
|----------------------|----------------|--------------------|
| Առանց պարարտացման    | $26,4 \pm 3,6$ | —                  |
| $P_{60}$             | $36,2 \pm 3,1$ | 9,8                |
| $P_{60}K_{43}$       | $37,5 \pm 1,6$ | 11,1               |
| $N_{30}P_{60}K_{43}$ | $39,6 \pm 3,1$ | 13,2               |
| $N_{60}P_{60}K_{43}$ | $42,2 \pm 4,6$ | 15,8               |

Բերքատվության տվյալներից (աղյուսակ 5) երևում է, որ պարարտացման հետևանքով բերքի հավելումը տատանվում է 9,8—15,8 գ-ի միջև: Առավել մեծ արդյունք է ստացվել ֆոսֆորի վարիանտից: Ազդեցական պարարտանյութերի կիրառումից նույնպես ստացվել է բերքի հավելում:

Հարթավան գյուղում կորնզանի պարարտացման փորձերը դրվել են «Ալուդարեր», իսկ առվույտի՝ «գյուղի տակ» հանդամասում, մուգ շագանակագույն լվացված սևահողերի վրա:

Աղյուսակ 6-ի տվյալներից երևում է, որ NK-ի վարիանտից դրական արդյունք է ստացվել: Նույն ֆոնի վրա ֆոսֆորի 60 կգ/հզ դոզայի կիրառումից բոլոր փորձերում էլ մեծ չափով բարձրացել է ինչպես կորնզանի խոտի, այնպես էլ սերմի բերքը: Զգալի չափով բարձրացել է նաև պարարտանյութերի հնամզդեցությունից ստացված բերքի հավելումը:

Ինչպես ցույց են տալիս աղյուսակ 7-ի տվյալները, ֆոսֆորի բոլոր դոզաների դեպքում էլ ստացվել է բերքի զգալի հավելում, սակայն տվյալ դեպքում տնտեսապես շահավետ է, ֆոսֆորի չափավոր դոզաների կիրառումը:

Փորձերի տվյալները (աղյուսակ 8) ցույց են տալիս, որ միայն սուպերֆոսֆատով պարարտացնելիս ստացվել է կորնզանի խոտի զգալի հավելում: Ազդեցական պարարտանյութերի կիրառումից արդյունք չի ստացվել:

Ա Ղ Յ Ո Ւ Ս Ա Կ 6

Սնուցման ազդեցությունը կորնզանի խոտի և սերմի բերքի վրա  
Հարթավան գյուղ, 1960 թ.

| Փորձի<br>սխեման                                  | Խոտ ց/հ  |          | Բ ե բ բ բ ց/հ |          |             |          |                        |          | Հետազդեցու-<br>թյուն 1961 |                 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|-----------------|
|                                                  | M±m      | հավելում | M±m           | հավելում | սերմ<br>M±m | հավելում | 1000 հատ<br>կշիռը գ-ով |          | M±m                       | հավելում<br>ց/հ |
| Առանց պա-<br>րարտացման                           | 23,5±1,6 | —        | 43,6±8,8      | —        | 8,5±1,9     | —        | 22,3                   | 9,5±1,6  | —                         | —               |
| N <sub>80</sub> K <sub>45</sub>                  | 32,0±3,0 | 8,5      | 48,6±2,7      | 5,0      | 8,7±0,5     | 0,2      | 21,5                   | 11,0±1,4 | 1,5                       | —               |
| N <sub>80</sub> K <sub>45</sub> P <sub>60</sub>  | 38,5±3,3 | 15,0     | 64,2±4,1      | 20,6     | 10,4±0,8    | 1,9      | 21,5                   | 14,4±1,5 | 4,9                       | —               |
| N <sub>80</sub> K <sub>45</sub> P <sub>90</sub>  | 38,4±4,3 | 14,9     | 60,6±2,1      | 17,0     | 12,1±0,8    | 3,6      | 20,1                   | 14,7±0,5 | 5,2                       | —               |
| N <sub>80</sub> K <sub>45</sub> P <sub>120</sub> | 40,3±3,2 | 16,8     | 68,4±3,4      | 24,8     | 11,4±0,7    | 2,9      | 20,7                   | 15,9±0,3 | 6,4                       | —               |
| N <sub>80</sub> K <sub>45</sub> P <sub>150</sub> | 37,2±4,3 | 13,7     | 59,3±5,5      | 15,7     | 11,4±0,8    | 2,9      | 20,9                   | 17,5±0,9 | 8,0                       | —               |
| N <sub>80</sub> K <sub>45</sub> P <sub>180</sub> | 41,9±3,0 | 18,4     | 73,2±1,4      | 29,6     | 12,5±0,3    | 4,0      | 20,8                   | 15,6±1,6 | 6,1                       | —               |

Ա Ղ Յ Ո Ւ Ս Ա Կ 7

Ֆոսֆորի աճող զոզանների ազդեցությունը կորնզանի խոտի և սերմի բերքի վրա  
Հարթավան գյուղ, 1960 թ.

| Փորձի<br>սխեման        | Խ ո տ ց/հ |          | Բ ե բ բ բ ց/հ    |          |             |          |                        |          | Հետազդեցու-<br>թյուն 1961 |                 |
|------------------------|-----------|----------|------------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|-----------------|
|                        | M±m       | հավելում | ընդհանուր<br>M±m | հավելում | սերմ<br>M±m | հավելում | 1000 հատ<br>կշիռը գ-ով |          | M±m                       | հավելում<br>ց/հ |
| Առանց պա-<br>րարտացման | 29,1±1,2  | —        | 30,5±1,2         | —        | 5,1±0,2     | —        | 21,8                   | 5,2±0,6  | —                         | —               |
| P <sub>60</sub>        | 40,7±1,3  | 11,6     | 51,1±3,2         | 20,6     | 9,5±0,3     | 4,4      | 21,2                   | 9,5±0,5  | 4,3                       | —               |
| P <sub>90</sub>        | 44,1±2,2  | 15,0     | 50,5±2,8         | 20,0     | 10,0±0,5    | 4,9      | 21,6                   | 10,7±0,6 | 5,5                       | —               |
| P <sub>120</sub>       | 43,5±2,5  | 13,8     | 57,2±1,8         | 26,7     | 11,3±0,5    | 6,2      | 22,0                   | 11,0±0,9 | 5,8                       | —               |
| P <sub>150</sub>       | 47,8±2,4  | 14,4     | 53,2±4,0         | 22,7     | 10,2±0,5    | 5,1      | 21,8                   | 10,4±1,1 | 5,2                       | —               |
| P <sub>180</sub>       | 42,1±1,8  | 18,7     | 60,6±3,3         | 30,1     | 10,4±0,6    | 5,3      | 22,6                   | 10,9±0,9 | 5,7                       | —               |

Ա Ղ Յ Ո Ւ Ս Ա Կ 8

Պարարտանյութերի ազդեցությունը կորնզանի խոտի և սերմի բերքի վրա  
Հարթավան գյուղ, 1960 թ.

| Փորձի<br>սխեման                                 | Խ ո տ ց/հ |          | Բ ե բ բ բ ց/հ    |          |             |          |                        |          | Հետազդեցու-<br>թյուն 1961 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|-----------------|
|                                                 | M±m       | հավելում | ընդհանուր<br>M±m | հավելում | սերմ<br>M±m | հավելում | 1000 հատ<br>կշիռը գ-ով |          | M±m                       | հավելում<br>ց/հ |
| Առանց պա-<br>րարտացման                          | 32,2±1,3  | —        | 28,0±1,3         | —        | 4,5±0,4     | —        | 22,2                   | 6,3±0,5  | —                         | —               |
| P <sub>80</sub>                                 | 38,1±2,4  | 5,3      | 50,8±7,8         | 22,8     | 9,7±1,5     | 5,2      | 22,0                   | 12,4±2,3 | 6,1                       | —               |
| P <sub>80</sub> K <sub>45</sub>                 | 43,0±3,2  | 10,2     | 47,7±6,6         | 19,7     | 10,5±1,6    | 6,0      | 22,8                   | 11,4±2,0 | 5,1                       | —               |
| N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>45</sub> | 40,2±1,9  | 7,4      | 47,7±6,3         | 19,7     | 8,7±1,4     | 4,2      | 22,8                   | 11,0±1,3 | 4,7                       | —               |
| N <sub>80</sub> P <sub>80</sub> K <sub>45</sub> | 43,6±1,0  | 10,8     | 49,2±6,3         | 21,2     | 8,3±1,1     | 3,8      | 22,5                   | 10,9±1,1 | 4,6                       | —               |

Ինչպես ցույց են տալիս աղյուսակ 9-ում բերված տվյալները, ազոտ-կալիումի համադրեց օգտագործումից ստացվել է 7,5 ց/հ բերքի հավելում: Ֆոսֆորի հաճող զոզաններից (NK ֆոնի վրա) բերքի լրացուցիչ հավելումը կազմում է 7—13 ց/հ: Բերքի ամենաբարձր հավելումը ստացվել է N<sub>60</sub>K<sub>45</sub>P<sub>90</sub> վարիանտում: Ֆոսֆորի բարձր զոզանների կիրառումից արդյունք չի ստացվել:

Ա. զ յ ու ս ա կ 9  
Մնուցման ազդեցությունը ասիական  
խոտի բերքին վրա  
Հարթափան գյուղ, 1930 թ.

| Փորձի<br>սխեման                                  | M±m      | Հալեկում<br>g, % |
|--------------------------------------------------|----------|------------------|
| Իռանյ պա-<br>րարտացման                           | 23,8±1,9 | —                |
| N <sub>60</sub> K <sub>45</sub>                  | 31,3±0,2 | 7,5              |
| N <sub>60</sub> K <sub>45</sub> P <sub>60</sub>  | 38,2±2,4 | 14,5             |
| N <sub>60</sub> K <sub>45</sub> P <sub>90</sub>  | 44,2±1,9 | 20,4             |
| N <sub>60</sub> K <sub>45</sub> P <sub>120</sub> | 38,7±1,2 | 14,9             |
| N <sub>60</sub> K <sub>45</sub> P <sub>150</sub> | 43,0±1,3 | 19,2             |
| N <sub>60</sub> K <sub>45</sub> P <sub>180</sub> | 41,6±2,5 | 17,6             |

Աղյուսակ 10  
Ոչուցման անդեկոթային առկայություն  
խոտի բերքի վրա  
Հարթավանդային գյուղ, 1960 թ.

| Փորձի<br>սխեման        | $M \pm m$      | Հաղիքում<br>$g/\bar{\zeta}$ |
|------------------------|----------------|-----------------------------|
| Առանց պա-<br>րարտացման | $24,9 \pm 1,9$ | —                           |
| $P_{60}$               | $29,4 \pm 2,0$ | 4,5                         |
| $P_{60}K_{45}$         | $33,4 \pm 3,0$ | 8,5                         |
| $N_{30}P_{60}K_{45}$   | $37,6 \pm 2,2$ | 12,7                        |
| $N_{60}P_{60}K_{45}$   | $38,6 \pm 2,1$ | 13,7                        |

Փորձի տվյալները (աղյուսակ 10) ցույց են տալիս, որ սուպերֆոսֆատի առանձին կիրառումից ստացվել է 4,5 ց բերքի հավելում: Ֆոսֆորով և կալիումով համասեղ սնուցման ղեկարում բերքի հավելումը կրկնապատկվում է, իսկ լրվել պարարտացման ( $N_{36}P_{60}K_{45}$ ) ղեկարում ստացվել է առավել բարձր բերք, սակայն N-ի դոզայի ավելացումից բերքի հավելում համարյա չի ստացվել:

Ե Չ Ր Ա Կ Ա Յ Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն

Հանքային պարարտանյութերը ոչ-կարբոնատային հողերում դրական են ազդել առվույտի և կորնդանի բերքատվության վրա, չնայած բնոգնանուր առմամբ պարարտանյութերի արդյունավետությունը բարձր չէ: Հատկապես ցածր է սուլպերֆոսֆատի արդյունքը կարբոնատային հողերում:

Պարարտանյութերի ցածր արդյունավետությունը, մեր կարծիքով, հիմնականում բացատրվում է պարարտացման եղանակով: Հայտնի է, որ թիթեռնածաղկավոր բույսերի առանցքային արմատը, լինելով թույլ ճյուղավորված, դժվարությամբ է օգտագործում մակերեսային սնուցումը և հատկապես ֆոսֆորը, որի շարժունությունը հոգում մեծ չէ:

Պարարտացման մեր փորձերը հիմնականում դրվել են օգտագործման 2-րդ և 3-րդ տարվա խոտաղաշտերում: Հայտնի է, որ թիթեռնածաղկավոր բույսերի արմատավզիկները տարեցտարի ավելի խորանում են և դժվարությամբ են օգտագործում մակերեսային պարարտանյութերը: Սուպերֆոսֆատի ցածր արդյունավետությունը մասամբ պայմանավորվում է նրա քիմիական կլանման առանձնահատկություններով:

2. Ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերը բարձրացնում են կորնզանի սերմի բերքը, մինչդեռ ազոտական պարարտանյութերը բացասական են ազդում:

3. Հանքային պարարտանյութերի և հատկապես սուպերֆոսֆատի և կալիում քլորիդի հետազոտությունից ստացվում է բերքի որոշակի համեմունք: