

**ԵՐԿԱԹ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒԻԿԻ
ՏԵՐԵՎՆԵՐՈՒՄ ԶԼՈՐՈՖԻԼԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԵՐՔԱՍՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱՆՀՈՂ
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ**

*Հայաստանի գյուղատնտեսական ակադեմիա,
ընդհանուր երկրագործության ամբիոն*

Ներկայացվող աշխատանքի նպատակն է Վայքի մարզում եղած տուֆաավազաքար լցանյութի պայմաններում պարզել երկաթ պարունակող տարբեր միացությունների (երկաթի երկարժեք և եռարժեք սուլֆատ, կոմպլեքսոն, դիէթիլեն եռամին հիմնաքաղաքաթթվի երկաթի կոմպլեքս՝ Fe-ԴԵԴԶ) ազդեցությունը լուլիկի աճի, տերևներում քլորոֆիլի պարունակության և բերքատվության վրա: Օգտագործվել է Ղավթյանի սննդալուծույթը, որտեղ, ըստ տարբերակների, փոխվել են միայն երկաթի միացությունները:

Ստացված տվյալներից պարզվել է, որ հիդրոպոնիկ անոթներում լուլիկի աճը, տերևներում քլորոֆիլի պարունակությունը և պտղի բերքը, մնացած հավասար պայմանների դեպքում, կախված է երկաթ պարունակող միացությունից: Նշված բոլոր ցուցանիշներով պակաս արդյունավետ է, երբ սննդարար լուծույթում օգտագործվել է եռարժեք, ապա երկարժեք երկաթի սուլֆատ: Բարձր արդյունավետություն ապահովել են Fe-ԴԵԴԶ և կոմպլեքսոնը:

Այսպես, եթե 1-ին տարբերակում 1 գ չոր տերևի հաշվով քլորոֆիլը վեգետացիայի ընթացքում կազմել է 3,2; 2,6; 2,0 մգ, 2-րդում՝ 4,1; 4,0; 2,6 մգ, ապա 3-րդ և 4-րդ տարբերակներում այն եղել է անհամեմատ բարձր և նույն ժամկետներում կազմել է 5,2-5,3; 4,2-4,4 և 3,0-3,3 մգ: Այդ տարբերակներում էլ բույսերն ունեցել են ավելի լավ աճ և կազմակերպել են ավելի շատ բերք՝ մեկ բույսի հաշվով 2,4-2,6 կգ, 1-ին և 2-րդ տարբերակների 1,7-1,8 կգ-ի դիմաց:

S.Yeritsyan, R.Harutunyan, L.Shahinyan, F.Karapetyan

**INFLUENCE OF IRON CONTAINING FERTILIZERES ON THE CONTENT AND
CROP CAPACITY OF CHLOROPHYLL IN THE LEAVES OF TOMATO UNDER
HYDROPONIC CONDITIONS**

Summary

The experimental data indicates that the best result was observed in trials with complexon and the worst result with FeSO_4 and $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.