УДК 524.358

О МЕХАНИЗМЕ ИСТЕЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВА ИЗ ЗВЕЗД ВОЛЬФА — РАЙЕ

И. Ф. МАЛОВ, В. И. ШИШОВ

Поступила 28 июня 1983

Принята к печати 3 февраля 1984

В работе рассмотрен механизм ускорения вещества внутри звезды Вольфа—Райе за счет излучения при условии, что светимость звезды $L \gtrsim L_c = \frac{4\pi c GM}{\tau_e}$. Показано, что этот механизм допускает плавный переход через скорость звука в областях с $\tau_e \gg 1$. В рамках сделанных предположений по наблюдаемой массе звезды можно оценить ее светимость и расстояние до нее.

1. *Введение.* Хорошо известно, что наиболее интенсивное истечение вещества в межзвездную среду происходит из звезд типа Вольфа — Райе (WR). Характерная скорость потери массы этими объектами $\dot{M}_{WR}$ составляет $10^{-5} M_{\odot}/\text{год}$. В ряде работ (см., например, [1—5]) обсуждаются возможные механизмы ускорения вещества в этих звездах. Показано, что ускорение может происходить как внутри звезды при сильной привязке излучения к веществу ($\tau \gg 1$) [2—3], так и в атмосфере звезды, где $\tau \lesssim 1$ [1, 4, 5]. В частности, если светимость звезды L больше критической светимости $L_c = \frac{4\pi c GM}{x}$, где M — масса звезды, а x — средний по спектру коэффициент поглощения, то эффективной ускоряющей силой может быть сила лучистого давления на свободные электроны [5]. Кроме предположения о том, что $L > L_c$, в [5] было принято значение скорости вещества на границе фотосферы ($\tau_e \sim 1$), в несколько раз превышающее скорость звука на том же уровне. Это предположение было произвольным и вынуждалось тем обстоятельством, что указанный механизм не допускал перехода через скорость звука. Впоследствии прямыми измерениями в двойной системе V 444 Cyg было показано, что скорость на уровне R_* , соответствующем $\tau_e \sim 1$, действительно является существенно сверхзвуковой и достигает для этой звезды WR значения $V_* \sim 300$ км/с [6]. При

этом измеренная светимость звезды WR оказалась близкой к эддингтоновской светимости.

Таким образом, в настоящее время близость светимости звезды WR к критической и наличие сверхзвуковой скорости на уровне «фотосферы» ($\tau \sim 1$) можно считать наблюдательными фактами.

Массы звезд WR по наблюдениям двойных систем заключены в пределах от $6 M_{\odot}$ до $13 M_{\odot}$ при среднем значении порядка $10 M_{\odot}$, температуры фотосферы $T_* \approx 80\,000 - 100\,000\text{K}$ при $\bar{T}_* \approx 90\,000\text{K}$; радиус фотосферы $R_* \approx 3 R_{\odot}$, а электронные плотности на этом уровне $n_e \sim 10^{13}\text{ см}^{-3}$ [6 - 7].

С учетом приведенных данных ниже делается попытка описать формирование течения во внутренних областях звезд WR.

2. *Основные уравнения.* Исследование спектральных линий в звездах WR [8—9] показывает, что атмосферы этих звезд более чем на 80% (по числу атомов) состоят из гелия. Мы в дальнейшем будем считать, что звезды WR — чисто гелиевые. Для принятых значений температур и плотностей на уровне фотосферы отношение импульса, передаваемого на газ при поглощении, к импульсу за счет рассеяния на электронах составляет 4—8% [10]. Можно поэтому считать, что основной вклад в непрозрачность вносит томсоновское рассеяние. Мы далее предполагаем, что и во внутренних слоях звезды WR непрозрачность полностью определяется рассеянием на электронах. Справедливость этого предположения обсуждается ниже.

В [2] при рассмотрении политропного механизма ускорения вещества считалось, что вся энергия излучения переносится потоком газа, к которому жестко привязано излучение. В [3] же полагалось, что перенос этой энергии связан полностью с лучистой теплопроводностью. И в том, и в другом случае не удалось получить переход через скорость звука для приемлемых значений параметров. Здесь мы рассматриваем режим, при котором учитываются оба эти процесса. В качестве исходной принята система уравнений радиационной газодинамики при сильной привязке излучения к веществу [11]. Для сферически-симметричного течения в поле тяжести звезды с массой M и светимостью L эта система может быть записана в виде:

$$\frac{d}{dr}(r^2 p V) = 0,$$

$$\rho V \frac{dV}{dr} + \frac{dP_g}{dr} + \frac{dP_r}{dr} + \rho \frac{GM}{r^2} = 0,$$

$$\rho V r^2 \left(\frac{V^2}{2} + \frac{5}{2} \frac{P_g}{\rho} + 4 \frac{P_r}{\rho} - \frac{GM}{r} \right) + r^2 H_r = \frac{L}{4\pi}, \quad (1)$$

$$H_r = - \frac{4acT^3}{3\kappa\rho} \frac{dT}{dr},$$

$$P_g = \rho \frac{kT}{m},$$

$$P_r = \frac{aT^4}{3},$$

где ρ — плотность, T — температура, V — скорость движения газа, H_r — поток лучистой энергии, P_g — газовое давление, P_r — давление излучения. Для среды, состоящей из полностью ионизованного гелия и электронов, $\bar{m} = \frac{m_{\text{He}} n_{\text{He}} + m_{\text{He III}} n_{\text{He III}}}{n_{\text{He}} + n_{\text{He III}}} \approx \frac{4}{3} m_{\text{H}}$. Для дальнейшего анализа системы уравнений (1) удобно провести ее обезразмеривание, введя следующие переменные:

$$W^2 = \frac{V^2}{\frac{kT_*}{\bar{m}}}, \quad \theta = \frac{T}{T_*}, \quad \mu = \frac{\rho}{\rho_*}, \quad x = \frac{r}{R_*} \quad (2)$$

В безразмерной форме исследуемая система уравнений имеет вид:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (x^2 \mu W) &= 0, \\ \mu W \frac{dW}{dx} + \mu \frac{d\theta}{dx} + \theta \frac{d\mu}{dx} + 4\beta_0 \theta^3 \frac{d\theta}{dx} + g \frac{\mu}{x^2} &= 0, \\ \mu W x^2 \left(\frac{W^2}{2} + \frac{5}{2} \theta + 4\beta_0 \frac{\theta^4}{\mu} - \frac{g}{x} \right) - Q \frac{\theta^3 x^2}{\mu} \frac{d\theta}{dx} &= \lambda, \end{aligned} \quad (3)$$

где введены безразмерные параметры:

$$\begin{aligned} \beta_0 &= \frac{\bar{a} \bar{m} T_*^3}{3k\rho_*}, \quad g = \frac{\bar{m} GM}{kR_* T_*}, \quad Q = \frac{4\beta_0}{AB}, \\ A &= x_* \rho_* R_*, \quad B = \frac{\sqrt{\frac{kT_*}{\bar{m}}}}{c}, \quad \lambda = \frac{L}{4\pi R_*^2 \rho_* \left(\frac{kT_*}{\bar{m}} \right)^{3/2}}. \end{aligned} \quad (4)$$

Параметр β_0 характеризует отношение лучистого давления к газовому, g — отношение гравитационной энергии к тепловой, A определяет оптическую толщину по рассеянию среды с размером R_* и плотностью ρ_* , B —

отношение изотермической скорости звука к скорости света, λ — отношение светимости к мощности теплового потока. Все параметры вычисляются на некотором фиксированном уровне, за который в настоящей работе принята граница фотосферы.

Для указанных выше наблюдаемых значений физических величин на уровне фотосферы безразмерные параметры задачи равны:

$$\beta_0 = 887; g = 1140; A = 1.4; B = 7.87 \cdot 10^{-5};$$

$$Q = 3.22 \cdot 10^7; \lambda = \frac{g}{AB} = 1.03 \cdot 10^7.$$

При этих значениях параметров ряд членов в системе (3) может быть опущен, и она примет вид:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (x^2 \mu W) &= 0, \\ \mu W \frac{dW}{dx} + \theta \frac{d\mu}{dx} + 4\beta_0 \theta^3 \frac{d\theta}{dx} + g \frac{\mu}{x^2} &= 0, \\ \mu W x^2 \left(4\beta_0 \frac{\theta^4}{\mu} - \frac{g}{x} \right) - Q \frac{x^2 \theta^3}{\mu} \frac{d\theta}{dx} &= \lambda. \end{aligned} \quad (4)$$

Вводя безразмерную скорость на уровне фотосферы w_* ($= x^2 \mu w$) и исключая μ из системы, получим следующие уравнения для дальнейшего исследования:

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dx} &= \frac{W}{x^2} \frac{C_0 \theta^4 W x^2 - 2\theta x + g \left(1 - \frac{L}{L_c} \right)}{\theta - W^2}, \\ \frac{d\theta}{dx} &= AB W_* \frac{\theta}{x^2} - \frac{\lambda W_*}{Q x^4 \theta^3 W} \end{aligned} \quad (5)$$

где $C_0 = 4 \beta_0 AB$. Для принятых значений параметров $C_0 = 0.39$.

3. Анализ исходной системы. Нами было проведено исследование системы (5) в предположении о том, что $\frac{L}{L_c} = 1 + \delta$ при $0 < \delta \ll 1$. Превышение светимости над критической не приведет к катастрофическому разлету звезды, поскольку внутри звезды часть энергии, большая чем δ , переносится конвективно (член $r^2 P_r V$ в уравнении энергии системы (1)). Топология интегральных кривых, полученная численным анализом системы (5), приведена на рис. 1 для $\delta = 0.013$ и значений остальных параметров, указанных выше. Система (5) имеет особую точку типа седла со зна-

чениями производной в этой точке, имеющими разные знаки. Следовательно, существует плавный переход от дозвуковых скоростей в самых глубоких слоях звезды к скоростям, превышающим скорость звука, в областях выше особой точки. Значение скорости газа на поверхности звезды ($x = 1$) зависит от параметра δ . На рис. 2 приведена зависимость $W_*(\delta)$ для особых кривых при неизменных значениях других параметров. Для V 444 Cyg $W_* = 12.7$, что соответствует $\delta = 0.013$. Существует также зависимость W_* от R_* (рис. 3). Знание M , W_* и R_* из наблюдений позволяет оценить величину δ .

Рис. 1. Семейство интегральных кривых системы (5) при $\delta = 0.013$, $R_* = 3 R_\odot$ и значениях других параметров, приведенных в тексте.

Поведение интегральных кривых можно понять из приближенного анализа системы (5).

В области установившегося течения ($0.2 < x \leq 1$) скорость значительно превышает тепловую и изменяется очень медленно. Описать эту область можно следующей системой:

$$\begin{aligned} W \frac{dW}{dx} &= \frac{g\delta}{x^3} - C_0 W \pi_r, \\ \frac{d\pi_r}{dx} &= - \frac{4i}{Qx^4}, \end{aligned} \quad (6)$$

где $\pi_r = C^4$ — безразмерное давление излучения. Из второго уравнения следует, что во внутренних слоях звезды

$$\pi_r \approx \frac{4i}{3Qx^3}, \quad (7)$$

и, следовательно, в области, где происходит основное ускорение газа,

Рис. 2. Зависимость безразмерной скорости на уровне фотосферы от величины параметра δ при $R_* = 3 R_{\odot}$. Сплошная кривая — результат численного интегрирования, пунктирная — оценки по формуле (13).

Рис. 3. Зависимость безразмерной скорости на уровне фотосферы от радиуса фотосферы для $\delta = 0.01$. Данные численного счета — сплошная кривая, оценки по формуле (13) — пунктирная.

$$W \frac{dW}{dx} \approx \frac{g\delta}{x^2},$$

т. е.

$$W^2 \approx \frac{2g\delta}{x_1}. \quad (8)$$

Поскольку слой, в котором происходят основные ускорения, является узким, x_1 приближенно можно определить из условия:

$$\frac{g\delta}{x_1^2} = C_0 W_* \pi_r(x_1). \quad (9)$$

Учитывая (7) и (8), получим:

$$x_1 = \sqrt{\frac{8C_0\delta}{3QW_*}}. \quad (10)$$

Принимая во внимание, что $L \approx L_c$ и $A \approx 1$, имеем

$$x_1 \approx \frac{V_{\text{esc}}}{V_* \cdot c} \quad (11)$$

и

$$\delta \approx \frac{V_*}{V_{\text{esc}}} \sqrt{\frac{V_*}{c}}, \quad (12)$$

где $V_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{R_*}}$ — скорость убегания с поверхности звезды.

4. *Обсуждение результатов.* Знание V_* и V_{esc} позволяет оценить величину δ и уровень внутри звезды, на котором происходит переход через скорость звука.

Полученные оценки делают понятным поведение кривых, представленных на рис. 2 и 3. Действительно, из (12) следует, что

$$W_* = 205 \left(\frac{\delta^2 \frac{M}{M_\odot}}{R_*/R_\odot} \right)^{1/3}, \quad (13)$$

и, следовательно, W_* растет при увеличении δ и уменьшении R_* , причем последняя зависимость должна быть более слабой.

Приведенные выше оценки позволяют определить скорость потери массы звездой $|\dot{M}| = 4\pi R_*^2 \rho_* V_*$. Поскольку $\rho_* R_* x_* \approx 1$, а $V_* = (\delta^2 V_{\text{esc}}^2)^{1/3}$, то

$$|M| = \frac{4\pi \sqrt[3]{2Gc} \delta^{2/3} M^{1/3} R_*^{2/3}}{x_e} = 3.36 \cdot 10^{-5} \delta^{2/3} \left(\frac{M}{M_\odot}\right)^{1/3} \left(\frac{R_*}{R_\odot}\right)^{2/3} \frac{M_\odot}{\text{год}} \quad (14)$$

Таким образом, по M , R_* и V_* можно оценить δ , а затем и $|M|$.

Кроме того, если у звезд WR $L \approx L_c$, то по известной массе (скажем, из наблюдений двойных систем) можно определить светимость звезды:

$$L = \frac{4\pi c GM}{x_e} \quad (15)$$

А знание светимости позволит определить расстояние до звезды. Соотношение (15) можно использовать и для оценки массы, если известна светимость.

Наконец, результаты численного счета показывают, что исходные предположения о доминирующей роли электронного рассеяния в процессах переноса излучения и малости газового давления по сравнению с лучистым ($\beta_0 \gg 1$) выполняются во всей области течения от дозвуковых до сверхзвуковых скоростей.

В задачу этой работы не входило построение полной модели звезды WR, а только рассмотрение возможности ускорения вещества внутри звезды при условии, что $L \gtrsim L_c$. Построение модели от сверхзвуковой оболочки до квазистатического ядра требует учета газового давления в системе (3), ибо, как показывают оценки, роль газового давления при движении внутрь звезды возрастает.

В заключение подчеркнем еще несколько важных моментов.

1) При анализе исходной системы предполагалось, что M не зависит от r , т. е., что основная масса заключена в квазигидростатическом ядре. Используя данные численного счета при $\delta = 0.01$ от $x = 0.16$ до $x = 1$ и $W_* = 10$, мы получили

$$M_{об} = 4\pi R_*^3 \rho_* \int_{0.16}^1 \mu x^3 dx = 6 \cdot 10^{24} \text{г},$$

т. е. $M_{об} \ll M_{ядра}$, что согласуется со сделанным предположением.

2) Проведенный анализ показывает, что расчет моделей внутреннего строения звезд WR должен давать радиус гидростатической звезды r_* , примерно на порядок меньший, чем измеренные радиусы фотосфер звезд WR, R_* . Грубая оценка r_* может быть сделана по формуле (11).

3) В работах [12—13] рассматривалось ускорение вещества в оболочке звезды при переменной непрозрачности для случая, когда $L < L_c$ в до-

звуковой области и $L > L_c$ после перехода через скорость звука. В работе [14] проведено детальное исследование системы (1) при $\bar{x} = \text{const}$ и произвольных значениях параметров. Мы здесь задавались целью использовать некоторые особенности системы (1) для описания течения внутри звезды WR, полагая $x = x_*$ и $L \geq L_c$ во всей области ускорения.

4) В рассмотренной нами модели скорость на фотосфере V_* зависит от величины параметра δ (рис. 2 и формула (8)). Наблюдаемому значению $V_* \sim 300$ км/с для V 444 Cyg соответствует, как уже отмечалось, $\delta = 0.013$. Для описания ускорения в атмосфере звезды WR за счет томсоновского рассеяния излучения на электронах в работе [5] брались значения $g\delta = 211-1243$. Тогда по формуле (8) (при $x_* \sim 0.1$) $W_* = 60 \div 160$, что соответствует скорости на фотосфере ≥ 1000 км/с, а это противоречит данным наблюдений. Следовательно, если верна предложенная здесь модель, то в атмосферах звезд WR должен работать другой (не связанный с томсоновским рассеянием) механизм ускорения.

Физический институт
им. П. Н. Лебедева АН СССР

ON A FORMATION OF A MASS FLOW FROM WOLF-RAYET STARS

I. F. MALOV, V. I. SHISHOV

The mechanism of an acceleration of matter in Wolf-Rayet stars due to radiation is considered. This mechanism operates if $L \geq L_c = \frac{4\pi c GM}{x_*}$ and $\tau_* \gg 1$. It allows a smooth transition from subsonic velocities to supersonic ones. On the basis of some assumptions, luminosities of Wolf-Rayet stars and distances to them can be estimated from observed values of masses.

ЛИТЕРАТУРА

1. L. B. Lucy, P. M. Solomon, Ap. J., 159, 879, 1970.
2. И. Ф. Малов, Труды ФИАН, 62, 33, 1972.
3. М. В. Конюков, И. Ф. Малов, Труды ФИАН, 62, 188, 1972.
4. И. Ф. Малов, Астрофизика, 8, 227, 1972.
5. И. Ф. Малов, Астрофизика, 10, 575, 1974.
6. А. В. Гончарский, А. М. Черепашук, А. Г. Язюла, Численные методы решения обратных задач астрофизики, Наука, М., 1978, стр. 272.
7. С. В. Рублев, А. М. Черепашук, в сб. «Явления нестационарности и звездная эволюция», Наука, М., 1974, стр. 47.

8. С. В. Рублев, Изв. САО, 4, 3, 1972.
9. М. Ильмас, Т. Нулис, Эмиссионные линии в спектрах звезд Вольфа—Райса, Тарту, 1973.
10. С. В. Рублев, Астрон. ж., 42, 718, 1965.
11. С. Э. Беленький, Труды ФИАН, 10, 15, 1958.
12. Г. С. Бисноватый-Коган, Я. Б. Зельдович, Астрон. ж., 45, 241, 1968.
13. G. S. Bisenovaty-Kogan, Astrophys. Space Sci., 22, 307, 1973.
14. Г. С. Бисноватый-Коган, Прикладная мат. и мех., 31, 762, 1967.