ГЕМОГЛОБИН—ПРЕДШЕСТВЕННИК КОРОНАРОСУЖИВАЮЩИХ ПЕПТИДНЫХ ФАКТОРОВ

БАРХУДАРЯН Н. А., *КЕЛЛЕРМАН И., *ЛОТШПАЙХ Ф., ГАЛОЯН А.А.

Институт биохимии им. Г. Х. Бунятыана АН Армении, Ереван

*Институт биохимии им. Макс-Плаука, Мюнхен

Исследованы свойства синтетических пептидов—VVYRWI, LVVYRWI, LVVYRWIQTQ, LVVYRWIQRQF, полученных методом твердофазного синтеза на основе известной первичной структуры гипоталамических коронаросуживающих пептидных факторов, 3 из которых, как было установлено нами, оказались фрагментами 33-37, 33—38 и 32—38 β-цепи гемоглобина. Исследуя воздействия синтетических пептидов на тест-системы, специфичные для нативных коронаросуживающих пептидных факторов, обнаружили идентичность свойств синтетических и нативных пептидов. Обсуждается вопрос об образовании коронаросуживающих пептидных факторов в условиях *in vivo*.

В 1988 г. мы сообщили о выделении и очистке 5 коронаросуживающих пептидных факторов (ПФ₁₋₅) из гипоталамуса крупного рогатого скота [1]. Нами было установлено, что ПФ₁₋₅ вызывают Ca²⁺-независимую активацию ряда Ca²⁺-кальмодулинзависимых ферментов [2—4], таких как киназа легких цепей миозина (КЛЦМ), кальмодулинчувствительная ФДЭ cAMP, путем Ca²⁺-независимого связывания с кальмодулином [5—7]. Было выдвинуто предположение, что ПФ₁₋₅ являются аллостерическими регуляторами кальмодулина, приводящими его структуру, в зависимости от своей концентрации, в различные активные конформационные состояния [5—6]. Дальнейшие исследования показали, что ПФ₁₋₅ стимулируют процесс агрегации тромбоцитов (от 25 до 30%) и сокращение изолированной аорты кролика (от 20 до 25%) [2, 3]. Стимуляция обоих этих процессов связана с активацией КЛЦМ комплексом кальмодулин—ПФ [4]. В данном случае ПФ₁₋₅ выполняют функцию ионов кальция, являясь, по-видимому, его эндогенными заместителями. На основании полученных данных мы пришли к заключению, что коронаросуживающие пептидные факторы гипоталамуса можно причислить к числу Ca²⁺-независимых регуляторов в клетке, которые, возможно, и в условиях *in vivo* могут принимать участие в регуляции активности КЛЦМ, ФДЭ cAMP и, вероятно, других Ca²⁺-кальмодулинзависимых систем (при низком внутриклеточном уровне содержания Ca²⁺).

В недавно проведенных исследованиях по выяснению первичной структуры ПФ₁₋₅ было обнаружено, что 3 из них являются фрагментами 33—37, 33—38 и 32—38 β-цепи гемоглобина [4, 8].

Интересно отметить, что в литературе имеются данные о том, что сама молекула гемоглобина обладает коронаросуживающими свойствами [9, 10]. Кроме того, оказалось, что еще в 1980 г. Чапгом и соавт. [11] из гипоталамуса свиньи были выделены 2 пептида, которые являлись фрагментами 32—40 и 31—40 β -цепи гемоглобина. Однако биологическая активность этих пептидов не была установлена. Оказалось также, что геморфины—пептиды, полученные в результате протеолитического распада гемоглобина и обладающие сильными опноидными свойствами, являются фрагментами 34—37 и 34—38 β -цепи гемоглобина [12].

На основании полученных нами данных, а также имеющейся в литературе информации было сделано предположение, что остальные 2 коронаросуживающих ПФ с невыясненной пока первичной структурой также являются фрагментами β -цепи гемоглобина, отличающиеся от структуры вышеуказанных коронаросуживающих ПФ лишь длиной пептидной цепи.

Для проверки указанного предположения, а также с целью исследования свойств синтетических пептидов (П), полученных согласно выявленной структуре нативных коронаросуживающих ПФ, были синтезированы 4 пептида, представляющие фрагменты 32—39 (П₁), 32—41 (П₂), 32—38 (П₃) и 33—38 (П₄) β -цепи гемоглобина.

Данная статья посвящена изучению воздействия синтетических пептидов на тест-системы, специфичные для нативных ПФ₁₋₅ с целью сравнения активности и механизма действия синтетических и нативных пептидов.

Материалы и методы

Коронаросуживающие пептидные факторы гипоталамуса выделяли по методу Галояна и соавт. [1].

Автоматический твердофазный синтез был осуществлен на синтезаторе «Applied Biosystems Model 430A», с использованием Fmoc-защитных групп [13].

Для определения образования иммунного комплекса кальмодулин-антитело был использован метод непрямого ферментзависимого иммуносорбентного анализа (ELISA) с некоторыми модификациями по методу Van Eldik и соавт. [14]. Кальмодулин (в концентрации 2,5 мкг/мл) был иммобилизован на платах при 4° в течение 18 ч. Антитела вносили в лунки плат в концентрации 7,5 мкг/мл и платы инкубировали 2 ч при комнатной температуре. В экспериментах по определению влияния ПФ на образование иммунного комплекса ПФ вносили в лунки плат вместе с антителами. Использовали различные концентрации ПФ (от 0,8 мкМ до 1,6 нМ). Анти-IgG, конъюгированный с пероксидазой хрена вносили в лунки плат в разведении 1:1000 и платы инкубировали 2 ч при комнатной температуре. Через 60 мин после добавления субстрата (H₂O₂ и о-фенилендиамин) содержимое

лунок фиксировали добавлением 2 н. H_2SO_4 и измеряли поглощение при 492 нм.

Высокоочищенные препараты КЛЦМ получали по методу Dabrowska и соавт. [15—16] из желудков кур. Фосфорилирование легких цепей (ЛЦ) миозина гладкой мускулатуры желудка кур с M_r 20 кД проводили в течение 25 мин при 25° в инкубационной среде, содержащей 70 мкг очищенного миозина, 20 мМ фосфатного буфера, рН 8,0, 12,5 мМ $MgCl_2$, 0,1 мМ $CaCl_2$, 5 мМ АТР, 1,5 мкМ КЛЦМ и 4,5 мкМ кальмодулина. Включение фосфата в ЛЦ миозина регистрировали при электрофорезе в ПААГ в присутствии 8 М мочевины по методу Peggie и соавт. [17]. Относительное содержание фосфорилированных ЛЦ в миозине определяли при анализе денситограмм гелей электрофореза, окрашенных Кумасси R-250.

Количество белка определяли по методу Lowry и соавт. [18]. Эксперименты на изолированной аорте кролика проводили по методу Kapanogi и соавт. [19].

Агрегацию тромбоцитов исследовали на агрегометре «Payton» (США) с использованием в качестве агреганта 5 мкМ АДФ. Исследования проводили на крови здоровых доноров. Богатую тромбоцитами плазму получали центрифугированием крови при 2000 г в течение 10 мин по методу Borg [20].

В работе были использованы следующие реактивы: АТР, АДФ («Sigma», США), $CNBr$ —активированная сефароза 4В, сефарил S-300, сефадек G-10, фенол-сефароза («Pharmacia», Швеция), $MgCl_2$, $CaCl_2$, ацетонитрил («Merck», ФРГ), ЭГТА, Кумасси R-250, акриламид, бисакриламид, TEMED, персульфат аммония, Dowex 50W $\times$ 8 («Sovva», ФРГ), остальные реактивы марок х.ч. и о.ч. («Союзхимреактив»).

Результаты и обсуждение

Одним из наиболее чувствительных тестов для PF_{1-5} является их способность ингибировать образование иммунокомплекса кальмодулин-антитело путем Ca^{2+} -независимого связывания с кальмодулином [5—7]. Поэтому прежде всего было изучено влияние синтетических пептидов на образование иммунокомплекса кальмодулин-антитело с помощью метода ELISA.

На рис. 1 представлены данные относительно влияния нативных PF_3 и PF_4 и соответствующих им по структуре синтетических пептидов (P_3 и P_4) на образование иммунокомплекса. Как видно из рис. 1, P_3 и P_4 подобно PF_3 и PF_4 в значительной степени ингибируют образование иммунокомплекса. Концентрации, вызывающие 50%-ное ингибирование образования иммунокомплекса (I_{50}), равны 5,4; 12,8; 21,8; 33,4 нМ для PF_3 , PF_4 , P_3 и P_4 соответственно. Для P_1 и P_2 величины I_{50} были равны 24,6 и 29,5 нМ соответственно. Принимая во внимание тот факт, что для PF_{1-5} величины I_{50} находятся в диапазоне концентраций от 2,5 до 31,6 нМ [5, 6], мы можем зак-

лючить, что синтетические пептиды обладают таким же сродством к кальмодулину, как и нативные. Тем не менее, нужно отметить, что ПФ₃ и ПФ₄ были несколько более активны, чем П₃ и П₄.

Как было указано выше, гипоталамические ПФ₁₋₅ вызывают Ca²⁺-независимое активирование некоторых Ca²⁺-кальмодулинзависимых ферментов [2-4]. В этом аспекте более детально нами было изучено воздействие ПФ₁₋₅ на активность КЛЦМ, выделенной из скелетной и гладкой мускулатуры. В частности, было установлено,

Рис. 1. Влияние нативных коронаросуживающих пептидных факторов (ПФ₁—1; ПФ₂—2) и синтетических пептидов (П₃—3; П₄—4) на образование иммунного комплекса кальмодулин-антитело. Кальмодулин был иммобилизован на платках в концентрации 2,5 мкг/мл, а антитела использовали в концентрации 7,5 мкг/мл. По оси абсцисс—концентрации пептидов в нМ. По оси ординат—% связывания антител с кальмодулином

что ПФ₁₋₅ осуществляют свое воздействие на активность КЛЦМ путем Ca²⁺-независимого связывания с молекулой кальмодулина и образования комплекса кальмодулин-пептидный фактор, который, связываясь с каталитической субъединицей фермента, вызывает его активацию (от 30 до 100% для КЛЦМ скелетной мышцы и от 80 до 100% и более для КЛЦМ гладкой мускулатуры). С учетом этих данных представлялось целесообразным изучить воздействие синтетических пептидов на активность КЛЦМ.

Исследования показали, что синтетические пептиды, также как ПФ₁₋₅ вызывают Ca²⁺-независимое активирование КЛЦМ гладкой мускулатуры от 80 до 100% (таблица), причем для проявления их

активирующего действия необходимо, как и в случае ПФ₁₋₅ обязательное наличие кальмодулина в инкубационной среде. Этот факт свидетельствовал о том, что механизм действия синтетических пептидов аналогичен механизму действия ПФ₁₋₅ на активность КЛЦМ: происходит Ca²⁺-независимое связывание пептидов с молекулой кальмодулина и образование активного комплекса кальмодулин-пептид. В данном случае синтетические пептиды, как и ПФ₁₋₅ выполняют по-видимому, функцию ионов кальция.

Рис. 2. Ca²⁺-независимое активирование киназы легких цепей миозина (КЛЦМ) под воздействием пептидных факторов гипоталамуса (ПФ₃₋₁; ПФ₄₋₂) и синтетических пептидов (П₃₋₃; П₄₋₄; П₂₋₅). По оси абсцисс—концентрации пептидов в нМ, по оси ординат—относительная активность КЛЦМ в%. За 100%-ную активность фермента принимали такое его количество, которое вызывало в течение 25 мин при 25° фосфорилирование легких цепей миозина на 50%

Было изучено также воздействие различных концентраций П₂, П₃, П₄ и ПФ₃, ПФ₄ на активность КЛЦМ (рис. 2). Оказалось, что концентрации, необходимые для полумаксимальной активации КЛЦМ равны 3,9, 3,2, 2,7, 3,0, 2,6 нМ для П₂, П₃, П₄, ПФ₃, ПФ₄ соответственно. Полученные данные позволили заключить, что и в данном случае синтетические и нативные пептиды обладают почти одинаковой активностью.

Как было сказано выше, ПФ₁₋₅ (в концентрации 0,1 мкг/мл) стимулировали сокращение изолированной аорты кролика в K⁺-деполяризующем растворе, содержащем 40 мМ KCl от 20 до 25%. ПФ₁₋₅ в той же дозе стимулировали также процесс агрегации тромбоцитов, вызванный 5 мкМ ADP от 25 до 30% [2, 3]. Проведенные эксперименты показали, что синтетические пептиды (в дозе 0,1 мкг/мл) стимулировали процесс сокращения изолированной аорты кролика в K⁺-деполяризующем растворе (рис. 4) и процесс агре-

гадии тромбоцитов, вызванный 5 мкМ ADP (рис. 5) почти в той же степени, что и ПФ₁₋₅. Известно, что такие антагонисты кальмодулина, как W-7 и его структурные аналоги в условиях *in vitro* ингибируют процесс агрегации тромбоцитов и обеспечивают релаксацию гладкой мускулатуры путем Ca²⁺-зависимого связывания с кальмодулином, что в свою очередь ингибирует активность Ca²⁺-кальмодулинзависимых систем и, в частности, активность КЛЦМ [21]. Синтетические пептиды, как и ПФ₁₋₅ стимулируют эти процессы, по-видимому, также путем связывания с молекулой кальмодулина, но Ca²⁺-независимым способом, являясь, по существу, эндогенными заместителями Ca²⁺.

Таблица

Активирование киназы легких цепей миозина (КЛЦМ), выделенной из гладкой мускулатуры желудка кур, под воздействием коронаросуживающих пептидных факторов гипоталамуса (ПФ) и синаптических пептидов (П₁, П₂, П₃, П₄)

Соединения	Относительная активность, %
Ca ²⁺	0
Ca ²⁺ + кальмодулин	100
Ca ²⁺ + ПФ _{1, 2, 3, 4, 5}	0
ЭГГА + кальмодулин	0
ЭГГА + кальмодулин + ПФ ₁	100
ЭГГА + кальмодулин + ПФ ₂	80
ЭГГА + кальмодулин + ПФ ₃	100
ЭГГА + кальмодулин + ПФ ₄	100
ЭГГА + кальмодулин + ПФ ₅	85
Ca ²⁺ + П _{1, 2, 3, 4}	0
ЭГГА + кальмодулин + П ₁	80
ЭГГА + кальмодулин + П ₂	90
ЭГГА + кальмодулин + П ₃	85
ЭГГА + кальмодулин + П ₄	100

Примечание. Исследуемые соединения использовали в следующих концентрациях: кальмодулин—4,5 мкМ, CaCl₂—0,1 мМ, ЭГГА—1 мМ, КЛЦМ—1,5 мкМ, ПФ₁₋₅—0,05 мкМ, П₁₋₄—0,05 мкМ. За 100%-ную активность фермента принимали такое количество КЛЦМ, которое вызывало в течение 25 мин при 25° фосфорилирование легких цепей миозина на 50%.

Таким образом, изучение воздействия синтетических пептидов на тест-системы, специфичные для нативных ПФ₁₋₅, показало, что синтетические пептиды обладают всеми свойствами нативных ПФ₁₋₅—активность синтетических пептидов во всех рассмотренных тестах была близка к активности нативных коронаросуживающих пептидов, а механизм их действия аналогичен механизму действия ПФ₁₋₅: Полученные результаты подтвердили наше предположение о том, что остальные два коронаросуживающих ПФ с невыясненной пока структурой также являются фрагментами β-цепи гемоглобина, отличающимися от структуры вышеуказанных коронаросуживающих ПФ лишь длиной пептидной цепи, и не исключено, что они представляют собой фрагменты 32—39 и 32—41 β-цепи гемоглобина.

Существует ли ПФ в условиях *in vivo* или они—артефакт и образуются в результате частичного аутолиза в ходе очистки. Мы

полагаем, что ПФ₁₋₅ существуют *in vivo* поскольку: 1—различное время хранения гипоталамуса в незамороженном состоянии после забоя животных (от 1 до 6 ч) не изменило существенно состав основных пиков в профиле хроматограмм после последней стадии очистки с использованием метода ВЭЖХ; 2—одни и те же пептиды были получены при использовании различных модификаций методов очистки. На примере проопиомеланокортина, который является предшественником β-липотропина, эндорфинов, β-МСГ, показано, что природа предпочитает синтезировать пептиды с разной биологической активностью в составе общего предшественника, из которого затем они образуются в результате ограниченного протеолиза. В частности, показано, что эндорфины образуются из β-липотропина под воздействием внутриклеточной протеиназы [22—24]. В этом случае ограни-

Рис. 3. Влияние пептидного фактора гипоталамуса (ПФ₃—3) и синтетического пептида (П₃—2) на сократительную способность изолированной аорты кролика в К⁺-деполяризующем растворе. По оси ординат — степень сокращения аорты в %. Максимальное сокращение, вызываемое 40 мМ КСl, принимали за 100%. Воздействие пептидов исследовали при достижении максимума сокращения. 1—контроль, не содержащий пептидов

ченный протеолиз приводит к образованию соединений с новыми биологическими свойствами. Тот факт, что фрагмент 32—41 β-цепи гемоглобина содержит пептиды с разной биологической активностью (геморфины и коронаросуживающие ПФ), свидетельствует о том, что эти пептиды могут синтезироваться в мозгу в составе общего предшественника—гемоглобинподобного белка и затем образоваться в результате ограниченного протеолиза этого белка при различных физиологических и патологических состояниях организма.

С другой стороны, поскольку гипоталамусе принадлежит к тем участкам головного мозга [25—27], где ГЭБ наиболее уязвим и возможен свободный обмен биологически активными пептидами и гормонами между нервными окончаниями и кровью, не исключена возможность, что именно гемоглобин является предшественником этих пептидов, которые могут образоваться в результате его ограниче-

ного протеолиза также при различных физиологических и патологических состояниях организма и затем проникнуть в первые клетки гипоталамуса и принять участие в метаболических процессах нервной клетки.

Рис. 4. Влияние коронаросуживающего пептидного фактора (ПФ₃) и синтетического пептида (П₂) на степень агрегации тромбоцитов, вызванной 5 мкМ АДФ. К—контроль, не содержащий пептидов. Тромбоциты были преинкубированы с пептидами (0,1 мкг/мл) при 37° в течение 3 мин в южете агрегометра до стимуляции, вызванной 5 мкМ АДФ. По оси ординат—степень агрегации тромбоцитов в %

Высказанные нами две различные точки зрения для объяснения присутствия ПФ₁₋₅ в ткани гипоталамуса являются лишь нашими предположениями и для четкого ответа на этот вопрос требуется проведение углубленных исследований в этом направлении.

HEMOGLOBIN, THE PRECURSOR OF CORONARO-CONSTRICTORY PEPTIDE FACTORS

BARKHUDARYAN N. A., *KELLERMANN J., *LOTTSPEICH F., GALOYAN A. A.

G. Ch. Bunyatyan Institute of Biochemistry, Academy of Sciences of the Armenia, Yerevan.

*Max-Planck Institute of Biochemistry, Munich

The properties of synthetic peptides—VVYPWT, LVVYPWT, LVVYPWTQ, LVVYPWTQRF (obtained by solid phase peptide synthesis on the basis of the revealed primary structure of hypothalamic coronarospasmodic peptide factors) were investigated. It was established that 3 of coronarospasmodic peptide factors represent fragments 33—37, 33—38, 32—38 of the β -chain of hemoglobin. Using test systems specific

For native coronar-constrictory peptide factors the identity of the properties of synthetic peptides and native coronar-constrictory peptide factors was established. The possibility of the formation of the hypothalamic coronar-constrictory peptides in vivo are discussed.

ЛИТЕРАТУРА

1. Галоян А. А., Бархударян Н. А., Валко К., Закарян Т. Р. *Нейрохимия*, т. 7, № 4, с. 519—524, 1988.
2. Бархударян Н. А., Закарян Т. Р., Шувалова Л. А., Чацлян С. Г., Алексанян А. Р., Галоян А. А. *Нейрохимия*, т. 8, № 4, с. 485—491, 1989.
3. *Barkhudaryan N., Zatoryan T., Aleksanyan A., Sharova N., Shuvalova L., Chailyan S., Galoyan A.* 8th ESN Meeting, Leipzig, p. 21, 1990.
4. Закарян Т. Р., Бархударян Н. А., Шувалова Л. А., Островская М. В., Шарова Н. П., Галоян А. А. *Нейрохимия*, т. 9, № 4, с. 444—449, 1990.
5. Бархударян Н. А., Хорват Л., Галоян А., Овади Ю. *Нейрохимия*, т. 9, № 2, с. 188—195, 1990.
6. Horvath L., Barkhudaryan N., Galoyan A., O'adi J. 20th Meeting FEBS, Budapest, Hungary, p. 27, 1990.
7. Horvath L., Barkhudaryan N., Galoyan A., O'adi J. *FEBS Lett.* v. 276, № 1, 2, p. 197—200, 1990.
8. *Barkhudaryan N., Oberthür W., Lottspeich F., Galoyan A.* *Neurochemical Res.*, 1991 (in press).
9. Vogel W. M., Dennis R. C., Cassidy G., Apstein C. S., Valeri C. R. *Am. J. Physiol.*, v. 251, p. H413—H420, 1986.
10. Vogel W. M., Hsia J. C., Briggs L., Er S. S., Cassidy G., Apstein C. S., Valeri C. R. *Life Sci.*, v. 41, p. 89—93, 1987.
11. Chang R. C., Huang W. Y., Redding T. W., Arimura A., Coy D. H., Shally A. V. *Biochim. et biophys. acta*, v. 625, p. 256—273, 1980.
12. Brantl V., Gramsch C., Lottspeich F., Mertz R., Jaeger K.—H., Herz A. *Eur. J. Pharmacol.*, v. 125, p. 309—310, 1986.
13. Meierhofer J. M., Waki E. P., Hermer T. J., Lambros R. C., Makofske C.—D., Chang R. C. *Int. J. Pept. Res.* v. 13, p. 33—39, 1979.
14. Van E'dik L. J., Watterson D. M.—In: *Calcium Physiology* (ed. Marme D)—Springer Berlin, p. 215—226, 1984.
15. Dabrowska R., Aromatorio D., Sherry J. M. F., Hartshorne D. J. *Biochem. Biophys. Res. Commun.*, v. 78, p. 1263—1277, 1977.
16. Dabrowska R., Sherry J. M. F., Aromatorio D., Hartshorne D. J. *Biochemistry*, v. 17, p. 253—253, 1978.
17. Perrie W. T., Perry S. V. *Biochem. J.*, v. 119, p. 31—38, 1979.
18. Lowry O. H., Rosebrough H. J., Farr L. A., Randall C. I. *J. Biol. Chem.* v. 193, p. 265—275, 1971.
19. Kanamori M., Naka M., Asano M., Hidaka H. *J. Pharmac. Exper. Therap.* v. 217, p. 494—499, 1981.
20. Born G. V. R. *Nature*, v. 194, p. 927—929, 1962.
21. Hidaka H., Asano M., Tanaka T. *Mol. Pharmacol.*, v. 20, p. 571—578, 1981.
22. Graf L., Kenessey A. *FEBS Lett.*, v. 69, p. 255—260, 1976.
23. Graf L., Kenessey A., Berzetei I., Ronai A. *Biochim. Biophys. Res. Commun.*, v. 78, p. 1114—1123, 1977.
24. Graf L., Kenessey A., Pully A., Grynbaum A., Mark N., Lajtha A. *Arch. Biochem. et biophys.*, v. 193, p. 101—109, 1979.
25. Bouchaud C., Bosler O. *Int. Rev. Cytol.*, v. 105, p. 283—327, 1986.
26. Leonhardt H. In: *Handbuch der Mikroskopischen Anatomie des Menschen* (ed. A. Oksche), p. 177—606, Springer-Verlag, 1980.
27. Risau W., Wolburg H. *TINJ*, v. 13, p. 174—178, 1990.

Поступила 20. I. 1991