УДК 577.1+577.15

РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ МОНОАМИНОКСИДАЗ МОЗГА
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ К КАТАЛЕПСИИ КРЫС
НА УРОВНЕ ТРАНСКРИПЦИИ

ВОЙТЕНКО Н. Н.

Институт цитологии и генетики СО АН СССР, Новосибирск

В основе одной из распространенных психопатологий поведения — инзофрении лежит нарушение метаболизма нейромедиаторов мозга, в частности дофамина и серотонина [1], что вызывает необходимость тщательного изучения молекулярных механизмов регуляции метаболизма нейромедиаторов. Роль генома в регуляции активности MAO [(MAO) амин: кислород оксидоредуктаза (дезаминирующая) (содержащая флавин)], фермента деградации многих моноаминов, при этой патологии поведения изучена мало. Ранее нами был установлен высокий уровень активности MAO типа B у крыс, селекционированных на предрасположенность к развитию каталепсии [2], которая является одним из синдромов инзофрении.

В настоящей работе изучали роль генома в вызываемых эмоциональным стрессом изменениях активности MAO мозга у генетически предрасположенных к каталепсии крыс, селекционированных из аутбредной линии *Wistar* [2].

Крыс с генетической каталепсией (ГК) в возрасте 4 месяцев, массой 220—250 г за два дня до эксперимента помещали в индивидуальные клетки для снятия эффекта группового содержания на поведение и метаболизм нейромедиаторов мозга. Корм и воду не ограничивали. Световой режим соответствовал сезону (ноябрь). Эмоциональный стресс вызывали содержанием крыс в тесных проволочных клетках в течение 60 мин. Контролем служили интактные крысы, находившиеся в это время в своих обычных клетках. Актиномицин D («Fluka», ФРГ) в дозе 10 мкг на 100 г [3] вводили крысам интраперитонеально за 60 мин до помещения крыс в тесную клетку. Контролем служили крысы, получавшие актиномицин D без последующего ограничения подвижности. Эту группу животных декапитировали в 11 ч. Кроме того, другую группу животных, предрасположенных к каталепсии, и крыс линии *Wistar* декапитировали в 9 ч, поскольку известны суточные колебания активности MAO мозга [4]. Мозг (без мозжечка) выделяли на холоде, гомогенизировали в 0.32 M растворе сахарозы, методом дифференциального центрифугирования выделяли фракцию неразделенных митохондрий P₂ [4], которую хранили при -20° до исследования. Определение активности MAO проводили по Горкину и соавт. [5] в модификации Силаковой и соавт. [6]. Специфическим субстратом MAO типа A служил 1.0 мМ серотонин

креатининсульфат («Reanal», Венгрия), специфическим субстратом MAO типа Б—1,0 мМ бензиламин солянокислый (Харковский ФЗ, СССР). Активность MAO выражали в нмоль аммиака за мин на мг белка. Белок определяли по Lowry.

Полученные нами данные (рис. 1) свидетельствуют о более высокой активности MAO типа Б в мозгу предрасположенных к каталепсии крыс и согласуются с нашими предыдущими данными [2]. В настоящем исследовании, проведенном на целом мозгу, не обнаружено различий в исходной активности MAO типа А у крыс каталептиков и некаталептиков, хотя ранее нами наблюдалось [2] понижение активности MAO типа А в полушариях мозга крыс каталептиков. Это свидетельствует о возможности локального нарушения метаболизма серотонина, специфического субстрата MAO типа А при каталепсии.

Рис. Активность MAO типа А и типа Б (в нмоль NH₃/мг белка·мин) мозга крыс линии Wistar (1) и предрасположенных к каталепсии крыс (2) в 11 ч (а) и в 9 ч (б). * $p < 0,05$ по сравнению с крысами линии Wistar (1)

Таблица

Изменение активности MAO мозга крыс, предрасположенных к каталепсии, под влиянием ограничения подвижности

Серия опытов	Число животных	MAO типа А	MAO типа Б
Контроль (11 ч)	4	1,78±0,04	3,23±0,20
Стресс	5	1,66±0,07	4,08±0,18**
Актономицин Д	5	1,81±0,14	3,08±0,11
Актономицин Д + стресс	5	2,23±0,16	2,03±0,11*

Примечание. * $p < 0,05$ по сравнению с актономицином Д, ** $p < 0,05$ по сравнению с контролем.

Предрасположенные к каталепсии крысы на эмоциональный стресс, вызванный ограничением подвижности, реагировали повышением активности MAO типа Б при неизменной активности MAO типа А (таблица). Эта реакция существенно отличалась от описанной нами ранее [7] реакции MAO мозга крыс линии *Wistar*, у которых ограничение подвижности вызывало существенное понижение активности MAO типа Б и повышение активности MAO типа А.

Действие стресса на MAO типа Б, характерное для крыс линии *Wistar*, то есть понижение ее активности у предрасположенных к каталепсии крыс проявлялось только после предварительного введения актиномицина Д, ингибитора синтеза ДНК-зависимой РНК-полимеразы (таблица). Это дает основание предположить, что у крыс каталептиков под влиянием стресса синтезируется м-РНК, которая кодирует индуцибельную группу MAO типа Б. Судя по тому, что у крыс каталептиков активность MAO типа Б под влиянием стресса после предварительного введения актиномицина Д была даже ниже, чем при введении актиномицина Д без стресса, следует полагать, что синтез конститутивной группы MAO типа Б у крыс каталептиков также нарушен. Обнаруженная нами устойчивость MAO типа А к воздействию эмоционального стресса и актиномицина Д у предрасположенных к каталепсии крыс может быть связана с изменением структуры этого типа MAO, что предполагается у больных шизофренией [8].

Следует отметить, что были обнаружены существенные изменения в активности MAO мозга в течение утренних часов. Так, в 9 ч активность MAO типа Б (рисунок) у крыс каталептиков была ниже, а активность MAO типа А выше, чем у крыс линии *Wistar*. Наряду с этим, в 11 ч у крыс каталептиков изменялась только активность MAO типа Б (повышалась), активность MAO типа А оставалась на неизменном уровне. У крыс линии *Wistar* к 11 ч изменялась активность обеих типов MAO, но эти изменения отличались от тех, которые наблюдались у каталептиков: у крыс линии *Wistar* повышалась активность MAO типа А и понижалась активность MAO типа Б (рисунок), и эти данные совпадают с полученными нами ранее в 11 ч [2]. Приведенные факты свидетельствуют о неодинаковом колебании активности MAO мозга в зависимости от времени суток у предрасположенных и непредрасположенных к каталепсии крыс. Можно предположить, что неадекватное изменение активности MAO типов А и Б мозга у каталептиков связано с нарушением регуляции активности фермента и ведет к рассогласованию физиологических функций этих двух типов MAO в мозгу, которое может проявиться в разбалансировании процессов освобождения и обратного захвата серотонина и дофамина [9], в нарушении серотониновой и дофаминной нейротрансмиссии [10], в проявлении патологического поведения, каталепсии.

Таким образом, у предрасположенных к каталепсии крыс ГК при эмоциональном стрессе в 11 ч найдено повышение активности MAO типа Б в мозгу при неизменной активности MAO типа А. Регуляция активности MAO типа Б в это время при эмоциональном стрессе у предрасположенных к каталепсии крыс изменена, по-видимому, на уровне транскрипции. Устойчивость MAO типа А крыс каталептиков к эмоциональному стрессу следует, вероятно, связывать с измененной структурой этого фермента. Найденные нарушения в регуляции активности MAO мозга у предрасположенных к каталепсии крыс, по всей видимости, могут являться причиной рассогласования в работе

МАО мозга, которое проявляется в неадекватном изменении активности МАО в зависимости от времени суток, а также вызывать predisposition к катаlepsии.

CONTROL OF BRAIN MONOAMINE OXIDASE ACTIVITY IN RATS PREDISPOSED TO CATALEPSY AT THE TRANSCRIPTION LEVEL

VOITENKO N. N.

Institute of Cytology and Genetics, Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences, Novosibirsk

The activity of MAO-B increased, whereas that of MAO-A remained unchanged in rats genetically predisposed to catalepsy (GC) under emotional stress. A stress-induced decrease in MAO-B activity observed in control rats, was detected in GC rats only after pretreatment with Actinomycin D. In GC rats, MAO-A proved to be insensitive both to stress and Actinomycin D. It is proposed that MAO-A structure is altered in GC rats and emotional stress induces synthesis of MAO-B molecules.

ЛИТЕРАТУРА

1. Попова Н. К., Науменко Е. В., Колпаков В. Г. Серотонин и поведение, Новосибирск, 1978.
2. Попова Н. К., Войтенко Н. Н., Колпаков В. Г., Алехина Т. А. Нейрохимия, т. 7, № 4, с. 525—531, 1988.
3. Gandhi B. S., Kanungo M. S. Indian J. Biochem. Biophys., v. 11, p. 102—104, 1974.
4. Gray E. G., Whittaker V. P. J. Anat., part. 1, p. 79—87, 1962.
5. Горкин В. З., Гриднева Л. И., Романова Л. А., Северина Н. С. Биохимия, т. 27, № 6, с. 1004—1014, 1962.
6. Силакова А. И., Труш Г. П., Являкова А. Вopr. мед. химии, № 8, с. 538—545: 1962.
7. Попова Н. К., Войтенко Н. Н., Маслова Л. Н. Вopr. мед. химии, № 4, с. 114—119, 1989.
8. Москвитина Т. А., Камышанская Н. С., Горкин В. З. Вopr. мед. химии, № 1, с. 98—102, 1986.
9. Liclone J., Azzaro A. J. Naunyn Schmiedeberg's Arch. Pharmacol., v. 337, № 2 p. 151—159, 1988.
10. Henn F. A. —In: Biological Perspectives of Schizophrenia (eds. H. Helmchen, F. A. Henn), p. 299—309, John Wiley, Sons Limited C S. Bernhard, Dahlem Konferenzen, Rept. Dahlem Workshop, Berlin, 1987.

Поступила 12.II.1990