УДК 577.15+577.3+591.39

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА NAD- И NADP-ЗАВИСИМЫХ ИЗОЦИТРАТДЕГИДРОГЕНАЗ В ТКАНИ МОЗГА КУР В ОНТОГЕНЕЗЕ

АРУТЮНЯН Л. А., СИМОНЯН А. А., СИМОНЯН Р. А.

Ткань мозга, как и большинство тканей животных, содержит две изоцитратдегидрогеназы, отличающиеся по коферментной специфичности, конформационным и кинетическим характеристикам, особенностям локализации и функционирования в клетке. NAD-зависимая изоцитратдегидрогеназа (NAD-ИЦДГ; КФ 1. 1. 1. 41) локализуется исключительно в митохондриальной фракции; очищенный фермент из ткани мозга имеет $M_{260-310}$ кД[1]. NADP-зависимая изоцитратдегидрогеназа (NADP-ИЦДГ; КФ 1. 1. 1. 42), обнаруженная как в цитоплазме, так и в митохондриях ткани мозга [2], существует в мономерной и димерной формах [3].

Неодинаковы функции изоцитратдегидрогеназ в клеточном метаболизме. NAD-ИЦДГ рассматривается как «истинный компонент» цикла Кребса; участие же митохондриальной NADP-ИЦДГ в энергетическом метаболизме, как полагают, опосредовано через NADP:NAD трансгидрогеназную реакцию (NADP:NAD-оксидоредуктаза, КФ 1. 6. 1. 1.) [4]. Основная функция цитоплазматической NADP-ИЦДГ связывается с генерированием NADPH, необходимого для различных биосинтетических процессов.

Функциональные различия двух форм изоцитратдегидрогеназ обуславливают интерес к сравнительному исследованию их активности для выявления сдвигов в соотношении окислительных и биосинтетических реакций в тканях животных в ходе онтогенеза. Имеющиеся в литературе данные относительно изоцитратдегидрогеназной реакции в ткани мозга касаются преимущественно млекопитающих и охватывают в основном постнатальный период их развития [2, 5, 6]. Нас интересовало сопоставление характера течения этой реакции в ходе эмбрионального и постэмбрионального развития животных. Исходя из этого, была изучена динамика активности двух форм изоцитратдегидрогеназ в ткани мозга кур в ходе онтогенеза.

Опыты проводили на эмбрионах (10-дневных—предплодный период; 15-дневных—плодный период; 20-дневных—период выдупления),

5-дневных цыплятах (ранний постнатальный период) и зрелых курах.

Митохондриальные фракции головного мозга выделяли в 0,25 М растворе сахарозы. Промытые митохондрии разрушали добавлением 0,2%-ного тритона X-100. Обработанную тритоном митохондриальную фракцию центрифугировали при 45 000 г в течение 1 ч для осаждения митохондриальных мембран. Цитоплазматическую фракцию получали часовым центрифугированием постмитохондриального супернатанта при 100 000 г для освобождения от микросомных частиц [5].

Рис. 1. Изменение активности NAD- и NADP-ИЦДГ в субфракциях мозга кур в онтогенезе (в мкмоль NADH (NADPH) / мг белка/мин). 1—митохондриальная NAD-ИЦДГ; 2—митохондриальная NADP-ИЦДГ; 3—цитоплазматическая NADP-ИЦДГ

Определение активности NAD-ИЦДГ проводили в среде следующего состава (в мМ): трис-НСl—50 (рН 7,0), MgSO₄—10, ЭДТА—0,2. NAD добавляли в количестве 1,2 мМ, ADP и изоцитрат—по 2 мМ (конечные концентрации) [7]. Объем проб—2 мл.

Реакционная среда для определения активности NADP-ИЦДГ содержала (в мМ): трис-НСl—50 (рН 8,5), MnCl₂—2, ЭДТА—0,2. NADP добавляли в количестве 1 мМ, изоцитрат—2 мМ (конечные концентрации) [6]. Объем проб—2 мл.

Активность изоцитратдегидрогеназ определяли по образованию восстановленных форм коферментов при 340 нм на спектрофотометре марки «Spescord UV Vis» и выражали в мкмоль NADH (NADPH)/мг белка/мин. Белок определяли биуретовым методом [8].

В отдельной серии опытов изучали влияние рН среды на активность изоцитратдегидрогеназ.

Результаты исследований показали (рис. 1), что активность NAD-ИЦДГ в митохондриях мозга куриных эмбрионов начинает повышаться только со стадии вылупления и далее прогрессивно возрастает по мере созревания животных, составляя в мозгу зрелых кур более 60% от общей изоцитратдегидрогеназной активности. Активность NADP-ИЦДГ в

субфракциях мозга в эмбриональном периоде развития значительно превышает таковую NAD-ИЦДГ. В плодном периоде уровень обеих NADP-ИЦДГ в мозгу повышается, что особенно выражено в отношении митохондриального фермента, активность которого достигает максимальной величины на стадии вылупления. В раннем постнатальном периоде активность NADP-ИЦДГ в митохондриях резко падает и далее наблюдается постепенное снижение уровня обеих NADP-ИЦДГ в ткани мозга кур.

Рис. 2. Влияние рН среды на активность NAD- и NADP-ИЦДГ в ткани мозга кур в онтогенезе (в мкмоль NADH (NADPH) /мг белка/мин). а—20-дневные эмбрионы; б—5-дневные цыплята; в—куры. Обозначения те же, что и на рис. 1

Из приведенных на рис. 2 данных виден неодинаковый характер влияния рН среды на активность различных изоцитратдегидрогеназ. Для всех изученных возрастных групп обнаружена четкая зависимость активности NAD-ИЦДГ от рН инкубационной среды, с оптимумом при 7.0. По данным ряда авторов, эффект рН связан с воздействием на аллостерические свойства фермента [7]. Что касается NADP-ИЦДГ, то изменение ее активности наблюдается при повышении рН среды до 8,5 и проявляется заметнее в эмбриональной стадии развития.

Высокий уровень NADP-ИЦДГ в обеих фракциях мозга курных эмбрионов свидетельствует о ее активном участии в осуществлении связи между промежуточными продуктами цикла Кребса и аминокислотным и липидным метаболизмом, интенсивно протекающим в мозгу незрелых животных [9].

Представляет интерес динамика активности NAD-ИЦДГ в развивающемся мозгу кур. Ее повышение в митохондриях мозга совпадает с другими возрастными изменениями: образованием синапсов, синтезом миелина, появлением электрической активности, повышением Na^+ , K^+ -АТФазной активности. Эта морфологическая и физиологическая дифференциация взаимосвязаны с течением основного метаболизма и, в частности, с уровнем активности специфических энзиматических звеньев, контролирующих трикарбоновый цикл. NAD-ИЦДГ в митохондриях находится под аллостерическим контролем ADP, вызывающей кон-

формационные изменения фермента, повышающие его сродство к субстрату [10]. Снижение в митохондриях уровня АТФ приводит к ускоренному прохождению изоцитрата через цикл и, следовательно, увеличению потока электронов через дыхательную цепь и поддержанию энергетического баланса клетки. Проведенное сравнительное исследование активности двух изоцитратдегидрогеназ в ткани мозга кур в онтогенезе показало превалирование активности NADP-зависимого фермента на эмбриональной стадии развития, что связано с его ролью в течении биосинтетических процессов; активирование же NAD-зависимого фермента, лимитирующего скорость цикла трикарбоновых кислот, происходит в конце эмбриогенеза, нарастает по ходу созревания животных и направлено на удовлетворение энергетических затрат организма путем ускорения реакций этого цикла и сопряженного с ним окислительного фосфорилирования.

A COMPARATIVE STUDY OF NAD-AND NADP-DEPENDENT ISOCITRATE DEHYDROGENASES IN HENS BRAIN DURING ONTOGENESIS

HAROUTJUNIAN L. A., SIMONIAN A. A., SIMONIAN R. A.

The activities of NAD- and NADP-dependent isocitrate dehydrogenases (NAD-IDH, NADP-IDH) were investigated in hen brain subcellular fractions during embryonal and postnatal development. It was shown that NAD-IDH activity in brain mitochondria rose during hatching and was maximal in mitochondria of adult brain. The activity of NADP-IDH in mitochondria and cytoplasm of embryonal brain is higher, than that of NAD-IDH, then it increased until the period of hatching, especially in mitochondria with subsequent decrease in adult brain.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Willson V. J. C., Tipton K. F. J. Neurochem., 33, 1239—1247, 1973.
2. Loverde A. W., Lehrer G. H. J. Neurochem., 20, 441—448, 1973.
3. Dalziel K. FEBS Lett, 117, suppl., 45—55, 1980.
4. Stein A. M., Stein J. H., Kirkman S. K. Biochemistry, 6, 1370—1379, 1967.
5. Watanabe T., Goto H., Ogasawara N. Biochem. Biophys. Acta, 358, 240—246, 1974.
6. Прохорова М. И., Путилина Ф. Е., Ещенко Н. Д. Вопросы биохимии мозга, Ереван, Изд-во АН АрмССР, 9, с. 211—218, 1974.
7. Willson V. J. C., Tipton K. F. Eur. J. Biochem., 109, 411—416, 1980.
8. Itzhaki R. F., Gill D. M. Analyt. Biochem., 9, 401—410, 1964.
9. Gonzalez-Ros J. M., Ribera A. Lipids, 15, 279—284, 1980.
10. Willson V. J. C., Tipton K. F. J. Neurochem., 4, 793—799, 1980.

Институт биохимии АН АрмССР, Ереван

Поступила 3. II 1983