УДК 576.343:612.82:612.67

ВЛИЯНИЕ АЦЕТИЛХОЛИНА И НОРАДРЕНАЛИНА НА АКТИВНОСТЬ Na^+ , K^+ -АТРАЗЫ СИНАПТИЧЕСКИХ МЕМБРАН ГОЛОВНОГО МОЗГА ВЗРОСЛЫХ И СТАРЫХ КРЫС

ПОТАПЕНКО Р. И.

Институт геронтологии АМН СССР, Киев

Изучение возрастных особенностей функционирования транспортной Na^+ , K^+ -АТРАЗЫ (КФ 3.6.1.3) синаптических мембран (СМ) имеет важное значение для раскрытия механизмов изменения функциональной активности головного мозга в старости [1]. Это объясняется тем, что Na^+ , K^+ -АТРАза связана с передачей нервных импульсов, процессами возбуждения и торможения. Имеющиеся данные об активности Na^+ , K^+ -АТРАЗЫ СМ в старости малочисленны и противоречивы [2—4]. В литературе нет сведений о каких-либо возрастных особенностях регуляции активности АТРАЗЫ нейромедиаторами, с которыми она находится в сложном взаимодействии. Вместе с тем, имеются указания на существенные изменения при старении нейромедиаторных систем, выражающиеся в снижении синтеза, выделения и обратного захвата медиаторов [5, 6].

Целью настоящего исследования явилось определение активности Na^+ , K^+ -АТРАЗЫ СМ коры больших полушарий и ствола головного мозга взрослых и старых крыс и изучение влияния на неё АХ и норадреналина (НА).

В работе использовали 7—8-месячных (взрослые) и 26—27-месячных (старые) беспородных крыс-самцов. Синапсосомы выделяли из 10%-ных гомогенатов коры и ствола мозга на 0,32 М сахарозе, содержащей 0,01 М трис и 0,005 М ЭДТА (рН 7,5) по методу Najos [7]. СМ получали, подвергнув синапсосомы гипотоническому шоку путем инкубации в деионизированной воде (0°, 30 мин). Белок определяли модифицированным методом Lowry и соавт. [8]. СМ замораживали при -20° и хранили не более 2-х суток. Общую АТРАЗную активность определяли путем инкубации в среде следующего состава (мМ): трис—50, NaCl—100, KCl—20, MgCl_2 —3, АТР—3, рН 7,5, 50—60 мкг белка СМ. Активность Mg^{2+} -АТРАЗЫ измеряли в отсутствие ионов натрия. АХ, НА и прозерин (0,05%, 0,02 мл) вносили в пробы после пренинкубации без субстрата в течение 5 мин при 37° . Об АТРАЗной активности судили по накоплению P_i [9]. Активность Na^+ , K^+ -АТРАЗЫ рассчитывали как разность между общей и Mg^{2+} -АТРАЗной активностями и выражали в мкмоль P_i /мг белка/ч.

Установлено, что активность Na^+ , K^+ -АТФазы СМ из коры больших полушарий и ствола мозга отличается по величине и с возрастом крыс существенно не изменяется (взрослые: кора— $20,2 \pm 1,6$, ствол— $27,5 \pm 1,9$; старые—соответственно $17,4 \pm 1,4$ и $25,9 \pm 1,8$). Характер влияния исследованных нейромедиаторов на активность Na^+ , K^+ -АТФазы оказался сходным и определялся их концентрацией, однако имелись и некоторые возрастные особенности. Как следует из рис. а, было подтверждено, что АХ в низких концентрациях (10^{-7} — 10^{-3} М) активировал фермент, в высоких (10^{-2} М)—угнетал у крыс обеих возрастных групп. Однако необходимо отметить, что если ингибирующий эффект этого медиатора у взрослых и старых животных был одинаков, то активация Na^+ , K^+ -АТФазы под его влиянием у старых крыс была менее выражена и не зависела от концентрации в интервале

Рис. Влияние АХ (а) и НА (б) на активность Na^+ , K^+ -АТФазы синаптических мембран головного мозга крыс разного возраста. По оси абсцисс— $\lg [\text{АХ}]$, М (а) и $\lg [\text{НА}]$, М (б), по оси ординат—изменение активности Na^+ , K^+ -АТФазы в % по отношению к исходному уровню, принятому за 100%. 1—взрослые крысы, 2—старые крысы. *—статистически значимые различия между взрослыми и старыми животными

10^{-7} — 10^{-3} М. У взрослых крыс повышение концентрации АХ в среде от 10^{-7} до 10^{-6} М сопровождалось увеличением активирующего влияния (с 24 до 31%, $p < 0,05$) с последующей стабилизацией эффекта (10^{-6} — 10^{-4} АХ) и дальнейшим ослаблением активации до 21% ($p < 0,05$) при концентрации АХ 10^{-3} М. В концентрации $5 \cdot 10^{-3}$ М АХ наряду с активацией вызывал у отдельных особей угнетение активности Na^+ , K^+ -АТФазы, одинаковое у взрослых и старых крыс. Результаты исследования на взрослых крысах находятся в полном соответствии с данными других авторов [10, 11].

Кривая, отражающая влияние НА на активность Na^+ , K^+ -АТФазы СМ из ствола мозга, как и в случае с АХ, имеет двухфазный характер (рис. б). В низких концентрациях НА (10^{-7} — 10^{-4} М) повышал, а в высоких (10^{-3} М)—понижал ее активность. Максимальная величина активации и ингибирования Na^+ , K^+ -АТФазы у крыс обоих возрастов была одинаковой и составляла в среднем 30%. Некоторые возрастные особенности влияния НА были обнаружены при концентрации НА

10^{-4} M. В отличие от животных зрелого возраста, у которых активацию Na^+ , K^+ -АТФазы наблюдали лишь в 43% случаев, у старых крыс НА в указанной концентрации повышал активность фермента у подавляющего большинства (83%).

Таким образом, активность Na^+ , K^+ -АТФазы СМ из коры больших полушарий и ствола головного мозга в старости сохранялась на уровне, соответствующем крысам зрелого возраста, однако изменялись ее регуляторные свойства. Особенно существенна перестройка с возрастом регуляции АХ активности Na^+ , K^+ -АТФазы, выражавшаяся в ослаблении активации ее этим медиатором в старости. Это согласуется с имеющимися данными о сравнительно большем повреждении в процессе старения холинэргической системы регуляции, являющейся эволюционно наиболее древней [12].

Возрастные особенности эффекта АХ на активность Na^+ , K^+ -АТФазы в старости могут быть обусловлены рядом причин. Анализ собственных фактических данных и данных литературы [13, 14] позволяет высказать предположение, что наиболее вероятной причиной снижения активирующего влияния АХ на Na^+ , K^+ -АТФазу в старости может быть уменьшение плотности мускариновых рецепторов на мембране. Вместе с тем нельзя не учитывать и изменения при старении липидного состава и свойств СМ [15, 16], с которыми, в частности, могут быть связаны и некоторые особенности регуляторного воздействия НА на АТФазу у старых крыс. Не исключено, что ослабление активирующего влияния АХ на активность Na^+ , K^+ -АТФазы является одной из причин, приводящих к снижению памяти и способности к обучению, наблюдаемых у старых животных [17].

EFFECT OF ACETYLCHOLINE (ACh) AND NORADRENALINE (NA) ON THE ACTIVITY OF BRAIN SYNAPTIC MEMBRANE Na^+ , K^+ -ATPase IN GROWN UP AND SENILE RATS

POTAPENKO R. I.

Institute of Gerontology, Academy of Medical Sciences of Ukr. SSR, Kiev

Activity of synaptic membrane Na^+ , K^+ -ATPase in brain cortex and truncus cerebri has not been changed on ageing. A two-step effect of neurotransmitters on the activity of this enzyme has been detected: low doses of ACh (10^{-7} – 10^{-4} M) and NA (10^{-7} – 10^{-5} M) activate and high doses (10^{-2} M and 10^{-3} M respectively) inhibit Na^+ , K^+ -ATPase. On ageing the activating effect of ACh is diminished, but the effect of NA does not change significantly.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Фролькис В. В. Безруков В. В. Физиол. человека, т. 4, № 4, с. 596—619, 1978.
2. Sun A. Y., Samorajski T. J. Neurochem., v. 24, p. 161—164, 1975.
3. LaManna J. C., Doull G., McCracken K., Harik S. I. Gerontol., v. 29, № 4, p. 242—247, 1983.
4. Calderini G., Bonetti A. Ch., Battistella A., Crews E. T., Toffano G. Neurochem. Res., v. 8, № 4, p. 483—492, 1983.
5. Bartus R. T., Fleming D. L., Johnson H. R. J. Gerontol., v. 33, p. 858—871, 1978.
6. Априкян Г. В., Шагинян В. А., Мкртчян Г. А., Паронян Ж. А., Кнарян В. А., Ахвердян Э. С. Физиол. журн. СССР, т. 30, № 1, с. 69—73, 1984.
7. Hajos F. Brain Res., v. 93, № 3, p. 485—489, 1975.
8. Markwell M. A. K., Haas S. M., Rieber L. L., Tolbert N. Anal. Biochem., v. 87, p. 206—210, 1978.
9. Ratbun W., Bettlach V. Anal. Biochem., v. 28, p. 436—445, 1968.
10. Глебов Р. Н., Дмитриева Н. М. Биохимия, т. 39, с. 822—827, 1974.
11. Кометиани Э. П., Джариашивили Т. Я., Цакадзе Л. Г. Биохимия, т. 40, с. 1039—1046, 1975.
12. Strong R., Hicks P., Hsu L., Bartus R. T., Enna S. J. Neurobiol. of ageing, v. 1, № 1, p. 59—63, 1980.
13. Болдырев А. А. Биохимические аспекты электромеханического сопряжения. М., МГУ, 1977.
14. Briggs R. S., Petersen M. M., Cook P. I. Neurobiol. of ageing, v. 3, p. 259—261, 1982.
15. Аксентев С. Л., Милютин А. А., Беляева Е. И., Буланова К. Я., Окунь И. М., Ракович А. А., Кисилев П. А., Кирилук А. П., Конев С. В. Биофизика, т. 27, с. 650—652, 1982.
16. Nagy K., Zs-Nagy V., Bertoni-Freddart C., Zs-Nagy I. Arch. Gerontol. and geriatr., v. 2, № 1—2, p. 23—39, 1983.
17. Le Poncin-Lafitte M., Lamproglou Y., Duterte D., Rapin J. R. Eur. Neurol. v. 22, № 2, p. 13—14, 1983.

Поступила 20. XII. 1983.