УДК 591.1.05

ФЕРМЕНТЫ БИОСИНТЕЗА ПРОЛИНА И РЕГУЛЯЦИЯ
ИХ АКТИВНОСТИ В МОЗГУ КРЫС

*МАНУКЯН И. П., АГАДЖАНИЯН А. Х., *АРУТЮНЯН А. В.

*Институт биохимии АН АрмССР, Ереван; проблемная лаборатория сравнительной
и эволюционной биохимии ЕГУ

Изучены ферменты биосинтеза пролина (орнитинтрансминаза—ОТА и пирроли-5-карбоксилатредуктаза—П-5-КР) в мозгу крыс, локализованные как в растворимой фракции, так и в осадке, полученном при центрифугировании гомогената. Установлено, что наряду с α -кетоглутаратом (α -КГ), трансаминирование орнитина в мозгу крыс протекает также с пируватом и оксалоацетатом.

АТР, аспарат, аспарагин и аланин являются эффективными ингибиторами ОТА и П-5-КР, причем действие АТР проявляется наиболее отчетливо, если в качестве кофактора П-5-КР используется NADH, а не NADPH.

Во многих органах млекопитающих пролин, в основном, синтезируется из глутамата и орнитина, а также может поступать с кровью в готовом виде. В частности, клетки ЦНС могут обеспечиваться пролином крови [1].

Синтез и катаболизм пролина в мозгу изучены весьма недостаточно. Активность П-5-КР высока в мозгу эмбриона по сравнению с таковой зрелых крыс, а пролиноксидазная активность, наоборот, выше у зрелых животных [2]. Таким образом, в мозгу зрелых крыс деградация пролина происходит с большей скоростью, чем синтез, а в мозгу плода, наоборот, превалирует синтез пролина.

Jonson, Roberts [3] исследовали транспорт аргинина в синапсомы мозга крыс и установили превращение последнего в орнитин и далее в глутамат, ГАМК и пролин. Концентрация указанных веществ может изменяться как под влиянием ингибирования их синтеза по принципу обратной связи, так и в зависимости от уровня содержания кофакторов.

Давтян и соавт. [4] изучили биосинтез пролина из орнитина, аргинина, цитруллина и глутамата в мозгу эмбрионов, беременных и лактирующих крыс. Показано, что у беременных и лактирующих крыс, наряду с орнитинном, биосинтез пролина протекает также из цитруллина, а у эмбрионов—из всех указанных субстратов. Очевидно, цитруллин пред-

варительно превращается в аргинин соответствующими ферментами мозга крыс с дальнейшим образованием пролина.

Цель настоящей работы—изучить некоторые стороны обмена пролина и регуляции активности ферментов, участвующих в этом процессе в мозгу крыс.

Материалы и методы

Объектом исследования служили белые крысы линии *Wistar* массой 150—180 г. Для определения ферментативной активности использовали 20%-ный гомогенат мозга в 0,1 М калий-фосфатном буфере (рН 7,4). Инкубационная смесь (3 мл) содержала 50 мкмоль орнитина, 20 мкмоль α -кетоглутарата (или других кетокислот), 100 мкмоль калий-фосфатного буфера (рН 7,4), пиридоксаль-5-фосфата—1 мкмоль и 0,5 мл 5%-ного гомогената. Инкубацию проводили при 37° в течение 60 мин. За это время орнитин инкубационной среды под действием ОТА превращается в L- Δ' -пирролин-5-карбоксилат (П-5-К). Затем в среду добавляли 4 мкмоль NADH, 0,5 мл свежего гомогената и смесь инкубировали еще 15 мин. Под действием П-5-КР, присутствующей в гомогенате, П-5-К превращается в пролин. Реакцию останавливали 20%-ной ТХУ (для определения активности ферментов биосинтеза пролина и содержания пролина) и 96°-ным холодным этиловым спиртом (для хроматографического определения пролина). Пробы центрифугировали при 8000 об/мин в течение 10 мин и в надосадочной жидкости определяли пролин. Активность ферментов биосинтеза пролина (ОТА и П-5-КР) выражали в мкмоль образовавшегося пролина на 1 г свежей ткани за 60 мин.

Пролин и оксипролин определяли хроматографическим методом [5].

Результаты и обсуждение

На начальном этапе изучения процесса биосинтеза пролина тканью мозга нами было исследовано содержание в ней пролина и оксипролина. Согласно полученным результатам, свободный эндогенный пролин в мозгу крыс накапливается весьма незначительно (0,06 мкмоль/г ткани), а оксипролин вовсе не обнаруживается, что соответствует данным других авторов [6, 7]. Проведенные нами исследования показали, что процесс биосинтеза пролина из глутамата в гомогенатах мозга крыс протекает весьма слабо (образуется 0,072 мкмоль пролина/г ткани/ч), причем лишь в присутствии NADH. По-видимому, в мозгу крыс глутамат превращается в полуальдегид глутаминовой кислоты не путем образования глутамилфосфата [10], а под воздействием П-5-КР, кофактором которой служит восстановленный NAD. Аналогичные данные были получены ранее в отношении печени птиц [8] и в экстрактах жуков фасолевой зерновки [9].

В специальной серии экспериментов нами был изучен биосинтез пролина из орнитина. При подборе оптимальных условий для протека-

ния этого процесса было исследовано влияние различных концентраций орнитина (10—100 мкмоль) и некоторых буферов (K^+ -фосфатный, трис-НСI и др.), на активность ОТА и П-5-КР в мозгу крыс. Было обнаружено, что наиболее интенсивно процесс биосинтеза пролина протекает при концентрации орнитина 50 мкМ и инкубации в 0,1 М K^+ -фосфатном буфере, рН 7,4 в течение 60 мин.

Таблица 1

Биосинтез пролина (в мкмоль/г ткани/ч) из орнитина в мозгу крыс в присутствии различных кетокислот и кофакторов (n=5)

Субстраты	Кофакторы	Гомогенат	Надосадоочная жидкость	Осадок
α -кетоглутарат	NADH	7,98±1,12	2,33±0,31	5,69±0,85
Пируват	NADH	4,89±0,42	2,63±0,42	2,70±0,55
Оксалоацетат	NADH	1,51±0,09	0,35±0,03	0,60±0,04
α -кетоглутарат	NADPH	7,03±1,02	2,02±0,33	5,70±1,02

Исследовано влияние различных кетокислот (α -КГ, оксалоацетат, пируват) и кофакторов (NADH и NADPH) на биосинтез пролина из орнитина в надосадоочной жидкости и осадке, полученном при центрифугировании при 27000 g гомогената мозга. Показано, что трансаминирование орнитина наиболее интенсивно протекает с α -КГ, несколько слабее с пируватом и гораздо хуже с оксалоацетатом (табл. 1). Как видно из приведенных данных, NADPH в качестве кофактора П-5-КР в мозгу несколько уступает NADH по эффективности. Между тем во многих органах установлено преимущество NADH в указанной реакции [11, 12].

Наблюдаемый нами заметный синтез пролина из орнитина в присутствии пирувата наводит на мысль о наличии в мозгу, помимо трансаминазы орнитина с α -КГ, трансаминазы с пируватом. Об этом свидетельствует также тот факт, что, если этот процесс в присутствии α -КГ проявляется, в основном, в осадке, то в присутствии пирувата протекает с одинаковой интенсивностью как в надосадоочной жидкости, так и в осадке. В полном соответствии с этими данными находятся результаты серии экспериментов по изучению интенсивности процесса биосинтеза пролина из орнитина в гомогенате мозга при совместном присутствии α -КГ и пирувата в различных количественных соотношениях (табл. 2). Оказалось, что пролин синтезируется из орнитина и α -КГ, взятом в отдельности, слабее, чем в опытах, в которых использовалась смесь эквимольных количеств α -КГ и пирувата.

В следующей серии экспериментов было изучено влияние АТР, АДР и АМР на активность ОТА и П-5-КР мозга крыс. Полученные данные (рис. 1, 2) выявили, что АТР оказывает ингибирующее влияние на активность обоих ферментов, тогда как АДР и АМР ингибируют лишь активность П-5-КР. Активность же ОТА в этих условиях, напротив, несколько повышается, особенно в присутствии низких кон-

центраций адениннуклеотидов ($5 \cdot 10^{-5}$ М). Характерно, что ингибирующий эффект АТР на процесс биосинтеза пролина значительно более выражен, если в качестве кофактора П-5-КР используется NADH, а не NADPH.

Рис. 1. Влияние АТР на биосинтез пролина (мкмоль/г ткани/ч) в мозгу крыс: 1—ОТА, кофактор П-5-КР NADPH; 2—ОТА, кофактор П-5-КР NADH; 3—П-5-КР, кофактор NADPH; 4—П-5-КР, кофактор NADH. По оси абсцисс—концентрация ингибитора, 10^{-4} М

Рис. 2. Влияние АМР и АДР на биосинтез пролина (в мкмоль/г ткани/ч) в мозгу крыс: 1—ОТА; 2—П-5-КР. В качестве кофактора использовали NADH. По оси абсцисс—концентрация ингибитора, 10^{-5} М

По литературным данным, АТР практически не влияет на NADPH-зависимую активность П-5-КР в сетчатке [13], а у *E. coli* обнаружено подавление этого процесса лишь при высоких концентрациях АТР [14].

В литературе имеются данные по ингибированию процесса биосинтеза пролина у *E. coli* аспаратом, глицином, серином и аланином [14]. В связи с этим мы изучали влияние указанных аминокислот, а также аспарагина на процесс биосинтеза пролина мозга крыс (рис. 3, а, б).

Полученные данные показывают, что в сравнительно высоких концентрациях ($13,5—26,5 \cdot 10^3$ М) аспарагин, аспарат и аланин значительно подавляют активность ОТА и П-5-КР. Следует отметить, что ингибирующее влияние аспарагина проявляется даже при более низких концентрациях ($2,7 \cdot 10^{-3}$ М). Аспарат в низких концентрациях никакого

влияния на активность обоих ферментов не оказывает. Начиная с $13,5 \cdot 10^{-3}$ М концентрации наблюдается ингибирование активности обоих ферментов, участвующих в процессе биосинтеза пролина. Примечательно, что по сравнению с L-аланином, β -аланин вызывает довольно слабое ингибирование активности как ОТА, так и П-5-КР в мозгу

Таблица 2

Биосинтез пролина (в мкмоль/г ткани/ч) из орнитина в гомогенате мозга крыс при различных соотношениях α -кетоглутарата и пирувата ($n=6$)

С у б с т р а т ы			Пролин
орнитин (мкМ)	α -кетоглутарат (мкМ)	пируват (мкМ)	
50	50	—	$6,42 \pm 0,72$
50	25	25	$7,47 \pm 0,84$
50	50	50	$13,10 \pm 1,09$
50	100	—	$5,37 \pm 0,23$

Рис. 3. Влияние некоторых аминокислот на активность ОТА (а) и П-5-КР (б) (мкмоль П-5-К/г ткани/ч) в мозгу крыс: 1—глицин, 2—серин, 3— β -аланин, 4—аспартат, 5—аланин, 6—аспарагин. По оси абсцисс—концентрация аминокислот, 10^{-3} М

крыс. Серин и глицин ни в одной из испытанных концентраций не действуют на процесс биосинтеза пролина в мозгу.

Ингибирование аспартатом и аланином процесса биосинтеза пролина, по-видимому, объясняется интенсивным функционированием в мозгу крыс аспартат- и аланинаминотрансфераз, с которыми орнитинамино-трансфераза не в состоянии конкурировать за α -КГ.

ENZYMES OF PROLINE BIOSYNTHESIS AND REGULATION OF THEIR ACTIVITY IN RAT BRAIN

MANUKYAN I. P., AGADJANYAN A. Kh., *AROUTYUNYAN A. V.

*Institute of Biochemistry, Arm. SSR Acad. Sci., Yerevan
Research Lab. of Comparative and Evolutionary Biochemistry,
Yerevan State University

Activity of ornithine transaminase (OTA) and pyrrolin-5-carboxylate reductase (PCR)—the enzymes of proline biosynthesis that are localized both in soluble fraction and in the pellet—has been studied. Transamination of ornithine in rat brain takes place not only with α -ketoglutarate, but with pyruvate and oxaloacetate as well. ATP, aspartate, asparagine and alanine are potent inhibitors of OTA and PCR; the inhibitory effect of ATP is more pronounced if NADPH is used as a coenzyme of PCR instead of NADH.

ЛИТЕРАТУРА

1. Lodato R. E., Smith R. J., Valle D., Phang J. M., Aocki T. T. *Metabolism*, v. 30, № 9, p. 908—913, 1981.
2. Kowaloff E. M., Granger A. S., Phang J. M. *Metabolism*, v. 15, № 10, p. 1087—1094, 1976.
3. Jonson I. Z., Roberts E. J. *Neurochem.*, v. 42, № 4, p. 1123—1126, 1984.
4. Арутюнян Л. М., Агаджанян А. Х., Давтян М. А. *Биол. журн. Армении*, т. 36, № 2, с. 110—114, 1983.
5. Hrabetova E., Tuly L. J. *J. Chromatogr.*, v. 3, № 2, p. 199—201, 1960.
6. Blumenkrantz M. *Clin. Biochem.*, v. 13, № 4, p. 177—183, 1980.
7. Herzfeld A., Mere V. A., Knox E. *Biochem. J.*, v. 166, № 1, p. 95—103, 1977.
8. Давтян М. А., Агаджанян А. Х., Гукасян Дж. Г. *Биол. журн. Армении*, т. 37, № 6, с. 467—471, 1984.
9. Shen T. E., Bird H. R., Sunde M. Z. *Poultry Science*, v. 52, p. 676—682, 1973.
10. Baich A. *Biochim. et biophys. acta*, v. 192, № 3, p. 462—467, 1969.
11. Агаджанян А. Х., Давтян М. А. *Биол. журн. Армении*, т. 27, № 5, с. 19—23, 1974.
12. Miller P. M., Stewart C. R. *Phytochemistry*, v. 15, № 12, p. 1855—1857, 1976.
13. Matsuzawa T. *Biochim. et biophys. acta*, v. 717, № 2, p. 215—219, 1982.
14. Hayzen D. J., Moses V. *Biochem. J.* v. 173, № 1, p. 207—217, 1978.

Поступила 28. VII 1986