

638.2

ՇԵՐԱՄԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ

ՅԵՎ

ԳՐԵՆԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

ՁԵՌՆԱՐԿ

638.2

607

6-51

638.2
Б-51 Бетр. Сусушк. р-д
и 9 рт. широт. р-д
г. 1935. 3м.

1935. 3m

638.2

6-51

ՆԱԽԳԼԱՊ Է 1937 թ.

ՇԵՐԱՄԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ

Յ Ե Վ

ԴՐԵՆԱՏԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

Զ Ե Ռ Ն Ա Ր Կ

Խմբագրություն

Ե. Հ. Դ. Ա. Ս. Ռ. Ե. Ն. Ի.



1264 607

A 19083

Յանգոյի կողման աշխատանքին մասնակցել են՝
Է. Զ. ԴԱՅՅԵԱՆ, Խ. ԼԵՅԳՈՒՄԵԱՆ, Ս. ԿՈՄՈՍԱՆ յիվ Վ.
ՓԱՐԱՆՔԱՆԵ:

Սոցիալիստական շերամապահությունը ԽՍՀՄ-ում արդյունաբերական և գյուղատնտեսական այլ ճյուղերին ու կուլտուրաներին զուգընթաց՝ դանդում և զերեկքի շրջանում:

Շերամապահության հումուսյթի ծավալը ԽՍՀՄ-ում, մինչև համաշխարհային պատերազմը, կազմում էր 9-843 հազար կիլո բոժոժ (վորից 4.013 հազարը Միջին Ասիայում, 4.843 հազարն Անդրկովկասում):

Իմպերիալիստական և քաղաքացիական պատերազմներն այդ թանկարժեք կուլտուրայի արտադրանքը հասցրել էին միմիայն չափերի:

Մեր կուսակցությանը և կառավարությանը ի նկատի առնելով շերամապահության նշանակալից ժողովրդական առնետություն և թե կուլտնտեսական լայն մասսաների նյութական — հենցադային դրություն և ազնիւ բարձրացման դործում, մեծաբերկեցին մի շարք միջոցառումներ, վստահ շնորհիվ Միության շերամապահությունը 1928 թվին իր արտադրանքով հասավ մինչև հեղափոխության շրջանին և առաջ անցավ տալով մետաքսի արդյունաբերությանը 10.783 հազար կիլո բոժոժ:

1928—1932 թվերին շերամապահությունը մեծ հարված հասցրեց հեղափոխական ֆեոդալիստական, վստահ բույն երդրել շերամապահության ասպարեղում:

Մակախ շնորհիվ Համ. Կ(բ) Կ Կենտկոմի և Միավորական Ժողովախորհի միջամտության, 1932 թվին զերջ և արվում շերամապահության անկմանը:

1933 թվին ստացվում է 14,5 միլիոն կիլո բոժոժ, 1934 թ.՝ 16 միլ., իսկ 1935 թ.՝ 18,5 միլ. կիլո, վորը կազմում է մինչև հեղափոխական շրջանի արտադրանքի 187⁰/₆-ը:

Տնայած, վոր Հայաստանի շերամապահության տեսակարար կիլոը Միության շերամապահության մեջ այնքան էլ դրույի տեղ չի դրավում, բայց շնորհիվ Հայաստանի բարենպաստ

կլիմայական պայմանները, նաեւ անվերջին տարեներու ունի խոշոր նվաճումները:

Հայաստանում 1922 թ. տարածվում էր 800 տուփ գրենա, իսկ 1935 թ.՝ 2223 տուփ: Համապատասխան հիշյալ տարիները, ընդհանուր բաժանի մթերքումը յեղել է 18.600 և 108.780 կիլո, միջին բերքը մեկ տուփ գրենայից՝ 23,2 և 48,89 կիլո, գրենայի արտադրությունը սոցիալիստական սեկտորում՝ 360 և 100.000 տուփ:

ԱՄԵՐ մի շարք շրջաններ՝ Մեղրին, Դափանը, Գորիսը, Շամշադինը և այլն, բացառիկ նպաստավոր պայմաններ ունեն՝ շերտապահությանը, վերջինս անասնաբխան հիմնական մի նյութ, պարզապես չու համար: Գրենի ըստ մյուս շրջանները պետք է նույնպես գրավեն շերտապահությամբ, վերջինս անասնաբխան հիմնական նյութերին զուգընթաց ոժանդակ կուլտուրան: Վաս չէր լինի, յի՞թե համապատասխան ուղղակի պահանջ գներ, վերջնապէ մեր բոլոր շրտնոցներին և ատուների ավերն ու նախապահները ծառապատվելին թթենիներով (Ա. Խանջյան՝ Հ Կ(բ) Գ 8-րդ համապատասխան ավան հաշվ. գնկույն):

Այժմ սոցիալիստական շերտապահության աստղ խնդիր է դրված՝ Եւ ավելի զարգացնել այդ կուլտուրան, բարձրացնել նրա բերքատվությունը, վոր մեզ մտա՝ ԽՍՀՄ-ում Հապոնիայի և Իտալիայի համահմատությամբ հետ և թուրք (Իտալոնիայում և Իտալիայում մեկ տուփ գրենայից միջին բերքը հասնում է 50—60 կիլոյի, ԽՍՀՄ-ում՝ 34,5 կգ. Հայաստանում՝ 48.89 կգ):

Այդ հիմնական խնդրում գլխավոր դերը, անկասկած, պետք է խաղան անխնդիր գին: Կարգերը, իսկ անխնդիր անտնտեսական մեղքներ յի՞թե վերջն ոգտագործելու համար հարկավոր են անխնդիր անտնտեսական մարդկի, հարկավոր են այնպիսի կադրեր, վորն բնական լինեն յուրացնելու յի՞թե ոգտագործելու արդ անխնդիր՝ արվեստի բոլոր կամոմներով: Տնտեսական, առանց անխնդիր անտնտեսական մարդկանց՝ մեռած է (Ստալին):

Հեկտարով հաշվ. ՄՍԱԼԻՆԻ այդ պատմական ցուցումով է ի նկատի առնանալով այն հանգամանքը, վոր շերտապահությունը ընդհանրապես ուղիստ և գրականությունից (իսկ հայերեն լեզվով բարբոսին յոսնի), կողմակերպված է այս անասնաբեր նրատարակումը: Հայս ունենք, վոր անասնաբեր կողմակերպեր անկանա ու կուլտուրական շերտապահ լայն մասնատներին պատրաստման գործին և միևնույն ժամանակ կնապատի Հայաստանի և հարևան յեղրայրական հանրապետություններին:


շերտավազանքային և գրենային արդյունաբերութեան եւ ամէկի
զարգացմանը:

Ձեռնարկը կազմված է Հայմատաքարեաւի մասնաշե-
նքի՝ Ե. Գալստյանի, Խ. Հեքիմյանի, Յ. Բամայանի և վարդ շա-
փով եւ Լ. Փարսադանյանի կողմից ներկայացված նշաններին,
վերանց Հայմատաքարեաւը բերում է իր խորին շնորհա-
լությունը:

Ձեռնարկը կազմելիս խմբագրութեանն ազդել է հետեւյալ
ուսանողներն՝ գրականութեանից՝ պրոֆ. Ն. Ֆ. Պալրուպի «ТУТОВЫЕ
шелководы» և «курс практического шелководства», Տիխամի-
րովի և սի շարք ալ աշխատութեաններին: Գործնականի գործին
մասնակցել են՝ Յեղեանի Շերտակայանի և գրեն-գործարանի
աշխատակիցներ՝ Լ. Տիրտանյանը, Լ. Մարգարյանը, Լ. Ալլան-
վերդյանը, Ա. Բալարանյանը և Գ. Խալաթյանը, վերի համար
խմբագրութեանն այդ ընկերներին հայտնած և իր շնորհա-
լությունը:

Վարդնեակ առաջին տնօրէնն է, վար հայերեն լեզվով լաթ
և տետում շերտավազանքային մասին մեղմարկ, ուստի գրքում
կարող են լինել բացեր ու թերութեաններ, վերանց հայտարե-
րելիս, խնդրում է ընթերցողներին հայտնել խմբագրութեա-
նը՝ հետեւյալ հասցեով—Յերևան, Գյուղհրատին:

Ե. Լ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ



ԳԼՈՒԽ Ի-ԵՆ

ՇԵՐԱՄԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺՈՂՈՎԳԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Շերամապահությունը դյուրամտեւության նուազերից մեկն է, վորի վերջնական արտադրանքը մեռաքան է: Վերջինս ասացվում է շերամի վարդի խնամքից:

Շերամապահությունը մեծ նշանակություն է ունեցել անցյալում և առայել էս մեծ նշանակություն ունի ներկայումս, մանապէս իՍՂԱՄ-ում, վորտեղ մեռաքան ալլեա չի համդիսանում հոխության առաքէա, ալլ տալիս է տեղատիլ նշութ՝ լայն ժոռոտներէ ապագարժման համար, վորպէս հազուատեղէն մտցի դրանից, մեռաքան ողտագարժում է արդշունարեւության մի շարք հյուղերում, այն է՝ Ելեկարտեխնիկայում, ավիացիայում, բժշկության, ալլուրի արտադրության, յերկրի պաշտանության մեջ և այլն, և վորքան պարզանում է տեխնիկան, այնքան բարձրանում է նրա նշանակությունը:

Մեռաքան նույնպէս համդիսանում է վորպէս եղտալուր ասլրանք, վորի դիմաց ներմուծում ենք մեք ինդուստրիայի դարպասման անհրաժեշտ մեքենաներն ու գործիքները:

Մեռաքաթիւն աչքի յս ընկնում էր ֆիզիկական, քիմիական և մեխանիկական հատկություններով՝ նրբությամբ, փայլով, գեղեցիկությամբ ու դույն ընդունելու մեծ ունակությամբ:

Մեռաքան առայել մեծ հատկությունը նրա ամրությունն է, վոր 2—3 անգամ գերազանցում է բամբակի, վազի և բրդի թիւրքը: Մեռաքանը, բացի յերկաթից ու պողպատից, բոլոր մետաղներից ամուր է: Մեկ միլիմետր հաստությամբ մետաքաթիւր կարող է պահել 40 կիլոգրամ ծանրություն: Ամրության հետ գուղընթաց՝ մետաքաթիւն ունի առանգական հատկություն: Նոս, առանց կարգիւն, կարող է իր սկզբնական յերկարությունից ձգվել 18—20%—ով. ալլ հատկությամբ նա գերազանցում է բամբակի և բուրդը՝ հինգ անգամ:

Շերամապաւնութեանը քիչ տնտեսական և քաղաքական նշանակութեան չունի նոր արտադրական մեծարկութեան ներկայացումը, ինտելեկտուալ, մտնալմանդ աղգային հանրապետութեան ներքաւ, վարտեղ մինչ խորհրդայնացումը գրեթե մեծաքանակ արտադրութեան չկար (Միշին Ասիա, Անդրկովկաս)։ Ներկայումս պաշտութեան ունեցող գործարաններում աշխատում են տասնյակ հազարավար բանվոր-ւհներ։

Մեծ և նախնական շերամապաւնութեան նշանակութեանը կոչ-տնտեսութեան ներքի, կաշտակողականների և աշխատավար մեծա-տնտեսների տնտեսական գրութեան բարելաւման ընտալմաւում։ Շերամապաւնութեան գրադղելը պաւղաւտնտեսութեան ալլ ճշադրերի համեմատութեամբ ունի այն աւաղելութեանը, վար նախ՝ թթնաւ-մշակութեան համար քաղի հատուկ հողամասեր գրաղեցնելուց, թթններն կարելի յե աւեցնել նաև առաւների և դեաների տգերին, արաների և ալլինների յեղերին, շերամապաւն կաշտակ-տականների և մեծատնտեսների տնտեսութեաններին կից հողա-մասաւմ Յերկրորդ՝ շերամը կերակրելու համար հատուկ կաղիտալ ներդրումներ չի պաւնջվում։ շերամի խնամքը կարելի յե կատարել մաղարական ընտելի շնքերում՝ մաղնելով անրամեշա կաւալարում։ Յերկրորդ՝ չի պաւնջում ֆիզիկական ծանր աշխա-տանք. անրամեշա աշխատանքը կարող են կատարել անշաղա-հաւները, մեծատնտեսները և ընտանիքի այն աշղամները, վա-րանք ընդաւնդ չեն ֆիզիկական ծանր աշխատանք կատարելու։ Զորրորդ՝ շերամի խնամքն սկսում և աղրիլի յերկրորդ կեսին և վերջանում հունիսի սկղրին, ընդհանաւր տեղութեամբ վոշ-տղելի 45 որից։ Շերամապաւնը վարքան լալ խնամի վարդերին, ալնքան մեծ կլինի նրա յեկամաւար, լալ խնամված մեկ աղափ գրեկալից կարելի յե ստանալ 50—90 կիւղրամ բոժոժ, վարք հոններով պետութեանը՝ շերամապաւնը գոյութեան ունեցող դներով ստանում և 300—600 ուղրու մի գումար. քաղի դրանից, շերամապաւններին քաղ և թողնվում կայուն դներով մեծաքանակն։

Պարզ և, վար նման արժեքավար կալաւարայի դարգացումը ծող. տնտեսութեան համար ունի խողր նշանակութեան, վարի կատաղա դարգացումն աղանդելու համար ունենք բոլոր հնարա-վարութեանը։

Հայաստանի շերամապաւնութեանը, շնայած Միութեան մեշ փաք աղ և գրաղում, ուկայն իր կլիմայական բարենպաստ պայմանների շնորհիվ, իր բարձր բերքաւղութեամբ ամեծա-

առաջագործելու Այդ հանգամանքը չափազանց նպաստում է գրեթե ամբողջապես զրկելով Միության մեջ յերկրորդ տեղն և դրավում: Հայաստանում շերտապահությամբ զբաղվում են 11 շրջաններում, վերանցից առավել աչքի չեն ընկնում Մեղրին և Ղափանը, ուր շերտապահությունը գյուղատնտեսական հիմնական հյուսիսից մեկն և համայնապես:

2. ՇԵՐՏԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շերտապահության հայրենիքը համարվում է Զինաստանը (Շան-տունը՝ դավաճան), ուր դեռ սրանից 5000 տարի առաջ գրողվում էին վայրի բռնիքներ հավաքելով և մահելով: Դժբախտաբար վայրի շերտի նախահայրը մինչև որս չի հաշտարեցված: Մետաքսը շափազանց թանգ զնախադիլու հետևանքով՝ չերկար տարիներ (մոտ 2000 տարի) նրա ստանալու յեղանակը Զինաստանում ճանաչվել էր գաղանի:

Մեղրներում շերտապահությունը համարվում էր սրբազան՝ գրողմունք և գանձում էր բացառապես ազնվականության ևեռքին: Հեռվեան՝ 12-րդ դարում մեր թվականներից առաջ՝ շերտապահությունը տարածվում է Զինաստանի մյուս վայրերը: Այդ ժամանակ մետաքսը գրամի դեր էր կատարում—վճարում էին տուրքերի դիմաց. այդ սովորությունը պահպանվում էր մինչև ներկա թվականի ութերորդ դարը:

Պորովնան Յեվրոպայի և Զինաստանի միջև այդ ժամանակ հարմար և կարճ ճանապարհ չկար, այդ իսկ պատճառով մետաքսի առևտուրը շերտապահությունը ծագելուց շատ ավելի ուշ սկսվեց: Մետաքսը տեղափոխում էին Յեվրոպա կամ ծովով՝ Հնդկաստանի վրայով և կամ Միջին Ասիայի ու Հարավային Ռուսաստանի վրայով: Այս ևեռով մետաքսը հասցնում էին մինչև հին Հուսիս և Հունաստան, ուր գնահատվում էր վոսկու. արժեքով, կիրգործը մինչև 2000 ուրբի:

Շերտապահությունը Զինաստանում այն աստիճան ևեռաստի գրողմունք էր, վոր նույնիսկ մահվան պալիժ էր սահմանում նրանց, ովքեր կհայտնեյին դրա գաղտնիքը: Պարզ և, վոր դաղտնիքը մասսայական բնույթ կրելով՝ չեր կարող պարփակվել մի յերկրում: Այդ իսկ պատճառով մեր թվականից 2000 տարի առաջ քաղաքական պանդուխտների միջոցով Զինաստանից անցնում է Նաբեա, վորտեղից էլ 1—3 դար հետո անցնում է Յապոնիա:

Յապոնիայում այն աստիճան հրապուրվում են շերամապահությանը, վար բնակչությունն սկսում և քանդել բրնձի տղան-
ապցիաները և փոխարենը անկել թթենի: Անխուսափելի ապը
կանխելու նպատակով՝ իշխանությունն ընդունում և հաստի
վորդում, վորով արգելվում եր սահմանվածից ավելի դարգացնել
շերամապահությունը:

Յոթերորդ դարում Միջին Ասիայի Մերվ քաղաքի բնա-
կիչները (Մերվն այն ժամանակ պատկանում եր Պարսկաստա-
նին), շերամի հունցը տեղափոխում են Պարսկաստան:

Վեցերորդ դարի սկզբին շերամապահությունը տարածվում
և Բալխանյան թերակղզում, վորակելից Հալաթիսյան կայսեր Դա-
շերով փոխադրվում և Հալախաստան:

Հալախաստանից շերամապահությունն անցնում և Ասիա, վոր-
ակելից արարներին միջոցով 7-րդ դարում տարածվում և Աֆրի-
կայում, իսկ ութերորդ դարում՝ Բաղանիայում: Չրոնախոսում
շերամապահությունը տարածվում և 14-րդ դարում:

Անդրկովկասում շերամապահությունն սկսելու ժամին նըշա-
ված տեղեկություններ չկան. կան ավյալներ, վոր շերամապա-
հությունը մուտք և զարմել Անդրկովկաս ութերորդ դարում,
արարներին արշավանքի ժամանակ, իսկ մի այլ ավյալով²⁾ շերա-
մապահությունն անցնում և Անդրկովկաս յոթերորդ դարում
Պարսկաստանից:

Անդրկովկասում սկզբնական շրջանում շերամապահությունն
անհամեմատ թույլ եր դարգացած: 14-րդ դարում հանդարտորդ
Երլերդերը մասնաձուլում են Շամախում, Վրաստանում, Ղարա-
բաղում և Դաղստանում շերամապահության դարգացած լինելը:

Անդրկովկասը Պարսկաստանի տիրապետության տակ զանը-
ված ժամանակ, շերամապահությունն այն աստիճան դարգացած
եր, վոր Պարսից խաները և վրացական իշխանները շերամապա-
հությանից զանձված տուրքից ստանում ելին մեծ յեկա-
մուտ, որինակ՝ Լենքորանում յուրաքանչյուր ընտանիք ավեն
տարի, վորպես աուրք, պարտավոր եր մուծել խանի զանձարաճը
յեղեղական ֆունա բոժոժ: Ղարաբաղում շերամապահները վնա-
րում ելին բերքի 1/5-ը:

Исавов.—Очерк истории Кавказского шелководства; Изд. КИС 22
1916 год.

Կա այն տեղեկութիւնը, զոր Պարսից Խիւսաղեաւթյան ժամանակ Նախիվեանում արգեն գոյութիւն ունեցին մեծաքանակ մանաւրաններ և յուրաքանչյուր դարգշահից, զորպէս Եւաքը՝ զճարտէս եյին խանին Տ Կուրի:

Այդ դարադրջանում շերամապահութիւնը զարգացած երեսնայնական Հայաստանում, մանաւանդ Արարայան գաղաւթ և Մեղրու շրջանում: Այդ հաստատման ե նրանով, զոր այդ ժամանակ Հայաստանում գոյութիւն և ունեցել հասուկ ցեղ, այսպէս կոչված՝ Յերևանյան ցեղ:

Շերամապահութիւնը զարգացումը տեղում և մինչև 1860-ական թվականները: Այդ նույն թվականներին Յեմրուպայում տեղ կերպով սկսում և վորդերի մեջ տարածվել պերրինա հիվանդութիւնը, զորն սպառնում և շերամապահութիւն խաղաղօշնջացմանը: Հիվանդութիւնը ծագում և Յրանսիայում, զորտեղից հետեղհետե տնցնում և Խաւրիա, Բուրքիա, Կովկաս և բարձր շերամապահական յերկրները:

Միայն Յրանսիան այդ հիվանդութիւնը պատճառով փորցնում և 2 միլիարդ Ֆրանկ, Յրանսիական կառավարութիւնը դիմում և հաշակավոր դիտմական Լուի Պատարին, զորը 1865 թվին ներմարկում և հիվանդութիւն հետադուրմանը և միջոցնի տարվա աշխատանքից հետո տններցելի փաստերով հաստատում և հիվանդութիւնը վարակիչ և ժառանգական լինելը, դանում և պայքարի միջոցը, զորը և իր անվտուր կոչվում և Պատարի Խառնում: Շնորհիվ նրան, փրկվում և շերամապահութիւնը, զորի արդշահներն այսոք փաստորեն մենք տեսնում ենք:

Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, զորն համակնց բարձր կապիտալիստական յերկրների թե արդշահաբութիւնը և թե գյուղատնտեսութիւնը, չկը կարող չանդրադառնալ նաև շերամապահութիւնը արտադրութիւնը վրա: Բացի այդ՝ շերամապահութիւնը ճգնաժամը կապիտալիստական յերկրներում խոթանում և նաև նրանով, զոր համեմատած այլ ճշուշերի հետ՝ շերամապահութիւնը տեխնիկական անհամեմատ հետաձեաց և Յեթե շերամապահութիւնը տեխնիկան համեմատելու լինենք: գյուղատնտեսական այլ ճշուշերի տեխնիկայի հետ, կտեսնենք զոր շերամապահութիւնը տեխնիկան մնացել և իր սկզբնական զարգացման հունի մեջ:

Ներամատչանության աւելի զարգացման տարիներին (1870-1930) ամբողջ աշխարհում մետաքսի արտադրանքն աճում է հինգ անգամ։ Այդ նաեւ մասնական զննչում հետազոտարեկներում աճում է 8 անգամ, իսկ Յեփրոսյանում միայն $1\frac{1}{4}$ անգամ։ Պերսիան 20 տարում (1910-1930) Յապոնիայում աճում է 3 անգամ, իսկ Յեփրոսյանում ընկնում է 20%-ով։

Համաշխարհային մետաքսի արտադրության մեջ հետազոտարեկներն արտադրությանը 1870 թվից 57% -ի փակարեն 1930 թվին հասնում է 86% -ի, իսկ 1931 թվին՝ 90% -ի։

Ներամատչանության զարգացման և ճշգրտման պատկերը յերևում է հետևյալ աղյուսակից։—

(Հազար տոնն մետաքս-թելով)

Տարիներ	Իտալիա		Ֆրանսիա		Յապոնիա (Երազ-բա)		Յինաստան (Երազ-բա)	
	Թաղէ	Տեսակա- բաւ կշիւը	Թաղէ	Տեսակա- բաւ կշիւը	Թաղէ	Տեսակա- բաւ կշիւը	Թաղէ	Տեսակա- բաւ կշիւը
1866	3,1	20,9	0,8	5,2	3,4	22,8	5,8	39,9
1866	3,1	20,9	0,8	5,1	3,0	20,0	5,6	37,8
1867	2,9	17,5	0,6	3,7	3,5	22,2	5,8	36,7
1868	3,0	17,9	0,6	3,8	3,1	18,6	6,9	41,6
1869	3,4	17,8	0,6	3,1	3,5	18,8	7,7	41,0
1860	2,5	12,3	0,7	3,9	4,1	22,8	6,6	36,0
1913	3,5	12,9	0,4	11,5	11,8	43,1	8,6	51,6
1923	4,9	16,0	0,8	1,0	17,8	59,6	7,1	23,8
1924	5,3	14,3	0,3	0,8	24,5	66,8	7,7	21,1
1925	4,4	10,9	0,8	0,7	25,8	64,3	8,9	22,1
1926	3,8	8,7	0,9	0,5	30,0	69,0	8,7	20,0
1297	3,5	9,3	0,3	0,6	31,0	61,7	8,7	18,9
1928	4,9	9,8	0,2	0,4	33,6	68,0	9,2	19,8
1929	4,8	10,7	0,2	0,4	28,7	64,6	9,9	20,4
1930	4,9	10,0	0,1	0,2	33,6	70,0	8,1	19,8
1931	3,0	7,5	0,1	0,9	29,0	72,5	6,0	15,0

Այս աղյուսակից յերևում է, վոր համեմատած 1895 թվին նախադրութի մետաքսի արտադրության տեսակարար կշիւը $20,9\%$ -ից 1931 թվին ընկնում է և կազմում է $7,5\%$ ։ Ֆրան-

ախալում 3,2°/0-ից՝ 0,2°/0, Ձինաստանում 38,9°/0-ից՝ 15°/0, Իսկ Յապոնիայում աճում է 22,8°/0-ից՝ 72,5°/0: Շերամապահության-
զեղբարեացիների պատկերը, վոր բխում է կապիտալիստական տը-
տրաստապահության արհեստին հատուկ անասական ճգնաժամից,
յերևում է հետևյալ աղյուսակից (տոնն մետաքս-թելով):

Արևմտյան Յեվրոպա	1927թ.	1928թ.	1929թ.	1930թ.	1931թ.
Տրամախ	295	205	195	140	83
Իսալիս	487	4836	4826	4882	3000
Իսպանիա	83	79	74	68	58
Ընդամենը Արևմտյան Յեվրոպայում Արևելյան Յեվրոպա՝	5005	5120	5086	5080	3141
Վենցերիս, Ձինաստանիս, Հարպ- Մադիս, Բուսիսիս, Բուլղարիս	315	335	380	395	242
Հունաստան (Մուրիկ)	210	220	210	155	150
Միլիս և Սեզիպոս	270	280	290	245	190
Յանկաստան (Բրուսոս)	80	125	135	95	95
և Ս և Մ	260	360	520	748	900
Գարպաստան (Երպոսիս)	165	190	200	250	80
Հնուստ Արևելք					
Ձինաստան (Երպոսիս)	8660	9215	9225	8130	6000
(Շան-Նայի և Հանասի վրայով)					
Յապոնիա (Երպոսիս)					
(Իսկապամայի և Գորիի վրայով)	31225	35600	28745	33595	29000
Հնդկաստան					
(Թենպալիս և Գալիս)	80	60	20	—	30
Սեզիպիս (Երպոսիս)	60	50	40	20	30
Ընդամենը հնուստ Արևելքում .	40025	42925	38160	41475	30395
Ընդամենը համալսարհային ապրան- քալուստապահության	46165	49865	44770	48463	39643
Ընդամենը համալսարհային ապրան- քալուստապահությանը % % . .	100	107	97	104	86

Այս աղյուսակից յերևում է, վոր շերամապահության
դարգացման ռեկորդային տարին յեղել է 1918 թիվը, վորից
հետո բոլոր կապիտալիստական յերկրներում շերամապահության

շնչվում են, բացասություններ ձևավորվում են, ուր վերջին հիմա ասարում
անում են չարս անգամ,

Համաշխարհային զերամադանության հումույթն աղյուսակում
նշված հնգամյակի վերջին ընկնում են 14%-ով, այդ թվում
Քրեմլյան Յեդրոպայում 40%, Արևելյան Յեդրոպայում և
Լեհաստանում (սաանյ ձևավորվում են) 25%, իսկ ձևավորվում են 10%,
25%-ում 25% և Յապոնիայում 13%:

Այսպիսով անհնում են, վեր ձևային ձևավորվում են և, ուր զերամա-
դանությանը դասադանանակուն ձևուս հյուսերին դադանթայ
ասերցատրի անում են:

Շնորհիվ խորհրդային խոսանության և անարկուսներին,
զերամադանությանը մեղ մաս հիմնականում փոխել և իր պա-
հերը: Յնթն մինչ համաշխարհային պատերազմը զերամադանութ-
յան հիմնական բազան՝ դրևայի արտադրությանը դանվում
են մասնավորներին և անքին և ներմուծվում են արտադրմանից՝
Հաստատանից, Ֆրանսիայից և այլն, այսպիսով, խորհրդայինը որով
մինչ անհնց սեփական գրևայի արտադրությանը, վերջ
բազմաբար և վաչ միայն Միության կարիքները, այլև մի մասն
արտանմուծում են իրեն երազորային աղբանք:

Մինչ խորհրդայնացումը ձևավորվում են կային աննշան քանակու-
թյամբ մասաքաններ, բայց այսպիսով կառուցված են
մանաբան-դիզանաներ, վերանք աղանդում են ամբողջ բաժնի
լուրի վերամշակումը:

ձևավորվում են զերամադանության հիմնական բազան համարվում
են Միջին Ասիան և Անդրկովկասը:

1934 թվի աղյուսակում, Միության զերամադանության
պատկերը, ըստ ասանին հանրապետությաններին՝ ան 15 և չի
աղյուսակում:

Հանդիմանումներ, քառասուն	1933 թ.		1934 թ.		1935 թ.		1936 թ.		Ընդամենը
	Հարկ (անհատական)	Հարկ (գործառնական)	Հարկ (անհատական)	Հարկ (գործառնական)	Հարկ (անհատական)	Հարկ (գործառնական)	Հարկ (անհատական)	Հարկ (գործառնական)	
Աղյուսակային	5907,0	22,7	6240,0	31,4	8808,0	32,2	9000	34,3	
Ստորագրված	925,0	13,5	1043,0	19,6	1254,3	28,2	1890	30,0	
Տնտեսական	618,0	12,0	868,0	18,4	770,4	16,8	890	21,0	
Գնորդի կողմ	205,0	15,1	851,0	25,8	195,8	33,9	460	34,4	
Գործառնական	97,0	12,4	77,0	23,7	74,2	23,6	60	24,0	
Հարկատու	18,0	5,0	47,0	14,6	82,2	20,1	78	22,0	
Հարկատու	268,0	14,7	2022,0	22,8	2246,1	25,5	2500	30,0	
Աղյուսակային	1188,0	16,7	1324,0	30,8	1909,5	28,0	1870	27,7	
Ստորագրված	84,5	57,7	89,4	41,1	103,5	48,2	106	47,1	
Հարկատու	17,0	2,0	69,0	9,5	110,4	20,0	149,0	22,9	
Հարկատու	78,0	7,5	101,0	12,0	111,0	19,4	126	29,3	
Հարկատու	—	—	—	—	21,5	17,1	30	30,0	
Աղյուսակային	2,0	20,0	8,0	24,6	6,9	28,5	6	30,0	
Ստորագրված	1,0	14,3	2,0	11,5	7,7	8,3	4,5	15,0	
Հարկատու	1,0	2,1	1,3	5,0	4,4	14,4	5	17,0	
Աղյուսակային	10252,5	17,4	14498	25,6	15985	25,1	16900	30,4	

*) Նախատեսված և պետական

Վերջին տարիներում շերամազտահաքչումն ընդգրկել է նը-
պաստավոր կլիմայական պայմաններ ունեցող բոլոր վայրերը՝
Մեկրախնամ, Հյուսիսային Կովկասը, Կենտրոնական սեանդային
մարզը և այլն:

Հայաստանում մինչ համաշխարհային պատերազմը, բաժան-
վում էր 2000 տափ գրենա, վարդիսին գլխավորապես բաժան-
վում էր Մեղրու, Ղափանի շրջաններում և մասամբ ևլ Արարա-
տյան գաղտում:

Ներկայումս շերամազտահաքչումը զրազվում են 16 շրջան-
ներ՝ ընդգրկելով 3630 անտեսուխյուն: Գրենայի արատաքու-
թյունն ինչպես մյուս հանրապետություններում, այնպես և Հա-
յաստանում մինչ խորհրդայնացումը գտնվում էր մասնավորների
մեջքին և պատրաստվում էր միայն ներքին կարիքների համար:
Խորհրդայնացումից հետո սկսվում և ուժեղ կերպով զարգանալ
գրենայի արատաքությունը: Կառուցվում են վեց նոր գործարան-
ներ՝ ընդամուս արատաքրազակահաքչումը 100000 տափ գրենա,
վարի մի մասը՝ 75%-ը տալիս և Մեղրու շրջանը:

Հայաստանի շերամազտահաքչումն զարգացումն բառ տարի-
ների ներկայացնում և հետևյալ պատկերը:

Տարիներ	Գրենայի արատաքու- թյունը (տափերով),	Գրենայի բաշխումը (տափերով)	Բաժանի մթերումը (կիլոներով)	Միջին բն- ջատվությու- նը (կիլոնե- րով)
1922	300	800	18600	23,2
1923	1570	1000	25600	25,8
1924	10470	1200	45000	37,5
1925	35630	1600	70000	43,7
1926	69040	1427	68000	46,1
1927	60495	2000	87000	43,5
1928	60000	2000	95000	47,5
1929	87000	2045	98000	47,9
1930	92000	2085	94300	40,2
1931	92000	2040	98801	42,5
1932	110091	2237	84500	37,3
1933	98000	2119	90423	42,7
1934	105000	2259	108500	48,2
1935	100.000	2250	108000	

Պետք է նշել, վոր Հայաստանը կշիմայի տեսակետից ունի չափազանց բարենպաստ պայմաններ Միջին քերքաօվությամբ և մի շարք վորակական ցուցանիշներով Միության մեջ բանում և առաջավոր տեղերից մեկը: Այս հանգամանքը թելադրում է շահագործված մարմիններին՝ առավել մեծ ուղարկություն դարձնել՝ Հայաստանում շերտավորությունն էլ ավելի դարգացնելու համար:

3. ՇԵՐԱՄԻ ՏՈՂԸ ԿԵՆԴՐԱՄԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Յեթն դիտելու լինենք այնպիսի կենդանիներ, ինչպիսիք են՝ զիջածը, կարիճը, մորը, զգեղը, հանը, շերտի թիթնաը և այլն, կանանենք, վոր այս բոլոր կենդանիներն առնեն մի բանի ընդհանուր նշաններ: Այս կենդանիներին մարմինը յերկարությամբ և վորոշ հեռավորությամբ ունի ողակամե հասվածներ, վորոնք կոչվում են սեղմենաներ: Վտաները յերկարությամբ բաժանված են հոգերի: Մեզմենաներն ու հոգերն որսաքինից ծածկված են ծովելու անընդունակ կործր պատյանով (կուտիկոպոյով): Կենդանին կարողանում է շարժել իր մարմինը և վտաները միայն այն պատճառով, վոր սեղմենաների և հոգերի արանքը կազմված է բարակ և նկուս թաղանթից: Կուտիկոպոյին շերտը կառուցված է զիմացկուն և պինդ նյութից, վորը կոչվում է խիտին:

Կենդանական աշխարհում նման կառուցվածք ունեցողների թիվը բավականին մեծ է, վորով և ասորերվում են մյուս բոլոր կենդանիներից: Դրա համար էլ սրանք կազմում են հատուկ դաս և կոչվում են հողվածոտանիներ:

Բոլոր հողվածոտանիների թե արտաքին և թե ներքին կմախքը կառուցված է խիտինից, վոր կոչվում է կուտիկոպոյ:

Հողվածոտանի միջատներն աչքի յեն ընկնում: Իրենց մարմնի առանձին կառուցվածքով: Հեշտությամբ կարելի չէ ասորեն ինչ յերեք պարզ և բնորոշ մասեր, այն է՝ գլուխը, կուրծքը և փորը: Գլուխն արտաքինից ամբողջական է, կուրծքը կազմված է յերեք, իսկ փորը՝ 8—11 սեղմենաներից: Վտաները միշտ յերեք զույգ են և զտնվում են կրծքի վրա, կրծքի յորդաքանչյուր սեղմենաը կրում է մեկական զույգ մաշակի մեջ իր իր կապիկան վտաներ չեն լինում, այդ իսկ պատճառով մեծ մասամբ ամբողջ մարմինը պանվում է միայն 8 զույգ շերտներով: Կոչված ընտանիքի միջատներին գլուխը նորոշվում է նաև առ-

ոյից կատարւոյմաք. կրամ են մեկ դուշդ լարդ աչքեր, մեկ դուշդ բններ և բերանի հալելաւններ՝ վերին շրթանքը, մեկ դուշդ վերին անտաների ծածիչ. մի դուշդ ներքին ծնտաներ և ներքին շրթանք:

Բազմացումը կատարվում է ձվերի միջոցով:

Նշված միջատների առկայի իրենց սկզբնական յերկարությանից աչքաւ են մեծանում, վեր նրանց խթանային մաշկն անընդունակ և աչքաւնն ձգվելու: Այդ իսկ պատճառով կշանքի ընթացքում մի քանի անգամ անգի յն ունենում մաշկափոխության:

Միջատների վերնական հասունանալը անգի յն ունենում 3 ձևով. դրանցից մի մասում մաշկափոխության դուշդնթաց՝ սկըսում են դոյանալ խները, և աչք ձևով հասնում են իրենց վերջնական հասունացման աստիճանին, իսկ մյուս մասը մաշկափոխության ժամանակ արտաքին վոչ մի փոփոխության չի կենթարկւում, աչք վորդի և վերջնական հասունացման շրջանի միջև անցնում և միջանկյալ, աչքաւ կոչված՝ հարսնյակի շրջան, վորի ընթացքում անգի յն ունենում մարմնի ամբողջ վերակալումը:

Այն միջատները, վորանք անցնում են հարսնյակի շրջանը, հորմում են տանձին խումբ և կոչվում են լրիվ ձևվաներովոյներ: Այս խմբին են պատկանում թեփուկավոր թիթեռները՝ կոպիտ թևովոր լողողները, մածուկները, դուշդ թևանի անանքը, Թաղանթաթևավոր մրջյունները, ոյնակը և այլն:

Հարսնյակի շրջանում արտաքին պատճարներից պաշտպանվելու համար տարբեր միջատներ ունեն տարբեր հարմարեցում: հասար միջատները շատ մեծ ջանք են՝ դարձադրում և ժաղմում դանգած նյութերից մեծ քանակությամբ ծախում, վորպեսզի աչք բեկման շրջանում պաշտպանեն իրենց մարմինն արտաքին պատճարներից: Գաղաղանման նման ձևին և դիմում նախնայն զերմի վորդը՝ հյուսելով բոժոժ, վորի պարաստման համար նու չի խնայում միջոցներ: Մարմնում կուտակված նյութերի շէր (չորի հաղվով) ոգտադարձում և բոժոժ հյուսելու, շէն ոգտադարձում և կշանքի և շէր թողնում և մարմնի կատարման համար: Միայն այն մասը (բոժոժը), վոր ոգտադարձվում և մարմնի պաշտպանության համար, ոգտակար և մարդուն:

Նրիվ ձևակերպվողները խումբն, իրեն հերթին, բաժանվում և թեփուկավորների դասի: Այդ դասին և պատկանում նախնայն

շերամի թիթեռը։ Աերջինիս պատկանող միջատների մարմինը ծածկված է լինում թեփուկներով։ Լրիվ հասունացածն շրջանում բերանը նյանակալի փոփոխության և յնթարկվում Ինչպես թեփուկավորների ընտանիքում, այնպես եւ միջատների մեծ մասում սնվելու ֆունկցիան ամբողջությամբ կտաարվում և վարդ վիճակում, այդ իսկ պատճառով նրանց բերանն ունենում և արդիկ կտաարված։

Լորդն իր կյանքի ամբողջ ընթացքում սնվելով՝ մալմի մեջ կուտակում և հարստացնում և այլ սննդաբար նյութեր։ Այդ կուտակված նյութերով սնվում և կարսնյակը՝ մինչև իր վերջնական հասունանալը։ Թիթեռը համարյա քիչ մկանային աշխատանք կատարելու հետևանքով նեկտար չի ծծում։ Այդպիսիների զապանակումն զուեւր յնթարկված է լինում ատրոֆիայի, վորի հետևանքով անընդունակ և լինում վորեն կեր ընդունելու։ Նման յերևույթ նկատվում է շերամի թիթեռի մեջ։ Նրա թիթեռը բուրբուլին չի սնվում և զապանակավոր գուեւր փոխարենն ունի ծալքավոր թաղանթյա հաղելում։

Թեփուկավոր միջատները բաժանվում են յերկու հիմնական խմբի, այն է՝ գիշերային և ցերեկային թիթեռներ։ Սերեկային թիթեռների խմբին են պատկանում անհամեմատ փոքր մարմնով թեփուկավորները, վորոնց մարմինն ամբողջած են լինում մեծ, հաճախ գեղեցիկ գույնի թևերը։ Սերեկային թիթեռները նստելիս թևերը ծալում են ուղղամիջ դրությամբ։ Բիեերը թելանման են, ծայրը՝ ղեղանկ։

Գիշերային թիթեռների մարմինն անհամեմատ ծանր և, և վրան ամբացած են լինում վոր այնքան գեղեցիկ ներկված թեփուկերը։ Մեծ մասամբ թռչում են յերեկոյան և գիշերը, և վորովհետե գիշերային լույսի տակ անսողությամբ արուն չի կարողանում գրտնել եղին, այդ իսկ պատճառով նրանց մոտ չափազանց զարգացած են բեղիկները, վորոնք շատ նման են սանրի կամ փետուրի։ Բեղիկների ոգնությամբ՝ հոտառությամբ արուն կարողանում է գտնել եղին՝ բաղական հեռու տարածությա վրա։ Սգերի բեղիկներն ալելի թույլ են զարգացած, քան արուններինը։ Գիշերային թիթեռները նստելիս թևերն ուղղամիջ դրությամբ չեն ծալում, ինչպես անում են ցերեկային թիթեռները, այլ նրանցով ծածկում են իրենց ամբողջ մարմինը։

Շերամի թիթեռը պատկանում է գիշերային թիթեռներին,

Bombycidae ընտանիքին և լատիններին կաշվում և Bombyxmori-
կացի շերամի թիթեռները նույնպես գիշերային են և պատկա-
ռում են հարևան Saturnidae ընտանիքին:

Շերամի թիթեռները կամ բոլորովին չեն թռչում և կամ
թռչում են շատ վատ: Նրանք իրենց վաղ տյաքան մեծ թևերով
չեն կարողանում պահել իրենց ծանր մարմինը:

Վայրի շերամի թիթեռների մեծ մասը կրում և խոշոր թևեր
և թռչում և շատ լավ անցնելով բաժանին յերկաբ տարածու-
թյան:




ԳԼՈՒԽ 2-Բ

ՇԵՐԱՄԻ ՎՈՐԴԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱՆ ՅԵՎ ՀԵԶԻՈԼՈԳԻԱՆ

1. ՎՈՐԴԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՐՈՌԻՏՎԱՆՔԸ

Շերամի վորդը հասունացած վիճակում, այսինքն՝ բաժանվում է չորս սեռի։ Նախորդյալին, ըստ ցեղերի, ունենում է մաս 6—7 սանախմետը յերկարություն և 5—8 դրամ ծանրություն։ Նա աչքի չէ ընկնում ձգված, յերկարավուն մարմնով, դանազան խաչկերով և փոքրիկ գլխով։ Մարմինը բաժանված է տասներեք ուղղանկյունների (հոդերի), վորն արտաքինից հետաքննելով կարելի չէ հասկնալ։



Նկ. 1. Շերամի վորդի արտաքին տեսքը

ա—գլուխ, Կ—կուրծի, Ե—փորի, Ժ—կրծի վանդ, Ե—կնիք վանդ, Ի—բեր, վորի տակը գտնվում են վորդի դեռ չհասունացած սեռակազմ գեղձերը, Լ—փրսման հավելված։

2. Շերամի վորդի հասունացվածը

ա—կերակրամիզ, Կ—միջին աչի, Ե—հետմաշի, Ժ—կրծիկի արյունառար անոթը, Ե—կենսաբանական ճյուղային սխեմ, Ի—մետաբոլ գեղձեր, Լ—սեռական գեղձերի ռեպարտ։

Վորդի գույնը հասակի համաձայն վարդակի փոխվում է։ Առաջին հասակում ունենում է թուխ գույն, վորքան մեծանում է, գույնն ափսիս բացվում է։ Հասունացած վիճակում նրանք

տաբրերովում են իրենց գույներով. մեծ մասը լինում և կաթնա-
սպիտակ գույնի՝ թուխ, յերբեմն ել ամբողջովին գազըռնման
նախշերով:

Վարդի տաբրեր գույնեղ ունենալն ընդհանրապես կախում
է նրա ներքին մաշկի փափուկ շերտի գույնից, վարը մաշկափո-
խության ժամանակ չի փոխվում: Կան և մշտական միազուգ բծեր,
վարենք զանազան են մաշկի արտաքին՝ խոտինային շերտի վրա:
Վերջիններս թեպետ մաշկափոխության ժամանակ դեն են գըց-
վում, բայց մնացած են կոշվում, վարովնեռն նոր կազմակերպ-
ված խոտինային շերտի վրա դարձյալ զոյանում են: Ամեն մնա-
ցած բծերը յերկու գույն են. դրանցից առաջին գույնը դանձում
է հինգերորդ, իսկ յերկրորդ գույնը՝ ութերորդ սեղմնեղի վրա:
Վերջին գույն բծերը դանձում են վարդի դեռ չլարգացած սե-
ռակուն դարձաբանի տեղում:

Վարդի յերկրորդ և յերրորդ սեղմնեղանքը կնճառա են: Այս
մասում զարգանում են թիթեռի թևերը: Վարդի տառնմեկերորդ
հազում՝ մարմնի վերին կողմից կա փշանման մի հաղնջված:
Մարմնի վերջին սեղմնեղի վերջում կան յերկու կտրն թիտեռ-
նման մասեր, վարենք ծածկում են փաթկի հինգերորդ գույն
վտանքը: Թիտեռնման մասերն արանքում դանձում և հետանց-
քը: Նա ծածկված և յնսանկոյունածկ կազվի ծալքով, վարն իջա-
նից ներկայացնում և տաբրերի յենթարկված տառնեղերերորդ
սեղմնեղը:

Վարդի ըստ սեղմնեղանքի կողքերին, բացի յերկրորդ, յեր-
րորդ և տառնմեկերորդ սեղմնեղանքից, կան բծեր: Այս բծերը
կազմում են նրա շնչատուրթյան անցքերը (սաթումանքը): Վարդն
ունի ութ գույն վտանք, վարենցով թե շարժվում և և թե ընդ-
նում: Ութ գույն վտանքից յերեքը միանն են և կազվում են
կրծքի վտանք: Մնացած հինգ գույններն ալ ձեռն յեն և կազվում
են փորի վտանք: Կրծքի յերեք գույն վտանքը կոնանն են և
կազվում են իսկաղան վտանք: Սրանք թե վտանքի և թե ձեռ-
նեղի դեր են կառարում: Բաժոժ հյուսակիս, վարդը կրծքի վտա-
նքով դեկաղարում և մեծաքաթեղի ուղղությունը: Բարեքոթին
ալ կառուցվածք աւնն փորի հինգ գույն վտանքը: Դրանք դա-
սաթորված են փորի 3, 4, 5, 6, 7 սեղմնեղանքում և կազվում են
կեղծ վտանք: Սրանք վերջանում են լայն ներքանով, փորի ներ-
սում ողականն դասաթորված են անդիքը: Շարժվելու ժամանակ
վտանքի ներքանի ձեռ փոխվում և Այս վտանքի դերն ալ և,

վոր ամուր բռնում են առարկայից և պահում մարմնի համապաս-
 րդությունը: Ունեն առանձնական հատկություն: Նրա բոլոր հան-
 կերը նույն ձևի յնն, ամուր, կարացած և դեպի առաջ ուղղված:



Նկ. 2. Վարդի զամերը. 1—կրծի, 2—կնգծ

ձանկերը դասավորված են հերթականորեն և անհավասար են. քանի դնում են դեպի ծայրը, այնքան կարճանում են: Վերջին շորս ձանկերը համարյա իրար հավասար են: Ներքոնի ներքի կողմից, միջտեղում կան 2 ձվաձև բարձիկներ, դրանց շատ փափուկ են և պաշտպանվում են ամուր ձողիկներով՝ նման ձանկերի: Այս բարձիկները վառներին ոչ-նում են դառնալուն առարկաներ բռնելու մասանակ: Ըստ գիտնական Վերստեմի՝ ձանկերի միջի բարձիկները ծածկում են նոր գոյացած ձանկերը, վարձեց ամեն մի մաշկափոխության ժամանակ լրացնում են նախկին յեղանները: Հինգերորդ հասակում բարձիկներն անհետանում են, վարդիկն առաջ հասակում այլևս նոր ձանկեր չեն գոյանում: Ներքոնի արտաքին կողմում ձանկեր չկան, չբնութայնված են միայն ամուր կաշվով:



Նկ. 3. Վարդի գլուխը. 1—կողմից, 1—առ-
 ևճ, 2—վերին շորանի բնիկը, 3—վա-
 րի շորանի շորանիկը, 4—մասնա-
 պատկեր: II ներքինից: III վերինից. ա-
 ռաճ, 2—վերին շորանի բնիկը, 3—շա-
 շափուկ, 4—մասնապատկեր, 5—կարի-
 ճիկ:

Վարդի գլուխը ձվաձև է և սեղմված ներքև: Նորածին վարդի

դշխի դռանը լինում և ունի փայլուն, հետադարձ ըստ հասարակ՝ քանի դնում, դռանն այնքան բացվում և, իսկ վերջին հասակում դառնում և բաց շարժանակալայն:

Գլուխը կազմված և յերեք մասից՝ հակառից և յերկու հոդերից: Ճակատի ներքին մասերում դանվում և վերին շրջանը:

Գլխի առջին մասի յերկու հոդներում դանվում են վնասկուն դուռը, աչքերը, վարանք դարձացած ճին, ճին անհունում, բայց կարողանում են տարբերել լույսը խավարից: Աչքերի առաջից դուրս են գալիս նրա դուռը բեղիկները, վարանք կազմված են յերեք հոդից: Վերջին հոդի վրա գտնվում են զգացողություն մտքիկները: Վերին մասերի վրա գտնվում են կարիչները, վարանք կարծր են և սղցածման, դասավորված են շեղանկ և շարժվում են մեկը մյուսի հանդեպ: զբանով ծամում են անքնը: Երբեմնք կազմված և յերկու փափուկ մասերից, վարանք իրար փակում են, որանց վրա գտնվում են շոշափուկներ: Շոշափուկներին ծալքը կարծր և և պատած և մազով: Վերին և վարին շրջաններին մեջը՝ բերանի մուտքն և, վարը կազմում և ստամոքսի խոզովակի սկզբնավորությունը:

Ներքին շրջանների վրա ներսի կողմից կա մի փոքրիկ պատկ, վարը կոչվում և մետաքսապատին: Կողմերից գտնվում են նրա շրջանային շոշափուկները, վարանք շոշափով կերը շոշափում են: Վարդի գլխում կան ուժեղ մեծաներ, վարանք շոշափով շարժվում են դիտի բոլոր մասերը:

2. Մ Ա Շ Կ Ը

Վարդի մաշկը բաղկացած և յերկու շերտից, առաջին շերտը՝ արտաքինը կազմված և ամուր և դիմացկուն խիտինային մասից, իսկ յերկրորդը, վարն ընկած և առաջին շերտի տակը, ավելի նուրբ և և կազմված և կենդանի բջիջներով: Արտաքին շերտը՝ խիտինը բջիջներով չի կազմված, այլ իրենից ներկայացնում և ընդհանուր մի մասում, վար դրանում և նրա տակ ընկած յերկրորդ շերտի բջիջներին արտադրանքից: Խիտինային մաշկը մշտական չի լինում: Նա պարբերաբար փոխվում և:

Վարը չորս անգամ փոխում և իր մաշկը, վարը կոչվում և մաշկափափուկություն, իսկ ժողովրդական լեզվով ընդունված և անվանել: Զուհի Մաշկափափուկության հիմնական պատճառը վարդի մաշկի ծաղալի արագ և ուժեղ կերպով մեծանալն և: Խիտինային մաշկը չի մեծանում, այլ միայն մեծացող վարդի մաշկի

աղդեղութեան տակ լայնանում են, և յերբ լայնացումը հասնում է իր վերջնական աստիճանին, վորդը փոխում է ժաշկը: Հին ժաշկը փոխելու ժամանակ, նրա տակը գոյանում են խիտինային նոր շերտ, վորն, իր հերթին, աստիճանաբար ձևափոխվում փոխվում է հետագա ժաշկափոխութեանն ժամանակ: Հին խիտինային շերտը փոխելու հետ միասին, վորդը փոխում է արտախայաների, առաջին և վերջին աղիքների խիտինային ժաշկը և մա-



Նկ. 4. Վարդի մաշկի կտրվածքի սխեմատիկ պատկերը համապատասխանում է (1) չեղձափոխության ժամանակ (2): a—խիտինային շերտ, b—նոր խիտինային շերտ՝ մաշկափոխում ժամանակ առաջացած, c—բրդային շերտ, d—մաշկի, e—մաշկափոխում ժամանակ արտադրած կեղևիկ:

զիկները: Խիտինային մասը ծառայում է վոր միայն վորդի մարմինը ծածկելու, այլ և հանդիսանում է հենարան՝ վորդի մի քանի որդանների համար, ինչպես որինակ՝ շնչառութեան որդանները (արտախայաները), առաջին և հետին աղիքների և այլն: Բացի դրանից՝ վորդի մարմինը շարժման մեջ դնող բոլոր որդաններն ամրացած են խիտինային մասին:

Զվից նոր դուրս յեկած վորդի մարմինը լինում է ծածկված մաշկի ներքո: Նորածին վորդի ծաղալը՝ փոքր լինելու հետևանքով, մաշկի ներս ատանձնապես աչքի յն ընկնում, իսկ մեծահասակ ժամանակ, վորովհետև մաշկի ծաղալը մեծանում է, իսկ մաշկի ներս քանակը չի ավելանում, աչքի չեն ընկնում:



Նկ. 5. Մննդառաքյան սրգանը. 1—կերակրամուկ, 2—միջին աղիք, 3, 4, 5—կեանաղիք, 6—քեղեղան, 7—ճեղքալիկայան անոթներ:

Վարդի սննդառուցյան սրգանը հանդիսանում է ամենամասնիվը. վորը նման է պարկի:

Մննդառուցյան սրգանը, բացի վերևում նկարագրված բերանից, բաղկացած է յերեք մասից՝ կերակրամուկից, միջին աղիքից և հեանաղիքից: Այդ յերեք մասից ամենանշանակալիցը միջին աղիքն է: Նա նույն դերն է խաղում, ինչ վոր բուրակ աղիքները, կամ յենթաղիքում է, վոր աղիքներն այդ մասը կառարում է նախնակ լյարդի և յենթաստամոքսային գեղձերի գերը:

Աղիքի պատերը դրսից պատած են մկանային բարակ թևիկներից, վորոնք կնկում և լայնացնում են աղիքը: Կերակրամուկը և հեանաղիքները ֆիզիոլոգիական աղիքի պաշտանանանակության ունեն: Առաջինը շատ նման է չուռ տված ձագարի: Սկսվում է բերանից, անցնում է գլխով և վերջանում կրծքում: Այս մասը ձառայում է դուռ կերակուրը միջնաղիքն անցկացնելուն: Մյուս պատերը ներսից չբնագառված են բաղձանկյունանի ըջիջներով, իսկ արտաքին կողմից՝ մկանանոթով: Ծլիս առաջին մասում գտնվում են գեղձեր, վորոնք բացվում են բերանում և արտադրում նյութեր, վորոնց գերը մինչև սրտ պարզված չէ: Ինգձերն այնքան

խողոր են, վոր նույնիսկ հասարակ աշխով տեսանելի, յեն: Միջին աղիքը նման է լաշին խողովակի, վորն սկսում է կրծքի յերկրորդ սեղմենտից և հասնում է փորինի յերկրորդ սեղմենտին: Միջին աղիքի եպիթելային շերտը կազմված է յերկու տեսակ բջիջներից, վորոնցից մի տեսակն արտադրում է հեղուկ, վորը լուծում է կերը, իսկ մյուսը ներծծում է սննդարար նյութերը և տարածում է արյան մեջ:



Հետին աղիքը ծառայում է արտաթորելու համար: Հետնաղիքը բաղկացած է յերեք մասից. առաջինը կոչվում է բարակ, նուրբ աղիք, իսկ վերջինը՝ ուղիղ աղիք: Պատերը բարակ են. միջին մասը կոչվում է կույր աղիք՝ և բաժանված է

նշ. 6. Վարդի գլխի կտրվածքի սխեմայից պատկերված յերկարությամբ. 1—կերակրավազ, 2—մետաֆագատիմ, 3—մետաֆագոմիք, 5—բաղիղմիք, 6—կրծնակի աղյուսատար տնորը, 7 յեվ 8—վերին յեվ ներքին կերակրավազի կենտրոնական կտրվածքի սխեմայից պատկերված յերկարությամբ, 9—սխեմայից պատկերված սխեմայի գլխի կտրվածքը, 10—վերին շրջանի բնական

յերկու մասի՝ առաջին և հետին: Այս մասը ծածկված է շրջանաձև զուլս ցցված հավելվածներով, ուր կղկղանքն ստանում է իր ուրույն ձևը, կորցնում է խոնավությանը և գտնում է չոր, ամուր և մուգ գույնի: Այս մասում բաղկում են մալպիգյան գեղձերի խողովակները:

4. ՄԱԼՊԻԳՄԱՆ ԵՆՈՐՆԵՐ

Մալպիգյան ենոթները գեղ հատ են, սառմուքի յուրաքանչյուր կողմում յերեքը: Յուրաքանչյուր յերեքը դարձնում են մի ընդհանուր ուղիղ յուղարով, ուղիղ սառմուքի յերկու կողմից բարակ խողովակով մտնում են հետնաղիքի վերին մասը: Մալպիգյան բոլոր խողովակներն էլ այնպես են դասավորված, վոր նրանցից յուրաքանչյուրը բաժանվանին մեծ ողակ կազմելով՝ պատում է աղիքային խողովակը. ողակներն դասավորված են ուղիղ-

ված են դեպի դուռը: Մալգիկյան խաղաղակները, տալով մի շարք վախճաններ՝ ներկայացնում են դեղեցիկ նախ ու վերջա-
նում կույր մասով հեռանալիքի շարժը: Մալգիկյան խաղաղակնե-
րում արտադրվում են միջաթիթու, թրթնջաթիթույին հալցի-
Վերջինս առանձնապես յերևում և փոքրիկ վարդերի մեջ, վարձը
միևրուսիսացին դառաւ յերևում են բարեկեցիկների ձեռք:

Բյուրեղները լինում են քառակուսան, նույն նյութը նկատ-
վում և՛ և մաշկափոխութեան ժամանակ՝ մաշկում: Սա նշանա-
կում և, վաղ մաշկն ու մալգիկյան տնայինները, վարդն արտա-
դրող որդանները, լրացնում են մեկը մյուսին:

Ըստ դիտանական Դանդուլի՝ վարդն մաշկափոխութեան ժա-
մանակ մալգիկյան տնայինները խոշոր դեր են կատարում: Յերը
մտնում և մաշկափոխութեանը, փոխվող մաշկի և նոր կազմա-
կերպում խախտելու մաշկի արանքում լցվում և վերստին ցեղ-
ները արտադրած հեղուկը, իսկ մաշկափոխութեանից հետո այդ
հեղուկն այլևս չի լինում:

5. ՇՆՃԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՐԱՏԸ

Շերամի վարդի շնչառութեան աղաքառն խոնից ներկա-
յացնում և հատուկ խողովակներ մի ամբողջական սխեմով, վո-
րանք կաշվում են տրախեյաներ: Տրախեյաները խիստ կերպով
հյուսվածքով և կաշու տակ և տարածվում են մկանների
արանքում:

Նոր անդամաշտոված վարդի տրախեյաները, քանի դեռ
լցված են ոգով, յերևում են տրախեյային գեղեցիկ թելիկների
ձեռք:

Վարդի արտաքինից, նրա լուրջ քանջուր կազմում յերևում
են իննսական մուգ սպիներ. դրանցից առաջինն ընկած և կրծքի
առաջին սեղմննում, իսկ մյուսները դառնում են փոքրիկ առա-
ջինից մինչև ութերորդ սեղմննում:

Փորի յուրաքանչյուր կազմում գտնված այդ իննական սե-
ղները հանդիսանում են վարդի շնչառութեան յանցքեր (տակ-
մաներ): Յուրաքանչյուր սեղնի խոնից ներկայացնում և մի
նեղ տնցք, վորը և շնչառութեան արտաքին աղաքառն և:

Յուրաքանչյուր շնչանցքից դուրս են գալիս փնջանա արա-
խեյաներ, վորանք մարմնի ներսում տարածվում են հյուսված-
քառններով և կազմում նրա շնչառութեան գործարանը: Տրա-
խեյաները մարմնի ներսում այն առախեռն բարակում են, վոր

նույնիսկ միկրոսկոպով դիտելը պիտի և՛ Տրախյաները խա-
ցանցով թափանցում են վորդի ամբողջ մարմնի մասերը:

Վերն առածից յերևում և, վոր պեռք և լինի միայն 18 կապ
փնջման տրախյա, բայց փաստորին չստանն են՝ յուրաքան-
չյուր կողմում 10 կապ: Տասն-
բարդը զատավորված և առաջի՝

և յերկրորդ շնչանցքերի միջում.
առ անհամեմատ փոքր և, քիչ և
հյուղավորված և զանվում և կըրծ-
քի յերրորդ սեղմննտում: Վորդի
համար թե վորքանով և շնչա-
ռության գեր խաղում այդ առա-
ներորդը, պարզված չե: Շատերն
այն կարծիքին են, վոր այդ
տրախյաները չեն գործում:

Տրախյաների փնջերը թե յեր-
կարությամբ և թե լայնությամբ
միանում և կազմում են մի ողակ:

Վորդի շնչանցքները կամ ստեղ-
մաներն ունեն բարդ կառուցվածք
և վաճաճ են և կազմում են լատ մուգ
խիտինային չըջանակ: Այդ չըջա-
նակի աջ և ձախ կազմում ներքին
մասից կոն յերկու խիտինային
փեղկեր, վորոնք զատավորված են
հաջորդական ձևով:

Յերը շնչանցքը փակված և,
հետին փեղկը սեղմում և առա-
ջինին: Փեղկերը թաղիքանման
են, կարծես չյուսված լինեն մա-
զիկներից: Շարժվում են մեկը
մյուսի հանդեպ: Ուսումնասիրու-
թյանից պարզվում և, վոր ա-
ռանձին մազի՝ յերկարությանը
հավասար և փեղկի լայնքին և յուրաքանչյուր փեղկ կազմված և


3—4 չարք մազիկներից: Մազիկները մոյ թե զատավորված են



Նկ. 7. Ենթաուրյան աղաբառը յեվ նյար-
զային սխտմեղ. a յեվ b—տրախյաներ,
c—շնչանցքներից դուրս յեկող տրախյա-
նի փնջերը, d յեվ e—վերին յեվ ներքին
կծրակրափողի կծրակրափողի նյարդային
սխտմեղ համգույցները, f—կծրակրափողի
նյարդային սխտմեղ նյարդային համգույց-
ներ, g—կամրառուները, h—սխտմեղի
նյարդային սխտմեղ:

մեկը մյուսի վրա, այլ հերթականությամբ՝ կադավերով խաչածե-
ցանց: Փեղկերի ընցվելն ու փակվելն առանձին գեղարուբյու-
ներ չեն պահանջում:

Ողջ մեռնողամից չի մանում արտեսյաների փնջիկները
մեջ, այլ նախ՝ մանում և փոքրիկ կամերան, ապաևս կաշված



Նկ. 8. Ստեղծանք (շնամեղմեք). 1. արտաքին տեսք, a—
խտանային շրջանակ, b—շնամեղմեքի փեղկեր, 2. շն-
ամեղմի կամերայի կազմամբի սխեմատիկ պատկերը, a—
շրջանակ, b—փեղկեր, c—փակամի լծակը, d—շնամեղմի
կամերա նախադուռ, e յեղ օ—շնամեղմի կամերայից դուրս
չեկող արտախայտները:

շնամեղքի նախադուռը Սա վաղ ալլելն է, յեթե վաղ տընախայտի
ակզրնական մի խողովակ, վաղը շնամեղքից դուրս գալով՝ տալիս
և բազմաթիվ ճյուղեր, վաղոնք և կազմում են փնջիկները:

Շնամեղքի նախադուռը իբ նեղ անցքով ուղղված և դեպի
շնամեղքը, իսկ լայն մասով՝ դեպի մարմնի ներսը:

Շնչատուփյունը պայմանավորված է մկանները աշխատանք-
ներով: Շնքը կծկվում են մկանները, որտես ջանքերը սեղմվում
են, այն ժամանակ ողը շնչանցքից դուրս է գալիս, իսկ ջերը
մկանները թուլանում են, որտես ջանքերը լայնանում են, այն
ժամանակ ողը շնչանցքից ներս է մտնում:

6. ԱՐՑՈՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

Շերամի վորդը, ինչպես և մյուս միջատները, ունի արյան
դաշտը շրջանառությունը նրանք ունեն կոնակի ուղղությամբ
ընկած մի անոթ, վորի առաջին մասը կոչվում է արտա, իսկ
հետևի մասը կատարում է սրտի
դերը: Արտան ու սիրտը միա-
պին կաղժում են մի ընդհանուր
խողովակ՝ շրջապատված մկան-
ներով:

Անոթը ձգված է մինչև կուրծ-
քը և բաժանվում է մի քանի
նեղ կամերաների: Կամերանե-
րից յուրաքանչյուրը համապա-
տասխանում է յուր մարմնի ա-
ռանձին սեղմնություն: Այդ կամե-
րաները կոնակի անոթի լայնա-
ցած մասերն են:

Միևրակողով դիտելիս նկատ-
վում է, վոր յուրաքանչյուր կա-
մերայի կողքերից կան անցքեր:
Կոնակի անոթի կծկման դեպ-
քում անցքերը փակվում են,
այդ ժամանակ արյունն անոթից
մղվում է արտայի մեջ և այս-
տեղից թափվում է մարմնի խո-
ռը: Իսկ լայնանալու ժամանակ
յուրաքանչյուր կողմի անցքերը
բացվում են, և մարմնի մեջ տա-
րածված արյունը թափվում է
անոթի մեջ:

Արյունը մարմնի մեջ հատուկ



Նկ. 9. Կոնակի արյունատար անոթը
1. Անոթի ընդհանուր տեսքը, 2. անոթի
կամերան ընդլայնական կտրվածքով, 3.
սեղմանների դասավորումն անոթի կո-
մերայում:

արշաւնաւար անոթներով չի տարածվում, այլ ուղղակի տարտա-
յից տարածվում և մարմնի բոլոր մասերը և ձեռքերը նրա բոլոր
որդանները:

Շերամի վորդի, ինչպես և մշուս միջատների այսպիսի հա-
տարակ, պարզ արշան շրջանառութիւնը բացատրվում և նրանով,
վոր շնչառութեան սխալմը հաճախեց զարդացած և, և ոչն առ-
միջապես շիման մեջ և լինում արշան հետ: Արշունը ձեռքերով
մարմնի բոլոր ներքին որդանները՝ միտմամանակ մատակարա-
րում և թթվածին:

Վորդի արշունը ներկայացնում և պարզ, թափանցիկ հե-
ղուկ: Սպիտակ բոժոժ հյուսող վորդի արշունը բոլորովին ան-
զույն և, իսկ դեղին և կանաչ բոժոժ հյուսող վորդերի արշունն
ավելի գեղատառն է:

Ինչպես հայտնի յե, բարձր տիպի կենդանիների արշունը
կազմված և արշան պլազմայից և կարծիր ու սպիտակ գնդիկնե-
րից, իսկ վորդի արշունը կազմված և միայն պլազմայից և արշան
անզույն գնդիկներով:

Վորդի կանակի անոթի աղիտառնքն արտաքինից հեղաու-
թյամբ կարելի յե գիտել: Նա շատ կանոնավոր լայնանում և
կծկվում և Նորմալ ջերմաստիճանում (20° Ց.) վորդի անոթը
մեկ բաշխում բարախում և 50 անգամ: Ջերմաստիճանը բարձ-
րացնելուց բարախումների քանակն ավելանում և (24—29° Ց.),
հասնում և 60—65°-ի, իսկ ընդհանրապէս, ջերմաստիճանն իջնե-
նելիս (8—12° Ց.)՝ բարախումների քանակը պակասում և և հաս-
նում 7—8 անգամի մի բաշխում:

Վորդը պատկանում և ստանարշուն կենդանիների դասին:
Շերամի մարմնի մեջ կատարվող սննդաբար նյութերի փոխա-
նակման պրոցեսից դոյանում և ջերմութիւն. նախած նրան,
վոր շերամի վորդը պատկանում և ստանարշուն կենդանիների դա-
սին, վորոնք չունեն սեփական սաքութիւն և այն ընդունում են
շրջապատի ջերմութիւնից, բայց այնուամենայնիվ շերամի վոր-
դի ջերմաստիճանը 0,65—3,75° Ց. բարձր և լինում շրջապատի
ջերմութիւնից այն դեպքում, յերբ շրջապատի սաքութիւնը
տատանվում և 19,6—26,3° Ց. միջև: Միջավայրի նկատմամբ
վորդի տաքել բարձր ջերմութիւնը նկատվում և 4—5-ըզ հա-
տակների միջև, այսինքն՝ վորդի կերակրման ամենայնուայն շր-
ջանում: Մաշկափոխութեան ժամանակ վորդի ջերմութիւնն ընկ-
նում և, այդ ժամանակ նյութերի փոխանակումն ավելի քիչ և
կատարվում:

Վարդի ամենահետաքրքիր սրբանշնչից մեկը մեատքաի գեղ-
անքննեմ Վոշ մի միջնախի մեջ աչք գեղաներն աչք մեկուքնն
չեն հաղնում, ինչպես զերամի վարդի մեջ Մեատքաի գեղանքը հաղ-
նում են վարդի մարմնի ծավալի մասը:

Նա առնի յերկու յերկուր վարդապատույտ գեղանք, վարդի
սկզբում են բերանի խոտ-
չի ներքին զրթունքի մե-
տաքապատույտից և վերջա-
նում հետնադիքի սահման-
ներում:

Ձիգիտուդիական տեսակե-
տից յուրաքանչյուր գեղե-
րաժանվում և յերեք մասի:
Ամենագեղին մասի յեր-
կարությունը հասնում և
150 միլիմետրի և կաթնա-
դուչն և:

Գեղանի միջին մասը հան-
գիսանում և ազնվաբուրդ,
վորն ամենալայն մասն և
և ալիլի փայլուն: Գունա-
վոր բոժոժ հյուսող վարդե-
րի մեատքաի ազնվաբուրդն
ունենում և մեատքաթնի
գույն: Գլխի կողմն ընկած
մասը (առաջին մասը) ամե-
նաբարակ և նուրբ խոտ-
վալի նա և ստանում: Այս
մասը մոտ յերեք անգամ
բարակ և գեղանային մա-
սից, իսկ ինն անգամ ալի-
լի բարակ և ամենալայն
մասից—ազնվաբուրդից: Մա-

իք յերկարությամբ հասնում և ժուռ 3,5 — 5 սանտիմետրի:
Վարդի ներքին գործարանների մեջ մեատքա գեղանքը բու-



Նկ. 10 Մեատքաի գեղանք. 1. մեատքաի գեղանքի
այն մասը, վորը գտնվում և զիսում (ան-
կար 6). 2. մեատքաի գեղանքի ազնվի մասը,
3. ազնվաբուրդ. 4. գեղանային մասը:

նույն են աստիճան տեղը և դրա համար եղ նրանք ուժոված են հարուստ տրախեյաներով:

Մետաքսագեղձերի պատերը բաղկացած են յնրեք շերտից. առաջին՝ նուրբ և բարակ լատանիից, յնրեքորդ՝ բլլային շերտից և յնրեքորդ՝ կուտիկոպային շերտից: Առաջին շերտն այնքան էլ մեծ դեր չի խաղում. նա ծառայում և միայն վարպես հիմք, վարի վրա տարածվում են տրախեյաների ճաւղափորութիւնները: Բլլային կլեմենտները նրանց մեջ չեն նկատվում:

Գեղձային մասում կուտիկոպային շերտը ներկայացնում և մագիկները մի ցանց, իսկ յնրեքորդ մասում (գլխի կողմը) ներկայացնում և հարթութիւն, վարի միջից անցնում և մետաքսը Բոյր շերտերից ամենահիմնական մասը բլլային շերտն և, վորն ընկած և դրա կողմից հիմնական նուրբ լատանի և ներքի կողմից կուտիկոպային շերտը մեջ:

Մետաքսագեղձի բլլայինը, համեմատած մյուս կենդանական բլլայինների հետ՝ անհամեմատ ավելի մեծ են և ընդող, նույն իսկ հասարակ աչքով անասնիկ չև, իսկ սեղեթուարի բլլայիններն էլ ավելի խոշոր են: Բացի դրանից՝ մետաքսագեղձերի բլլայինների միջի կտրիքը տարածված և գեղեցիկ ճաւղափորութիւններով. առանձնակի աչքի չև ընկնում սեղեթուարի բլլայինների կտրիքի ձևը:

Մանախանալով մետաքսագեղձերի անատոմիական կազմին, այժմ անցնենք նրա ֆիզիոլոգիական նշանակութիւնը, վորը մեծ դեր և խաղում վարդի կյանքում:

Մետաքսագեղձերն արտաթորում են շորս նյութ. առաջին՝ մետաքս կամ ֆիբրոյին, յնրեքորդ՝ մետաքսային խոտ կամ սերիցին, յնրեքորդ՝ մուկոյիդին և շորսորդ՝ դանափորոջ նյութեր:

Նշված շորս նյութերից ամենակարեւորը ֆիբրոյինն և, վորն արտաթորվում և գեղձային մասում: Այս մասում և, վոր առաջանում և ըստ մետաքսը. իսկ յնրեքորդ մասում (միջին լայն մասը՝ սեղեթուարը) արտաթորվում և սերիցինը — խեժային նյութը, վորի միջոցով մետաքսն ստանում և իր ուրույն պատկերը: Ներքորդ մասում արտաթորվում և մուկոյիդինը, վորը խառնըվելով մետաքսի հետ, հնարափորութիւն և առկա նկատ կերպով անցնելու խողովակով՝ ինկերվուարում, մանավանդ յնրեքորդ և յնրեքորդ արմուկների միջին մասում, արտաթորվում և մի առ նյութ. դա դանափորոջ նյութն և. սրանով մետաքսն ստանում և իր համապատասխան դաշնը: Բն ինչպես են առաջանում դանափորոջ նյութերը, մինչ որս պարզված չի: Կա միայն մի

կարծիք, զոր գումամորոզ նշուիներն տալիանում են արյանից և գեղձերի պատերից ծնվում են ուղերվուտերի մեջ: Այս հանգամանքի երևալինը դեռ չի հաստատված:

Մետաքսաթելը դուրս և դալիս վաղ թե ղորպես մի թել, այլ ղորպես յերկու թել՝ շրջադառնալով սերիցինով:

Մետաքսագեղձի գույշ խողովակները գլխում միանում և կազմում են մի խողովակ: Սրա միջին մասում գոյանում և ուռուցիկ մաս, զորն իրենից ներկայացնում և մետաքսանդմիշը (տես նկ. 6): Սա մետաքսաթելի գոյացման դարձում մեծ դեր և խաղում:

Ժրլենի կարծիքով մետաքսանդմիշի դերը հետևյալն է.— Առաջին՝ զննվարում և մետաքսաթելի դուրս դալը, այսինքն՝ կարգ և արագացնել կամ դանդաղեցնել: Յերկրորդ՝ տախտկացնում և այն: Յերրորդ՝ լցնալ յեղած ժամանակ զտգարեցնում և մետաքսաթելի դուրս դալը և ղորդի կալոված ժամանակ պահում և այն, ղորպես ունելքի մեջ: Զարրորդ՝ թելը ղորեն տարակայնի տեղացած լինելու ժամանակ, կտրում կամ ձգում և այգլիսին: Հինգերորդ՝ ավելացնում կամ պակասեցնում և խեփ շերտը:

Մետաքսանդմիշի կառուցվածքը և աշխատանքը հետևյալն է.— մետաքսանդմիշի ներսում կան յերկու խիալնային ուռուցքներ, ղորոնցից ներքևինը կլատուսանման և՛ զազավոր մասով, ազդված վերև, իսկ ղերջինը ձողի նման և, զազաթի ուռուցիկ, վաղը մկանների ռգմությամբ բարձրանում և իջնում և: Մետաքսի մասսան այտուղից անցնելով տախտկանում և և դառնում յերկու իրար կպած տախտի մետաքսաթել, ղորը մետաքսապատիճից դուրս դալով՝ կազմում և բոժոժի թելը:

8. ՎՈՐԻՒ ՍԵՌԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐԸ

Հասունացած ղորդի մեջ սեռական գործարանները բավականին զարգացած են լինում, սակայն զարգացումն այն աստիճանի չի հասնում, զոր ընդունակ լինեն զուգավորման: Թե եզի և թե արդի սեռական գործարանները զտնվում են ղորդի կրծքակի ուղղությամբ ութերորդ ողակում, կանաչի տալիս աջ և ձախ կողմերում, ուղիղ այն մասում, ղորտեղ դրսի կողմից գտնվում են նրա խալերը:

Վարդի մեջ արդի սեռական գեղձերի սերմարանն ունի յերկամաշնքի ձև, իսկ եզի սեռական գեղձերը՝ ձվաբանը յնսան-

կյանումն եւ թե եղի եւ թե արդի սերձնարաններէ մեջտեղից դուրս են գալիս հասունաստար սերմնային խողովակներս Արդի սերմնային խողովակներն աղիլի յերկար են. նա տանձակ եւ տաններեւելայերուդ սեղմեհասու միանալով՝ կողմում եւ տանձակ մի մարմին, ապա մի խողովակ, վերջ վերջումն եւ արտաքին մասում, վարի տակից՝ կեղծ վտոքերի միջեւ:

Նաչնայիս տարրեր եւ արական եւ իզական անտեղան պեղմաբի ներքին կառուցվածքը: Յուրաքանչյուր սերմնարան կողմումն եւ 4 առանձին կամերաներից՝ լցված սերմնային գնդիկներով: Յուրաքանչյուր կամերայի գիմացը՝ սերմնարանին ներքին կողմից ընկած եւ հասունաստար սերմնային անոթի՝ սկզբնական նշագովորումը:

Նոյն ձգտումումն դանձում են չորս ուսեղ զարգացած խողովակներ՝ լցված սերմերով: Յուրաքանչյուր խողովակ վերջանում եւ կոր մասով, իսկ հակառակ ծայրով միանում հասունաստար խողովակին: Սերմնարաններն իրենց զարգաթիւ ծայրով միանում ու ամբանում են վարդի մարմինն:

9. ՀԱՐՊԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

Առհասարակ ճարպային մարմինները վարդի մեջ տարածվում են այնպեղ, վարակղ կան աղասա տարածումը յաններս: Ճարպերն ամեն կողմից շրջապատում են նրա ներքին գործարանները:

Ճարպային մարմինները վարդի կանքի մեջ խոշոր նշանակութուն ունեն: Յեթե մենք վարդի միջից հանենք նրա բոլոր սրզանները, կանաննք, վոր ճարպային գնդիկներից վորտը մասը քուս եւ Ուսումնասիրութուններից պարզվել եւ վոր ճարպային գնդիկները յերկու գեր են խողում. առաջին՝ անունղ են դանում տալողա թիթեւնիկի համար, եւ յերկրորդ՝ մասամբ եւ ոմանդակում են լրացնելու արտադրող գործարանների՝ մալիկեյան խողովակների աշխատանքներին:

10. ՄԿԱՆՆԵՐ

Մկաններն ըստ իրենց ֆունկցիաների եւ նշանակութւն յան լինում են յերկու տեսակ. գրանցից մի մասը պայմանավորում ներքին սրզանների, իսկ մյուս մասը՝ արտաքին սրզանների շարժումը: Առաջինին պատկանում են՝ կոնակի անոթը, մկան-

ներք, արշամ տառի շարժմելու և աղիքների պատերը շարժման մեջ դնող մկանները և այլն. յերկրորդին են պատկանում վոր-
ները, բեղիկները, դաւոր և մարմնի այլ արտաքին որգանները
շարժման մեջ դնող մկանները: Արդի ամբողջ մարմնի շարժու-
մները պայմանավորված են մկանների ախտատանքով: Մկանները
կադմիւմ են առանձին մկանային թելիկներից, վորոնք իրենց
հերթին կադմիւմ են յերկարավուն բլիկներից՝ շրջապատված
առանդակաւ թաղանթով: Մկաններն ստոված են նյարդային
վերջավորութեւններով և արախեյաներով:

11. ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՍԻՍԵՄ

Առհասարակ վորդի, ինչպես և մյուս միջատներին նյարդի
սխտանը շատ և զարդացած: Ենթինվ նյարդային սխտանը՝ վոր-
դի որդաններն ախտատանքի մեջ են մտնում:

Նյարդային սխտանին կենտրոնական մասը, վորով վորդն
դղում և, նրան վորտը շարժման մեջ և դնում և այլն, կադ-
միւմ և ընդամենը 13 դուշը նյարդային հանգույցներից (տես
նկ. 7): Դրանից մի դուշը, վորն ամենամեծ հանգույցն և կադ-
միւմ, ընկած և գլխում՝ կերակրափողի վերին մասի վրա: Մնա-
ցած հանգույցներն ընկած են վորովայնի կողմում և կադմիւմ
են նյարդային շղթան:

Վորովայնի նյարդային շղթայի ամենաառաջին հանգույցն
ընկած և գլխում և կոչվում և կերակրափողի տակի նյարդային
հանգույց: Տերեք դուշը հանգույցներն ընկած են կրծքում և
կոչվում են կրծքի նյարդային հանգույցներ: Մնացած ութ
դուշը նյարդային հանգույցները գտնվում են վորովայնի կո-
մում, յուրաքանչյուր սեղմենտում մեկական՝ դուշը՝ բացառու-
թյամբ 7-րդ սեղմենտի, վորտեղ գտնվում են վերջին յերկու դուշը
հանգույցները: Աւթերորդ և իններորդ սեղմենտներում հանգույց-
ներ չկան:

Յեթն միկրոսկոպով դիտելու լինենք, կանանք. վոր նյար-
դային հանգույցներն իրենցից ներկայացնում են բլիկների մի
նյութվածք: Տուրաքանչյուր դուշը նյարդային հանգույցներն
իրար հետ միացած են նյարդային թելիկներով, վորոնք կոչվում
են կոմիսուրներ: Դրանցից և նյարդային հանգույցներից դուրս
են գալիս ըստակ մազիկների փնջեր, վորոնք շտարածվում են
մարմնի բոլոր մասերում:

Յուրաքանչյուր դույզ նյարդային հանգույցները թելթելան-
քի միջոցով ընդառնում են զգացողությունը՝ մարմնի բոլոր ա-
զաններին և առկա են համադաստասխան հարգադրություն:

Կերակրամոդի վրայի հանգույցների յուրաքանչյուր հազ-
մից դուրս են դալիս ժեկտան նյարդեր—առաջին՝ վերին չըր-
թունքի, յերկրորդ՝ բեղկիներին, յերրորդ՝ տեսողության, վերահի-
շյու յերեք նյարդերից միայն տեսողության նյարդերն են հոշ-
վում զգացողության նյարդեր, իսկ մնացած յերկու նյարդերը
պարմակում են իրենց մեջ շարժողության մադիկներ, վորոնց
ազդված են զեպի վերին շրթունքի մկանները: Հնայած զբան՝
նրանց նույնպես կարելի չե զգացողության նյարդեր տնվանել:
Վորովհետև մեծ մասամբ միջատների, նայն թվում է՝ զերամի-
թիթևի համար բեղկիները ծառայում են վորպես զգացողու-
թյան և շոշափելիքի որդաններ:

Կերակրամոդի տակի նյարդային հանգույցներն նյարդերը
դնում են զեպի ներքին մասները, ծամելիքները և ներքին
շրթունքները: Իսկ ինչ վերաբերում է վորովայնի շղթայի մյուս
հանգույցներին՝ նրանցից յուրաքանչյուրից դուրս են դալիս 2
զլխամոդ նյարդեր, վորոնցից մեկն ուղղված է մեջքի, մյուսը
վորովայնի ուղղությամբ: Բացի կենտրոնական նյարդային սխ-
տեմից, վորն ունի նաև համակրական (սիմպատիկ) նյարդային
սխտեմ, կան և այլ նյարդեր: Համակրական նյարդերը զեկտա-
րում են անդամությունը, շնչատությունը, աբյուն շրջանառու-
թյունը և այլն:

Այս նյարդերը կապ ունեն կենտրոնական նյարդային հան-
գույցների հետ (տես նկ. 7):

Միջատների, այդ թվում և զերամի վորդի զգացողության,
հասառության և հաշակելիքի որդանները հանդիսանում են զգա-
ցողության մադիկները, վորոնք ստված են նյարդային վերջածա-
րություններով: Կան աարբեր ձևի մադիկներ, վորոնցից յուրա-
քանչյուրը ծառայում է աարբեր ֆունկցիաների համար: Ավելի
կուշ և ջցված մադիքը ծառայում են զգացողության համար, իսկ
ավելի կարճ մադիքը, պատած բարակ կուտիկուլայով՝ հասառու-
թյան համար են: Ճաշակելիքի որդանը հանդիսանում են կոկորդի-
շուրջը զանված զգացողության վերջավորությունները: Ինչ վե-
րաբերում է տեսողության որդանին, այդ ֆունկցիան կատարում
են վեց դույզ աչքերը, վորոնց ընդառնով լույսի գրդիք՝ տե-
սողության նյարդերի միջոցով առկա են կերակրամոդի վրայի
հանգույցին:

Շերտմի վարդը բաժան հյուսակույց հետո Թեում և բաժանմի մեջ:

Մի քանի որից հետո տեղի յն ունենում մաշկափափու-



Նկ. 11. Վարդի մեղամորսույց հարսմանի յնվ բիքեռի. 1 յնվ 2—վարդի տնայր բաժանի մեջ՝ կողմից յնվ առջևից. 3—մաշկափափույց յնվ մեղամորսույց հարսմանի, 4 յնվ 5—հարսմանի տնայր առջևից յնվ կողմից. 6—հարսմանի մաշկափափույց յնվ բիքեռի դուրս գալը բաժանմից, բաժանի մեղմիկի մատուս յնվ ունում և վարդի մաշկը հարսմանի մեղամորսույց կեսու:

թշուաճը և ձեռավորվում հարսնուհիւ Նոր կապմանկերադամ հարս-
նուկն արտաքինից ասարկերվում և վարդից Նրա վերին մասը
քիչ հաստ և և քանի գնում, այնքան նեղանում և, իսկ հետևի
կողմն ասանում և սուր ձև

Դույնն սկզբում լինում և բաց-գեղնավուն, իսկ հետո հեղ-
հեռե թխտում և մարտքինից նկատվում են նրա թևերը, բե-
ղերը, աչքերը և դաւերը

Յերբ հարսնուհի աչքերն սկսում են սեանալ, դա նշան և,
վոր հարսնուկը ժողովում և թիթեանիկիւ Հնդահանության մեկ
հարսնուկի աչքերն սեանալն աւնի իր պրակտիկ նշանակությունը

Հարսնուկի ներսում առաջ են դալիս մեծ փոփոխություն-
ներ, որդաններն մի մասն ամբողջությամբ վերանում և, ինչ-
պես, որինակ՝ մեռաքաղեղները, կեղծ վառները և այլն Մի
մասն եւ, վերը վորդի մեկ սկզբնական դարգացման աստիճանա-
կեր, սկսում և քաճեղ և արագ կերպով դարգանալ, ինչպես սրի-
նոս՝ սեռական դարձարանները, իսկ որդաններից մի մասն եւ ձե-
վափոխվում և նոր որդանների, որինակ՝ անդառության աստիճանը

Սեռական արդաններն սկսում են դարգանալ Կովորդը դառ-
նում և մի չերկար խորովալ Շրթունքի գեղները կծկվում են և
դաշտնում մի խորը (փուչիկ), ուր կուտակվում և մի հեղուկ, վո-
րը կոչվում և ալկալի հեղուկ Յերբ թիթեան ուղում և դուրս
գալ բաժանից, այդ հեղուկից բաց և թողնում բաժանի ծայրին,
վորով լուծում և մեռաքաղեղի խեժային մասը և հարսնուկու-
թյուն և առաջ թիթեանի դուրս գալուն

Սասմաքը փաքանում և դառնում և մի դողիկ, ուր կու-
տակվում և կաքմարվուն մի հեղուկ

Աչքերները կծկվում են, հետնադիրքը դառնում և մի խոռոչ,
վորանդ լցվում և թուխ կարմրավուն հեղուկ թիթեան բաժանից
դուրս դալուց հետո՝ այդ հեղուկն անմիջապես բաց և թողնում

Կանակի դարկերակը դարձյալ մնում և նույնը, միայն ավե-
լի դանդաղ և դարձում և շատ անկանոն Սեռական դարձարան-
ները դարգանում են և կարելի չե դանդաղանել եզն արդից՝ իրենց
փորի մեծությամբ և անհարկութեամբ Մի հարսնուկի վորը ձվով
լցված լինելով՝ աւառ և և ծանր

Բացի դրանից, հարսնուկ ժամանակ սեռը կարելի չե վորոշել
հետեյալ ձևով Յեթե նայեմք հարսնուկի վեցերորդ դույզ ջըն-
չանցքներում դանված սեղմենտին, կտեսնենք, վոր արվի մաս
այդ սեղմենտի և նրա հետեյալ սեղմենտի սահմանում փորի լույ-

նույնպէս մի ծայրից մյուսն ուղիղ անցնող մի գիծ, իսկ եզրի մաս ալիք սահմանող գիծը մեղմանդից կորանում է յետ և ըստ յերկարութեան կազմում մի նեղ ճեղք։ Արվի մաս ալիք բարակ շերտերը գոյութիւնն չունեն, բայց դրանց ժողխաբեն նույն սեղմենաում կան կէտք և թուի բծեր, վորոնք զուգավորման արգանք վերջավորութեանն են։ Յերիտասարդ հարսնյակներում սեռը տարբերելն ավելի հեշտ է, քան հասունացածի մաս։ Հարսնուկի սեղմենաներն հաշվելիս թյուրիմացութեան չափանշանաւու համար ավելի լավ է ավելի սեղմենաը գտնել շնչանցքներն հաշվելու միջոցով։

Թե՛ եզրի և թե՛ արվի սեռական դործարաններն սկսում են ուժեղ կերպով դարգանալ հատկապես ուժեղ փոփոխման և յեմթարկվում եզրի սեռական գործարաններէ ձեռ, իսկ արվինը համարյա չեն և նույն ձևով, ինչպես եր վորդ վիճակում։

Չնայած նրան, վոր հարսնուկը չի շարժվում և կեր չի ընդունում, բայց ուժեղ կերպով շնչում և և շատ զգայուն է։ Մեկ ժամում մեկ կիլոգրամ հարսնուկը շնչում է 0,242 գրամ թթվածին։

Յեթե բոժոժները յերկար ժամանակ (24 ժամ) հասա չերտով փռված վիճակ, հարսնյակների մեծ մասը շնչառեղձ կլինի։ Մահացու աղկերութեան են թողնում դադերը, ինչպես որինակ՝ ձմեռաթթումն, ամոնյակը և այլն։ Հարսնուկները վաղ միայն ներշնչում են թթվածին և արտաշնչում ածխաթթու, ալի և մեծ քանակութեամբ ջուր են գոլորդացնում։ ալի իսկ պատահաով արտադրութեամբ պակասում է նրա քաղը, վորը յերևում է հետեյալ աղյուսակից։

Միջին մեծութեան բոժոժներն որական կարցնում են՝

Հունիսի	18-ին	կշռել են	365,0	գրամ
>	19-ին	յեղել է	345,5	>
>	20-ին	>	345,0	>
>	21-ին	>	339,0	>
>	22-ին	>	423,0	>
>	23-ին	>	316,5	>
>	24-ին	>	312,5	>
>	25-ին	>	311,0	>
>	27-ին	>	309,5	>
>	28-ին	>	306,5	>
>	29-ին	>	302,5	>

Հունիսի 30-ին	յեղել է	294,0	դրամ
Հուլիսի 2-ին	»	291,0	»
» 3-ին	»	285,0	»
» 4-ին	»	285,0	»

(Տիկոս) իրով—«Գրանիկի շերտաձևություն» (17)

Այս հաշվով մեկ կիլոգրամ բոժոժը 17 սրբում իբր ջրալից, հարցնում է 21,8⁰/₀,

Հարսնուկի գորգացուման պրոցեսում մեծ նշանակություն ունի նախնական ջերմաստիճանը: Համեմատյա Կարնայիի հասարակ փորձերի 12,5⁰—13,2⁰ Ց. հարսնուկն առանց թիթեռ մեակներով զեղու, կարողանում է պահպանել իբր գոյությունը մինչև հաջորդ գորգումը, իսկ 0⁰—0,8⁰ Ց. 3—4 ամսվա ընթացքում մահանում են Հարսնուկները դժմանում են մինչև 68°—75° Ց., բայց առան սրժող ընթացքում մահանում են: Նորմալ պայմաններում (24°—25° Ց.) հարսնուկի հասակը տևում է 12—15 օր, մարից նեղ փոխվում է թիթեռի (տես նկ. 11):

13. Թ Ի Թ և Ռ

Մաշկափախության պատճառով հարսնուկին առաջին հերթին բոժոժում է ժորժային կուտիկոզայից, մորից հետո թիթեռը շահագործելով կարճ ժամանակը մեղմի ուղղությամբ, կուտիկոզային շերտում ճեղքվածք է առաջացնում, բացի դրանից՝ ճեղքում է թևերի յեղքի կուտիկոզային շերտը ուղղությամբ: Դրանից տնտեսական հետաքրքիր է թիթեռն աղաքում է իբր քնդիկները, թաթեքն ու թևերը, հետ է վանում հարսնուկի խեղճը և գլխով առաջ մղելով՝ հենվում է բոժոժի առաջին ծայրին: Այդ ժամանակ թիթեռը յուր քնդանից բաց է թողնում փուչիկի մեջ գտնված ալկալի նյութից 2—3 կաթիլ: Ալկալին ունի այն հատկությունը, ժոր թաղանթներով մեկնում է բոժոժի պայանի մեջ, և նրա մեջ պարունակվող ֆերմենտների ազդեցությամբ առկա քայքայվում է սերիցները և քանդվում մետաքսաթելը: Թիթեռը գլխով և վառներով բաց է անում մետաքսապայանը և դուրս է գալիս:

Նոր դուրս յեղած թիթեռը լինում է թաց. դա ապացույց է, ժոր մաշկափախությանը և թիթեռի բոժոժից դուրս գալը տեղի չեն ունենում միաժամանակ, ժորով հետևելով ժրջի հեղուկը, ժոր է գոյանում և մյուս մաշկափախությանների ժամանակ, դեռ չաբացած չի լինում:

Թիթևաները լինում են սպիտակ, մասամբ՝ մոխրագույն։ Գույնը կախված է այն թեփուկներից, վարով ծածկված և նրա ամբողջ մարմինը։ Այդ թեփուկները զարաված են իրար վրա խիտ կերպով և իրենց յերկարությամբ ծածկում են մեկը մյուսին։

Գլուխը նվաճն է և ունի կողքերից խոշոր աչքեր։ Աչքերը կազմված են մոտ 10000 աչքուկներից, վորանց մոտ գտնվում են նրա բեղիկները՝ կազմված 30 մանր մասնիկներից։ Բացի հիթնական մասնիկներից, յուրաքանչյուր մասնիկի յերկու կողմերից դուրս են գալիս նեղ թերթիկներ, վորանց շնորհիվ բեղիկներն առանում են գնալաձև տեսք։ Արվի բեղիկներին նեղ թերթիկներն աճելի յերկար են և ծածկված բաղմամբով մաղիկներով, քան եղերներ։ Բեղիկների հիմքում տնցնում են սկաններ, արախեյաներ և հոտառության նյարդեր։

Թերանը բոլորովին նման չէ վարդի բերանին։ Բերանի մասերն իրենց քանակով նույնն են, սակայն բոլորովին այլ ձև ունեն։ Վարդի ուժեղ ծամելիքների վրաբերն յերևում են նուրբ բարձրություններ, բլբլրակներ, վորոնք ֆիզիոլոգիապես մի առանձին նշանակություն չունեն։

Ներքին ծնոտներն այլ ձև ունեն, նրանք ներկայացնում են պարկաճման հավելվածներ և ծածկում բերանը։ Մրանք նույնպես ֆիզիոլոգիական տեսակետից մի առանձին նշանակություն չունեն, իսկ դրանց հսկառակ ներքին զրթունքների բեղիկներն աճելի շատ են դարդացած, քան վարդեր։

Թիթևաի կլմքի առաջին սեզմենտը հոգավորված է և դուրաշաբմ։ Յերկրորդ և յերրորդ սեզմենտները միացված են։ Վերջիններս կրում են մեկտան գույզ թևեր, վորանցից առաջին գույզ թևերն աճելի յերկար են և ծածկում են յերկրորդ գույզ թևերը։



Նկ. 12. Թիթևաի յեղիք

կրծքի քուրք յերեք սեղմնաներն ունեն մեկտեղան զույգ զուաներ, վորանք կազմված են հետևյալ մասերից՝ կռնքից, վերալույսայից (կռնքի հաջորդ մասը), սղղրից, սրունքից և հինդ հոդանի թաթից:

Վերովայնը ըստկացած և 9 սեղմնաներից, Ֆրու. թիթևոյ վերջավորությանը զգված և վեր և վերջնում և բաթ մայքով: Եղիներ վերջնում և կլարածն: Եղ թիթևոներն ավելի խոշոր են



Նկ. 15. Ֆրու. թիթևոյ ցերին կառուցվածքը. 1—պարկանման հավելված (փայլիկ). 2—ալիքի միջին մասը, 3—ալիքի նեղին մասը, 4—կռնակի արշամատար տնարը, 5—կռնին սեռական օրգանները, 6—կենտրոնական նյարդային սիտանդ:

և հաստ: Բեղիկները նման են արվի բեղիկներին, բայց անհամեմատ կարճ են, քիչ ավելի մուգ դույնի, դեղի տառջ ցցված և,



Նկ. 14. Եղ քիթեայ ցերին կառուցվածքը. 1—պարկանման հավելված (փայլիկ). 2—ալիքի միջին մասը, 3—ալիքի նեղին մասը, 4—կռնակի արշամատար տնարը, 5—կռնին սեռական օրգանները, 6—կենտրոնական նյարդային սիտանդ:

վոր գլխավորն և, հոգին ավելի դանդաղաշարժ են: Արտները պահում են իրենց բեղիկներն ամուր և սեղմված վիճակում:

Նրանք ափսոսելի չարժանիք են մանավանդ այն դեպքում, յիշելով փնտրում են հզին. թևերը վեր են պահում և անընդհատ թրթվաացնում են՝ բարձրացնելով ժորոշ ձայն:

Մոշոր փոխախառն թռչուններ են առաջ դալիս ներքին դարձարաններում: Միտաքանի առարկաները բախրողին վերանում են: Վարդ ժամանակ յ՛դան ստամոքսային խողովակը դառնում և նուրբ, ժողորուն մի խողովակ, վարի հետին մասը միայն լինում և ցիլ լայնացած:

Բերանից անմիջապես սկսվում և կերակրափողը, ժորն ընկնում և մինչև կրծքի շրջանը և իրենից ներկայացնում և մի շատ նուրբ խողովակ:

Կերակրափողը կրծքի շրջանի վերին մասում ներկայացնում և պարկանման մի հաղելված (փուչիկ), ժորը մինչև բոժոժից թիթեռի գուրս գալը լցված եր ալկալի հեղուկով, իսկ գուրս դարձել հետո այդ հեղուկի փոխարեն լցվում և ոգով, և դա կոչվում և ոգայալի:

Կերակրափողից անմիջապես սկսվում և փոքրիկ ստամոքսը: Սա համապատասխանում և ժորդի միջնադիքին: Միջին աղիքից



Պ. 15. Թիթեռների արտաքին տեսքը. 1—կռ, 2—արու:

սկսվում և հետնաղիքը, իսկ արս առջևի մասում ընկնում են մալդիկյան անոթները: Վերջնադիքն իրենից ներկայացնում և բարակ և յերկար մի անոթ, ժորը վերջանում և պարկով:

Մալդիկյան անոթները նույն ճանաչվածքում են լինում, ժորքան վարդի մեջ: Ենչառության գործարանները նույնպես կողմված են արախեյաններից: Արյան շրջանառությունը կատարվում և ուժեղ: Արտան հյուղավորվում և՛ օռնալացնելով սորսային հաղելվածներ, ժորոնք ուղղված են դեպի բեղիկներն ու աչքերը:

Թիթեռի մկանային սխեմին ափսոսելի դարձացած և, ջան ժորդինը, մանավանդ կրծքի մկանները, ժորոնք անմիջապես ուղղված են դեպի վտաններն ու թևերը:

Վարդի աչքերը համարյա չեն տեսնոււմ, այնինչ թիթեռի բարձր աչքերը համարվում են դէրի ամենազգեստութեամբ մասերից մեկը։ Նայելը կարելի չէ տեսնել ընկերի նկատմամբ։ Հստակ թռչուն աչքերը պարզված չեն, բայց զորովհետեւ զուգահեռման ժամանակ թիթեռը թռչափայտի վրայ ձայն է հանում, կարելի չէ յենթադրել, զոր նրանք լսում են։

14. ԹԻՔԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐԸ

Եզի սեռական գործարանը բաղկացած է ութ յերկար ձվաձուր խողովակներից։ Մրանք ընկած են մարմնի յուրաքանչյուր կողմում չորսական հաստ։ Ամեն մի ձվաձուր խողովակ բաղկացած է յերկու մասից, այն է՝



Նկ. 16. Եզի սեռական օրգանները.

- 1—ձվաբանների վերջավերսյունները,
- 2—ձվաբան, 3—ձվաձուր խողովակ, 4—զուգահեռման ստորակ, 5—սերմնընկալի տարան, 6—լորձ արտադրող գեղձեր, 7—զուգահեռման սնցք, 8—ձվաձուր խողովակի սնցքը։

տառջին ձվաձուր խողովակից և յերկրորդ նվազանից, ուր լցված են գեղձ հաստեացած ձվերի մնացորդները։ Մարմնի յերկու կողմից դնացող բնդհանուր ձվաձուր խողովակները մարմնի միջին մասում միանում և կաղժում են մի խողովակ, զորն իր հերթին արտաքին տեսքով բացվում է սեռական գործարանի տառքիկ մասում։ Այդ տեսքի միջով թիթեռը դնում է իր ձվերը։ Վաչ գույշ խողովակի միջին մասում բացվում են՝ զուգահեռման տառքակի, սերմնընկալի տարանի լորձ արտադրող գեղձերի խողովակները։

Արվի սեռական գործարանը բաղկացած է յերկու սերմնարանից, զորանցից զուրա են գալիս հասունատար խողովակները։ Հասունատար խողովակները գալիս և ընկնում են սերմնային փամփուլակից։ Սերմնային փամփուլատիկն տառջի կողմից ընդունում

և՛ իւր մեջ լրացուցիչ զեղծերի դուշդ խողովակները: Սերմնափած-
փուլափելից դուրս են գալիս մի դուշդ սերմնատար խողովակներ,
վորանք միանալով՝ կազմում են մի խողովակ և բացվում են ար-
տաքին սեռական գործարանում: Արտաքին սեռական դործարա-
նը արտաքինից պատած և
ամուր խիտինով, վորի մի-
ջոցով զուգավորման ժա-
մանակ սերմը ներս և անց-
նում և լցնում եղի դու-
շակցական առարակը:

Յեթև հեռերից դիտելու
լինենք եղի զուգակցական
առարակը, կանոնենք, վոր
նրա հետանցքի բլրակների
վրա կան բազմական յեր-
կար մազիկներ: Այդ բլրակ-
ների վրա գտնվում և նրա
արտաքին սեռական գոր-
ծարանը, վորից դուրս կն
դալիս նրա մեջ կուտակված
նվերը:

Արվի մոտ նույն բլրակ-
ներն ունեն ալլ նև: Նրանք
ներկայացնում են յերկ-
փեղկանի դանակներ, վորից
մեկը փոքր և և ընկած և
վերևից, մյուսն ավելի մեծ
և և յուր ծայրով դրկում և
առաջինին: Յերկու փեղ-
կերն ել կազմված են հատ
և ամուր խիտինից: Վերին
և ներքին փեղկերի արան-
քում գտնվում և հետանցքը:

Արվի սեռական բլրակներն վրա կան հատուկ կարթեր, վորան-
ցով զուգավորման ժամանակ բռնում և եղին: Ընդհանրապես
արևն իւր այդ կարթերը բացված ունեկիքի նման պահում և
պատրաստ վիճակում:



Նկ. 17. Արվի սեռական գործարանները.

1—նոր արտաքին գնդեր, 2—սերմնափած-
փուլա, 3—սերմնարան, 4—սերմնատար խ-
ղովակ, 5—կազալյատով (զուգավորման) ար-
գան, 6—զուգավորման կարթեր:

Եղ թիթեանը բաժանից դուրս գալուց հետո Թեոսն և Նույնը բաժանի վրա տնջարժ, հարձեռ իրեն հաղթի՝ պանելիս լինի նրա վրա: Յերբննն նա իր ընդիկները շարժում և այս ու այն կողմ և մի քանի տնդամ թափահարում իր թևերը: Դա նշանն է, վաթ նա ևս զրդովում և Այդ զրդիները հասկապես առաջ են գալիս այն դեպքում, յերբ յերկար ժամանակ եղին պահում են առանձնացրած դրաթյան մեջ:

Արուն բաժանից դուրս գալու ժամանակ շարունակ աշխատում և ժամանակ եղին և դրա համար ել արագ շարժումներ և

կատարում և բարձրացնում վարդ ձայն: Դանելով եղին՝ սկսում և արագ պտույտներ կատարել նրա շուրջը, սպա կարթնրով բռնելով նրան՝ տեղի յև ունենում դուզավորումը:

Կարթները յերկու նշանակալթյուն ունեն. նախ՝ զբանց միջոցով զրդում և եղի սեռական գործարանը և յերկրորդ՝ դուզավորման ժամանակ զբանցով բռնում և եղին:

Յեթև վարի կողմից տնդամահատեննը արու թիթեաը և հանենք նրա բոլոր գործարանները, դժվար է լինի տեսնել նրա մեջքի կողմում յերկու յերկա-մուռնցածն դեղին մարմնիկներ. դրանք լինում են հենց

Նկ. 18. Թիթեաների արտաին սեռական որգաններ. 1 յեղ 3—փորիկի հետին մասը յեղ եղի սեռական որգանները, ա—սեռական առաջներ, է—սեռական գործարանի բրակներ, բ—հետամեջ, լ—ծվառար խոզովակի անցք, ս—զուգավորման անցք: 2 յեղ 4—փորիկի հետին մասը յեղ արու թիթեի սեռական որգանները, ա—զուգավորման կարբիք, է—կապույտակ որգան, բ—հետամեջ:

այն տեղում, վարտեղ դառնվում եյին վարդի սեռական գործարանները, բայց միայն այն տարբերությամբ, վար թիթեանիկի մեջ սերմնարաններն ավելի քան մեծ են:

Յեթև վերցնենք թիթեի սերմնարանը և տեղի ծայրով պատահնք, Դրանից դուրս կգա սպիտակ կաթնագույն հեղուկ, վարը միկրոսկոպի տակ մեծացնելով՝ կարելի յև տեսնել վորդանման մարմնիկներ: Դրանք վաղ այլ ինչ են, յեթև վաղ մի-մի

թելիկ, վորոնք միանալով կազմում են սերմնային փնջիկներ (սերմնային թելիկները կոչվում են սպերմատոգոն)։

Սերմնային փնջիկները հետ միասին կանանկնք և ազատ վիճակում առանձին սպերմատոգոններու Յուրաքանչյուր սպերմատոգոնի ծայրը լինում և հաստ, միեւնույն ժամանակ փայլող։



Նկ. 19. Ջուզավորվող բիրեաներ

Սպերմատոգոնի իրենից ներկայացնում և մի ընթիվ, վորի կորիզը գտնվում և նրա թելի դիւրին։

Թիթեռի զուգավորման ժամանակ սպերմատոգոնի տը անցնում և ձվի այն անցքով, վորը կոչվում և միկրոպիլի։

Ջուզավորման ժամանակ արուի սերմն անցնում և փուչիկով վերջացած եգի նեղ անցքով։ Այնտեղից ավելի նեղ անցքով սերմն անցնում և անզույգ խողովակը, վորտեղից ավելի ու ավելի նեղ խողովակով անցնում և կորածն պարկը, վոր կոչվում և սերմնընդունարան։

Սերմնընդունարանն իրենից ներկայացնում և մի պարկ, վորտեղ պարունակվում են արուի սպերմատոգոնները մինչև եգի ձու անցը։ Սպերմատոգոններն եգի սերմնընդունարանում կարող են պահել իրենց գոյությունը կենդանի վիճակում առնվազն չորս օր։ Սա ապացուցվում և նրանով, վոր եգը կարողանում և անել բեղմնավորված ձու նույնիսկ զուգավորումից չաբա օր հետո։

Յեթի բեղմնավորված եղ թիթեռին պահենք տասը աստի-
ճանում Յելսիուսով (դա նվազ ջերմաստիճանն է թիթեռի հա-
մար), այդ զեպքում սպերմատոզոիտները կարող են պահել իրենց
գոյությունը 9—10 օր:

Յերբ սկսվում է ձառ. դնելու պրոցեսը: դրենան անցնելով
ձվասար խողովակով՝ ճնշում է նրա պատերը: դրա ազդեցությամբ
տակ սերմնը նուստանից դուրս են դալիս սպերմատոզոիտները
և հանդիպում անցնող ձվերին: Այն ժամանակ, յերբ ձուռն անց-
նում է սերմնը նուստանի անցքի մոտից, մեկ կամ մի քանի
սպերմատոզոիտներ մտնում են ձվի միկրոպիլյար անցքից ձվի
ներսը և բեղմնավորում այն:

Նշված բոլոր պրոցեսները՝ զուգավորումը, սերմնային հե-
ղուկի ելի սեռական օրգան մտնելը, սպերմատոզոիտների շարժ-
վելը, նրանց մտնելը ձվի մեջ, իրենից ներկայացնում են միայն
դրենայի բեղմնավորման նախապատրաստման գործողություն-
ները:

Սպերմատոզոիտը ձվի մեջ մտնելուց հետո՝ մինչ այդ դար-
գացման ընդունակությունը հանեցող դրենան սկսում է զարդա-
նալ՝ կազմելով նոր խճուղային օրգանիզմ: Բեղմնավորումն
այն է, վեր ձվի մեջ անցած սպերմատոզոիտի կորիզը ձուլվում
է ձվային բջջի կորիզի հետ, դառնում է մեկ կորիզ, վերից հետո
սկսվում է սաղմի կազմակերպումը: Սպերմատոզոիտի առչիկը
բեղմնավորման չի մասնակցում. նա ծծվում է ձվային բջջի պրո-
տոպլազմայի մեջ: Յեթի ձվի մեջ մտնում են մի քանի սպերմա-
տոզոիտներ, այնուամենայնիվ բեղմնավորմանը մասնակցում է
դրանցից միայն մեկը — մնացածները կամ ծծվում են պրոտո-
պլազմայի մեջ և կամ հետագայում սաղմի հատուկ բջիջներ
կազմից կլանվում են:

Մի ձվի բեղմնավորման համար բավական է մի սպերմա-
տոզոիտ. հետևաբար զուգավորման ժամանակ արուի կազմից ելի
մարմնի մեջ անցած 20,000,000 սպերմատոզոիտներից ողորդում-
վում են միայն 400—800 հատը. իսկ մնացորդները վռնչանում
են: Չնայած սպերմատոզոիտների այս քանակին, այնուամենայ-
նիվ միջին հաշվով յուրաքանչյուր անգամ ածած ձվերի մոտ 0,5
տոկոսը մնում է չբեղմնավորված: Զբեղմնավորված ձվեր պատա-
հում են ինչպես առաջին հերթին ածածների մեջ, այնպես էլ
միջին և վերջին ածածներում, հետևաբար ճիշտ չի լինի ասել,
վոր վորոշ քանակությամբ ձվերի չբեղմնավորված լինելն սպեր-

մատուցողներին պահապանելու և Ավիլի շուրջ գրապահարան
այն և վեր բեղմնավորման պրոցեսում տարբեր պատահականու-
թյուններից սպեկուլյացիան չի հաջողվում մտնել ձգի մեջ:

Ամբողջ ածած ձվերի կամ մեծ մասի չբեղմնավորված լի-
նեյու պատճառները հարող են լինել հետևյալները:

1. Արուի մեջ սպեկուլյացիան բարձրվել է չլինելու կամ
քիչ լինելու հետևանքով:

2. Սպեկուլյացիաների զանգաշում ությունը և միկրոպի-
լան անցքից ներս ժամելու ընդունակությունը:

3. Միկրոպիլի անցքի աննորմալ կառուցվածքը, վերի պատ-
ճառով անհնարին և լինում սպեկուլյացիան նրա մեջ անց-
նելու:

4. Արուի և եղի արտաքին սեռական ապարատների անկա-
նան կառուցվածքից:

Դրենայի չբեղմնավորման պատճառն ինչ ևլ վեր լինի, գրե-



Նկ. 20. Չու դեղ քիբու

նախի ախտառանքներում պետք և վոչնչացնել կիսաբեղմնավոր-
ված ածվածքները, վերադարձի չբեղմնացնող սեռական աննոր-
մալ օրգաններով թիթեռները:

Առողջ թիթեռնը սերմն ածում է արագությամբ և կանոնա-
վոր՝ իրար կողքի ինչո՞ւ շարված։ Պատահում են և ցիւր ու ցան
վիճակում ածած ձվաներ։

Թիթեռի ածած սերմն անմիջապես կաշում և այն առար-
կային, վորի վրա նա ընկնում է. դա նրանից է, վոր՝ եզի ար-
տաքին սեռական անցքի մոտ գտնվում է կաշուն նյութ արտա-
դրող գեղձեր։ Սերմն անցնելով այդ գեղձերի մոտով՝ թաթախ-
վում է կաշուն նյութի մեջ, վորի հետեանքով էլ ունենում է
կաշկռու հատկութուն։ Սակայն կան և այնպիսի ցեղի թիթեռ-
ներ, վորոնց ածած ձվերն այդ կաշուն հատկութունը չունեն։
Չնայած դրանք նույն գեղձերն ունեն, բայց կաշուն նյութ չեն
արտադրում։ Այդ ցեղիցն է Բադգաստի տեսակը։

15. ԹԻԹԵՐԻ ԿՅՈՒՆԻՆ ՈՒ ՄԱԼԸ

Թիթեռը դուրսվորվելուց և ձուն դնելուց հետո մի քանի
որ ևս ապրում է, վորից հետո մահանում և Հիվանդոտ և թռչ
թիթեռները բաժանից դուրս գալուց հետո մահանում են նույն-
իսկ նույն օրը։ Առողջ թիթեռները 25⁰ Ց. ջերմության մեջ պեռք
և ապրեն 10 սրից վո՞չ պակաս, նույնիսկ մի քանիսն ապրում
են ամսից ավելի։

Բադգաստի տեսակի թիթեռները՝ միջին հաշվով արունները՝
ապրում են 10-ը, իսկ եզերը տասներկու. որը կյանքի ամենա-
կարճ ժամանակաշրջանը տևում է 3, իսկ յերկարը՝ տասնութ
օր։ Միջին հաշվով եղն արուից 24 ժամ ավելի չե ապրում։

Վասն սնված թիթեռները լավ սնվածներից ավելի քիչ են
ապրում, բայց ընդհանրապես սննդի նշանակութունը կյանքի
անադաթյան նկատմամբ այնքան էլ նշանակալից չէ. ավյալ գեղ-
քում հիվանդութունն ավելի մեծ նշանակութուն ունի։

Ջրաձգությամբ մահացած թիթեռների ստամոքսում Մեչ-
նիկովը (1915 թիվ) միշտ էլ գտել է բակտերիաներ։ Սրանից
կարելի չի յեղրակացնել, վոր Ջրաձգությամբ առաջացած մահը
հիվանդության հետեանք է, վորովհետև հիվանդացած որգանիդ-
մում միշտ էլ յերևում են հիվանդութուն առաջացնող բակտե-
րիաներ։

Հասունանալուց առաջ նորմալ և առողջ թիթեռների թե որ-
դանիվում և թե հյուսվածքներում վոչ մի բակտերիա չի նկատ-
վում, հետեաբար առողջ թիթեռների մահանալը չի կարելի վե-
րագրել բակտերիաներին։ Թիթեռը չի սնվում։ Նա ապրում է իր

մարմնում կուտակված սննդարար նյութերով: Թիթեոն իր առանձնակույնը որում կորցնում և քաշի կեսը: Կարելի չէ յենթադրել, Վոր իր մարմնի մեջ կուտակված նյութերի պակասելու հետևանքով և տեղի ունենում մահը, բայց թիթեոն մահանալուց հետո նրա մարմնի մեջ մնացած նյութերն այնքան են լինում, Վոր կարող եր ապահովել նրա կյանքը մի քանի շաբաթ եւ: Այստեղից յեղրակացնում ենք, Վոր մահը տեղի չէ ունենում Վոչ թե սննդի պակասությունից, այլ բոլորովին այլ պատճառներից:

Ըստ Մեշնիկովի թիթեոն մահանում և նրա մեջ գտնված քայքայվող նյութերի ինքնաթուղամորումից: Թիթեոն կույր պարկի մեջ կուտակվող մեղը թուճավոր և: Յեթե այդ հեղուկը սրսկենք առողջ Վորդին, 0,12—0,25 խորանարդ սանտիմետր, նրանք անզգա չեն դառնում: Բայց մի քանի որից հետո նրանք նորից կաղգուելում են, հյուսում բոժոժ և տալիս առողջ թիթեո: Թիթեոն մեղը թուճավորող աղղեցություն և թողնում նույնպես մկների վրա:

Այսպիսով թիթեոն մահը տեղի չէ ունենում Վոչ թե հիվանդությունից, նյութերի պակասելուց և ձերությունից, այլ հյուսվածքները ապիտակուցային մասի քայքայումից, ինքնաթուղամորման միջոցով:

Ըստ Մեշնիկովի՝ թիթեոն մահանում և բնական մահով:

ԳԼՈՒԽ 3-Ի

ԳՐԵՆԱ

1. ԳՐԵՆԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Գրենա տնունն տաջացել և ֆեոստերեն graine բառից՝ վոր նշանակում և սերմ, տվյալ գեղքում՝ շերամի թիթեռի հուն-
դը, վորն, ինչպես արդեն ասացինք, դնում և շերամի թիթեռը
Գրենան վոսպանե մի մարմնիկ և Յեթն կողքից նայելու լի-
նենք, կտեսնենք, վոր մեջտեղում յերկու կողքից քիչ սեղմված և
նոր ածած գրենայի յերկու կողքերն ալելի քիչ են սեղմված,
բայց ջրի գոլորշիացման և ածխածխի արտաշնչման հետևա-
քով, նրա ծավալը հետզհետե փոքրանում և, և կողքերն ալելի
սեղմվելով՝ աստանում են յերկգոգանի մե:

Գրենայի ծավալը վորոշ չափով կախված և տարբեր պայ-
մաններից, բայց կարելի չն ընդունել, վոր միջին հաշվով յեր-
կարաթյան դիամետրը հավասար և 1,4 միլիմետրի, իսկ լայ-
նության դիամետրը՝ 1,1 միլիմետրի:

Գրենայի գույնն՝ ըստ նրա զարգացման՝ փոփոխվում և:
Ինչպես արդեն ասված և, նոր ածած մուն ունենում և հարդա-
ղեղնավուն գույն. մուն ածելուց 3—3 որ հետո՝ գույնը հեղդ-
հետե փոխվելով՝ սպիտակ ցեղերում մեծ մասամբ դառնում և
մոխրա-մանուշակագույն: Զրնգմնավորված գրենան միշտ ել սահ-
պանում և իր հարդաղեղնավուն գույնը:

Մեկ հատ գրենայի քաշը փոփոխման և յենթարկվում ըստ
շերամի ցեղերի: Միջին հաշվով նրա քաշը հավասար և $\frac{2}{10}$ միլի-
գրամի, կամ այլ կերպ ասված՝ մեկ գրամ գրենան իր մեջ պա-
րունակում և 1500 հատ մա, իսկ մեկ տուփը՝ 25 գրամ, 37500
հատ:

Գրենայի միջին տեսակաբար կլիաը հավասար և 1,08-ի,
այսինքն՝ գրենան ջրից քիչ ծանր և և խորասուզվում և ջրի մեջ:

Զրեղմնավորված և չորացած դրենան ջրից թեթև և և ջրի մեջ իջեցնելիս բարձրանում և նրա մակերեսը Այդ պատճառով դրենան լվանալու մամանակ բեղմնավորվածներն անջատվում են չրեղմնավորվածներից:

Դրենան արտաքինից ծածկված և կարծր պայանով—կեղևով, վորի վրա միկրոսկոպով նայելիս՝ հեշտությամբ կտրելի յն առերեսիլ բազմանկյունանի նշաններ:

Դրենայի սրածայր մասում կա վարդանման մի նախ՝ բաղկացած յերկու շարք բաղմանկյուններից, վորոնք համակենտրոնակաճ ձևով դասավորված են փոքր խորշի շուրջը: Այդ խորշն իրենից ներկայացնում և միկրոսկոպ ապարատի արտաքին անցքը (միկրոպիլը): Միկրոպիլար ապարատը կազմված և ձվի կեղևի մեջ դանդաղ անցքերի սխտեմից: Այդ նույն անցքերով սպերմատոզոսն անցնում և ձվի ներսը և բեղմնավորում նրան: Թիթեռը ձուն անելուց հետո՝ միկրոպիլը փակվում և սպե՛լմատիկ նյութով: Դրենայի կեղևի տակից միկրոպիլյան անցքն սկըսում և յեռանկյան ձևով լայնանալ: Այդ յեռանկյան յերեք անկյուններից ռադիալ ուղղությամբ անցնում են նեղ խողովակներ: Այդ խողովակները վարդանման նախշի սահմանն անցնելուց հետո՝ փոխում են իրենց ուղղությունը դեպի միկրոպիլի կենտրոնը, ծակում են կեղևի ներքին մասը և դուրս են գալիս ձվի խոռոչը՝ վարպես յերեք ավելի լայն խողովակներ:

Նման բարակ և կեռ անցքեր ու խողովակներ ունեցող միկրոպիլը կամ բոլորովին դժվարացնում կամ նույնիսկ անհնարին և դարձնում զանազան ինֆեկցիոն բակտերիաների, նույն թվում և պերրինայի բացիլի դրենայի ներսը մտնելը, բայց բարակ սպերմատոզոսի ներս մտնելը վոչ մի արգելքի չի հանդիպում:

Բացի միկրոպիլյան անցքից՝ դրենայի ամբողջ մակերեսը պատած և բաղմաթիվ ողանցքերով: Ողանցքերն արտաքինից ավելի լայն են, իսկ դրենայի ներսում քոնի դնում բարականում են: Ողատաը անցքերի դերն իրենց անունից արդեն պարզ և: Դրանց միջոցով դրենան շնչում և: Գազերը չափազանց դժվար են անցնում ողանցքերով:

Դրենայի կեղևը խիտինային նյութից՝ չի կազմված, նրա կեղևն ունի խիտակաճ բոլորովին այլ բաղադրություն և պատկանում և սպիտակուցային միացություններին, վորը կոչվում և խորիոնին:

Կեղեի տակը կա շատ բարակ վռայլուն թաղանթ, վորը կոչվում է գեղնուցային պատյան:

Նոր ածած ձվի մեջ գեղնուցային պատյանի ներսի կողմից կապած է լինում գեղնուցը, վորն իր մեջ պարունակում է սննդաբար նյութեր: Զմեռող գրենայի մեջ գեղնուցի մակերեսում է գեղնուցային պատյանի տակը գտնվում է լրիվ ձևավորված սաղմի արտաքին պատյանը, վորը կոչվում է սիրողային պատյան կամ սիրողա: Այս պատյանի մեջ գտնվում են պիգմենտի չափազանց մանր հատիկներ, վորոնցից կախված է ձվի գույնը:

Սերողային պատյանը կաղմակերպվում է ձուռն անելուց 2—3 օրվա ընթացքում: Այդ ժամանակաշրջանում նրա մեջ գոյանում է պիգմենտը, վորի պատճառով ել գրենան հարգա-գեղնավուն դույնից աստիճանաբար դառնում է մոխրա-մանուշակագույն:

Սերողային պատյանը սահմանափակող տարածությունը լցվում է սպիտակուցով, վորն իր մեջ պարունակում է մեծ քանակությամբ սննդաբար նյութեր, այսինքն՝ սպիտակուցային հատիկներ, ճարպային դնդիկներ, գլիկոլեն և կենդանական ծագում ունեցող սալային նյութեր:

Այս գեղնուցում սերողային պատյանից վաղ տյնքան խորը, միկրոպիլի հակադիր կողմում գտնվում է սաղմը, վորն՝ բոսյերկարության ազնվածն է: Ըստ յերկարության ունենում է տասնութ սեղմումներ: Վորոնցից առաջինը զլխի մասն է, իսկ վերջինը պոչի (այդ սեղմումների միջև ընկած սաղմի մասը նույնպես անվանում են սեղմենտ):

Սաղմային զլխի սեղմենտը, վորը համապատասխանում է ապագա վորդի զլխին, լայնացած է և նման է յերկու թիակներին: Սաղմն իր վորովայնի կողմով ուղղված է դեպի սերողային պատյանը: Այս կողմում սաղմը ծածկված է յերկրորդ սաղմային պատյանով, վորը կոչվում է ամնիոն: Ամնիոնը պատում է սաղմը: Ամնիոնի և սաղմային դիսկի մեջ մնում է մի անցք, այնպես վոր այս մասով սաղմը կապված է իրեն սնուցող գեղնուցի հետ:

Վերոհիշյալից պարզվում է, վոր ձմեռող գրենայի սաղմը շրջապատված է կրկնակի սաղմային պատյանով և ընկած է գեղնուցի մեջ: Այս դրությունը պահպանում է սաղմին մեխանիկական ցնցումներից, շարժուց և ընդանրապես արտաքին ազդեցություններից: Գրենային գույն տվող սերողյան պատյանի պիգմենտը միաժամանակ պաշտպանում է սաղմը լույսի տղեցությունից:

Ինչպես արդեն ասված է, նոր ամած գրեհան ունենում է հարգադեղնավուն գույն: Թիթեռի ձու անկուռ 12 ժամ հետո նրա ամբողջ մակերևույթը դեղնուցային պատյանի տակ կապտակերպվում է սաղմային թերթիկը, այսպես կոչված քլամատդերման Դրենից 4—5 ժամ հետո բլաստոդերմայում սկսում է առանձնանալ սաղմային շրջանակը՝ (зародышный диск) նման բլաստոդերմայի հաստացած դիս Բլաստոդերմայի մեջցած մասն անհամեմատ բարականում է: Դրանից հետո սաղմային շրջանակը սկսում է անջատվել և խլնում և դեղնուցի մեջը: Սաղմն իջնելուց հետո բլաստոդերման միանում է և այդ ժամանակվանից արդեն բլաստոդերման անխնայվում է սերտալ: Առաջին 24 ժամվա ընթացքում նշված դարձուկվումն արդեն ավարտվում է: 12 ժամ հետո արդեն գոյանում է յերկրորդ սաղմային պատյանը, վորը գլխավորապես արտաքին կողմից շրջապատում է սաղմային շրջանակը: Այս պատյանը, ինչպես արդեն ասված է, կոչվում է ամնիոն: Արանով ավարտվում է ձվի սփռան զարգացումը: Դրենայի այսպիսի արագ դարգացումից հետո՝ անցնում է նրա բավականին յերկար հանգստի շրջանը: Այս ժամանակաշրջանը կոչվում է դիապաուզա, վորի ժամանակ գրեհայում վաճի փոփոխություն չի կատարվում:

Սերոզային պատյանի գոյանալուց հետո սկսում է մտնել պիլոմենտի հատիկների առանձնանալը, վորի շնորհիվ, ինչպես արդեն ասված է, փոփոխվում է գրենայի գույնը: Նոր ամած գրենայի դեղին գույնը գոյանում է նրա մեջ յեղած դեղնուցի գույնից: Սերոզային պատյանից գոյացած պիլոմենտի հատիկներն սկսում են ծածկել դեղնուցի գույնը: Սկզբում պիլոմենտի հատիկները թիչ են լինում և ներկված են կարմիր գույնով: այդ իսկ պատճառով այդ ժամանակ գրենան լինում է նարնջագույն: Հետագայում պիլոմենտի հատիկների քանակն ավելանում է, գույնը դառնում է մուգ, այդ իսկ պատճառով գրենան ստանում է իր վերջնական մոխրա-մանուշակավուն գույնը: Դրենայի պատյանն անգույն է, յերբեմն ունենում է նույնպես քաղ-կանաչավուն գույն: Դրենան իր վերջնական գույնն ստանում է զարգացման յերկրորդ որը:

Հաճախ գրենայի զարգացումը և սերոզային պատյանում պիլոմենտների գոյանալը միաժամանակ չի կատարվում, քո գլխավորապես նկատվում է թիվուրեն ցեղերում, այն ել առանձնապես յերկրորդ սերնդում, յերբ սաղմն առանց ընդմիջման, շա-

բուհակ դարգանում և ինժուարին տեսակները մի ասարվա ընթաց-
քում ասարիս են յերկու տնգամ բերք: Մոնոպոլարին ցեղերում
յերբեմն գրենայի կեղևում ողանցքերի նեղ և խիլ լինելու հետե-
վանքով շնչառությանն աղելի դանդաղ և անելի առննում և
պիղմենտներ զայանալը դանդաղում և նայն պատետով, բացի
վերահիշյալից, այլ յերեսլիքը կարող և լինել և ընժուարին ցե-
ղերում:

Յերբեմն նկատվում և և հակառակ յերեսլիք, այն և՛ չրեղմ-
նավորված գրենայի դույնը մոխրվում և Այս դեպքում շնայած
վար մնացել և չրեղմնավորված, բայց նրա մեջ անդի յն առնե-
նում չրեղմնավորված դարգացում կամ այսպես կոչված պարե-
նոգեմեզիս: Այսպիսի դեպքում մեծ մասամբ դարգացման հենց
սկզբի տառիճանում դարգացումը կանգ և առնում: Յեթի նոր
ածած ձուռ խոզանակով շփենք, թթաներով վերամշակենք կամ
դենեք երկարակյան կայներ յաղդեցության տակ, այս դեպքում
չրեղմնավորված ձվերի դարգացման տեղան աղելանում և Միայն
բացառիկ դեպքում չրեղմնավորված գրենայից ստացվում են
միանգամայն նորմալ կենսունակ վարդեր:

2. ԱՐԼԵՍՏԱԿԱՆ ՁԵՎՈՎ, ԳՐԵՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻՑ ՇՈՒՏ ԱՐԹՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Շերամի վարդ ցեղերում, այսպես կոչված ընժուարին ցեղե-
րում, յերբ առաջին սերնդի թիթեքը ձուռ ածում և, առանց ընդ-
միջման՝ ձուռ սկսում և դարգանալ և 8—12 որից սկսում են
գուրս գալ յերկրորդ սերնդի վարդերը: Յերկրորդ սերնդի ձուռ
արդեն սկսում և դարգանալ ընդհատումներով—գեղատուգայով և
ձմեռում և: Գոյությունն ունեն նույնպես պոլիվորարին, առերին
մի քանի, մինչև 6—8 անգամ բերք տվող տեսակներ. սրանց
մաս գրենան առանց ընդհատումների դարգանում և:

Բայց շնայած դրան՝ ինչպես մոնոպոլարին (առերին մեկ ան-
գամ բերք տվող տեսակներ) ցեղերում, նույնպես ընժուարինի
յերկրորդ և պոլիվորարինի վերջին սերնդում կարելի չն ստեղծել
գրենայի տնընդհատ դարգացում, յեթի գրենան յենթարկելու
լինենք մի քանի դրդախի նյութերի ազդեցության:

Մոնոպոլարին ցեղերի գրենան ժամանակից չուս արթնաց-
նելու համար կան մի քանի միջոցներ՝

1. Նոր ածած գրենան խոզանակով շփելուց 98—99⁰/₁₀₀ արթ-

նախամ և: Շփերու ակողությունը չի կարելի հշտությամբ ցույց տալ, զորովհետեւ այդ կախված է շփելու արագությանից: Բայց այնուամենայնիվ կարելի յե տանել, զոր 5—8 րոպե շփելը միանգամայն բաղնական և քողանակի ինչ նյութից պատրաստված լինելը նշանակությունն է: Եւ այնպիսի յերբեմն նոր ածած ձուռն ջրի մեջ մատենելով շփելուց հետո 8—13 րրից արթնանում և: Այն գետնում, յերբ գրեհան արդեն իր դույնը փոխած և լինում և ստացած մոխրա-մանուշակագույն, շփելուց հադիվ արթնանում և մի քանի տոկոսը: Արթնացումը միաժամանակ չի կատարվում, այլ անում և 15—33 րր և նույնիսկ ավելի:

2. Երկարակամ կայծերի ազդեցության տակ նոր ածած գրեհան նույն արդյունքն և տալիս, ինչ զոր չփման մամանակ: Երկարակամ կայծերի ազդեցության ամենալավ մամանակամիջոցում ստացվում և 100% -ով արթնացում: Հաճախ երկարակամ կայծերի ազդեցությամբ արթնացած զորդերը կարճրավուն են լինում, այսինքն՝ աւնենում են նույն գույնը, ինչպես զոր ինկուբացիայի մամանակ բարձր ջերմատեղեանի տակ արթնացած զորդերը:

3. Գրեհան աղաթթվի, ծծմբաթթվի և այլ թթուների մեջ պահելիս՝ տալիս և լավ արդյունք: Առանձնապես լավ արդյունք և տալիս աղաթթուն, ապա ծծմբաթթուն, աղոտաթթուն, քաջաթթու, գինիթթուն և այլն:

4. Գրեհան մի քանի վայրկյան 80—85° Ց. ջերմություն ունեցող սղուս կամ մեկ րոպե 60° -ում պահելուց տալիս և 20—30 տոկոս արթնացում:

5. Գրեհան հերթականությամբ, մոտ տասն անգամ սառը և տաք ջրի մեջ իջեցնելուց յերբեմն տալիս և 100 տոկոսով արթնացում: Ցնքե գրեհան մի քանի վայրկյան պահենք յետագրած ջրի ազդեցության տակ, այնպես զոր չխաչվեն, մի քանի րրից կարթնանան:

6. 2—5 րր գրեհան ռդի 3—4 ատոսաֆերային ճնշման տակ պահելուց 40—45% արթնանում և:

Վերոհիշյալ բոլոր ձևերից ամենաընդունվածը և նպատակաւորը թթուների միջոցով արթնացնելն և:

Անվան խորհուրդ և տալիս նոր ածած և դեռ դույնը չփոխած գրեհան 12—15 րոպե պահել 30° Ց. ջերմություն ունեցող աղաթթվի և ջրի խառնուրդի մեջ: Պետք է վերջել 2 մաս 1,19 տեսակարար կշիռ ունեցող աղաթթու և մեկ մասը ջուր: Գրե-

նան հիշված խառնուրդի մեջ իջեցնելուց հետո՝ պետք է մաքուր լըրում խնամքով լվանալ և սալիքում շորացնել:

Տարբեր ցեղերի համար ազաթթվի մեջ պահելու ժամանակավորը ասորերը և Միջին Ասիայում կառավարված փոքների համամայն՝ ավելի բավ արդյունք է ստացվում ազաթթվի նույն բազադրության մեջ 6—8 ընդե պահելիս, վորպեսզի գրենան թթուների սղեցուցությամբ արթնանա, անհրաժեշտ և նախորդ մի վորպե սահմանված ժամանակ պահել թթվի մեջ:

Թիջ պահելու և կամ թթուն թույլ խառնվում ունենալու զնպքում գրենան հանգստի դրությունից չի դուրս գալիս և մնում է քնած դրության մեջ, իսկ, ընդհանրապես, յերկար պահելիս և կամ թթուն բարձր խառնվում ունենալիս՝ աղեցուցությունը շատ անհեղ և մահացուցիչ է լինում: Դրա համար էլ արթնացնելու նպատակով անհրաժեշտ է, վոր թթուն ունենա վորոշ խառնվում և գրենան նրա մեջ պահվի վորոշ ժամանակ: Թե խառնվում է և թե ժամանակի վորոշ տատանումները կարող են կամ մահացնել և կամ պահել միայն քնած դրության մեջ:

Գրենան հիշյալ ձևով թթուներով վերածակնելուց 9—10 որ հետո՝ սկսում են դուրս գալ վորդերը: Արթնանում են նույնիսկ 95 անգամից ավելին: Վորդերը դուրս են գալիս միաժամանակ, լինում են առաջ և հետագայում հիմանդության չնթաքվելու զնպքում կարելի չի ստանալ բավականին բարձր բերք:

Ինչպես ազաթթվով, այնպես էլ այլ միջոցներով գրենան ժամանակից շուտ արթնացնելիս դրական արդյունք է ստացվում այն դեպքում, յերբ գրենան նոր է անած և դույնը չի թուլացել, այսինքն՝ այն ժամանակ, յերբ սղմային շրջանակը դանդաղում է և և՛ մակերեսին մոտ գրենայի վերում: Նկարագրված հատկություններից յեկնելով՝ կազմակերպում են կրկնակի կերակրումներ: Վերջիններս մեծ չափով կազմակերպված են ճարպոնիսյալ, Բաալիսյալ, Վերջին տարիներս կրկնակի կերակրումները մտցված են իմ ԱՄ-ի շերամապահության պրակտիկայում: Հայաստանում նույնպես յնդ էլ են կրկնվող կերակրումների փորձեր, վորոնք դրական արդյունքներ են ավել: Վորպեսզի կրկնվող կերակրումները հիմնական կերակրումների (գարնան) կերի բաղադրի պակասության վրա շանդրադառնան, Հայաստանին, վորպես շերամապահական ցեղացու շրջան, կրկնվող կերակրումների պահն էլ արվում:

3. ԳՐԵՆԱՅԻ ԵՆԶԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ինչպես արգեն սաղմե՜հ, գրենան ծածկված է ոգանցքե-
րով, վորոնց միջից տնցնում է թթվածինը. նույն այդ ոգանց-
քերով դուքս են դալիս անխաթմունքն է Վուրը:

Գրենան կենդանի որդանիզմ է և ինչպես մյուս կենդանի
կյանիները, նա ևս շնչում է թթվածնի պահանջ է զգում: Նա ա-
ռանձնապես ուժեղ է շնչում իր կյանքի առաջին որերին, այ-
սինքն՝ այն ժամանակ, յերբ նրա մեջ տեղի չե ունենում դար-
պացման սկզբնական շրջանը:

Յերբ գրենայի զարգացումը կտնդ է առնում և նա տնց-
նում և հանգստի շրջանը, շնչառության թափն իջնում է, գրե-
նայում հետզհետե սկսում է իջնել թթվածնի ներշնչումը, ան-
խաթմվի արտաշնչումը և միևնույն ժամանակում դեկտեմբեր
ամսին: Ամբողջ նմանությամբ շնչառությունը մնում է
նույն աստիճանում, իսկ զարնան, յերբ դարձյալ սկսվում է գրե-
նայի սաղմի զարգացումը, շնչառությունը զարգանում է:

Այսպիսով գրենայի կյանքը կարելի չե բաժանել յերեք ժա-
մանակաշրջանի, առաջինը՝ ամառն—աշնան (հատիվվացիս), այ-
սինքն՝ թիթեռը մուն տեղուց մինչև այն ժամանակը, յերբ
շնչառությունը հասնում է իր մինիմալ աստիճանին, յերկրորդը՝
ամառն—աշնան ժամանակաշրջանից մինչև գրենայի զարնան
զարգացումը, յերրորդը՝ գրենայի զարնան զարգացումից, այսինքն
զարնան սաղմի զարգացումը վերսկսելուց մինչև շնամի գրենա-
յից դուքս գալը:


Գրենան տեխաթմունք արտաշնչելու և Վուր դուրսդիացնելու
հետևանքով իր քաշից կորցնում է Գրենայի քաշի կորցնելն
առաջին նշանակալի չե այն ժամանակ, յերբ շնչառությունն ամե-
լի աշխույժ է տեղի ունենում: Նա իր կյանքի առաջին ամսում
կորցնում է քաշի մոտ յերկու տոկոսը, յերկրորդ ամսում՝ մեկ
տոկոսը, աշնան և նմանությամբ ամիսներին (6—7 ամսվա ընթացքում)
մեկ տոկոսը, իսկ զարնան՝ սաղմի զարգացման ժամանակաշրջա-
նում 90/0, այսպիսով գրենան իր կյանքի ամբողջ ժամանակա-
շրջանում կորցնում է իր քաշի 13 տոկոսը:

4. ՍԱՂՄԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԳՐԵՆԱՆԸ

Ամբողջ ամառն, աշնան և նման ամիսներին սաղմը մնում
է այն դրության մեջ, ինչպես վոր նա յեղել էր ամառն զարգաց-

ման 2—3 օրերը: Գրենան ձմեռման յինթարկվելուց հետո՝ համապատասխան ջնրմաստիճանի ազդեցության տակ սաղմը դուրս և գալիս իր գաղարի գրությունից և սկսում և զարգանալ:

Սաղմը գաղանա սկզբնական զարգացման ժամանակ ունենում և նեղ գծի աևաք, վորն իրենից ներկայացնում և վորդի վորովայնի մի մասը: Այդ գիծը հետզհետե սկսում և հաստանալ, ծալվում և և ահաման աևաք ստանում, աչքավրտով կազմակերպվում և վորդի մարմնի կողքերը: Հետագայում աչք կողքերը միասալուց դոյանում և վորդի մեջքի կողմը և ամեն կողմից պատ-



Նկ. 21. Սաղմի զարգացումը ձկնի մեջ յնվ վորդի դուրս գալը ձկնից

վում և պատյանով: Մարմնի խոռոչի և զնդնուցի կապը հետզհետե նեղանալով լինկուրացիայի 12-րդ օրը ստանում և նեղ անցքի աևաք, իսկ 13—14-րդ օրն սկսվում և կտրտվել:

Համաձայն սաղմի պատերի դոյանալուն՝ զարգանում և ամնինը: Զարգացման 15—16-րդ օրը, յերբ սաղմի և զնդնուցի կապը բոլորովին կարգում և, ամնինը ամբողջությամբ պարկանման շրջապատում և սաղմը: Այդ ժամանակվանից սաղմը չէր-

շատաւաճում և լինում յերկու պարկով, սաղմային պատայանով— սերտացած և ամենախիտ:

Ինկուբացիայի չորրորդ որովանից մարմնի տաալին կողմի յոթը սեղմենաներում դոյանում են մեկական դուշ ջրված մասեր, դրանք՝ տաղուս բեղիկները՝ շրթունքները և կրծքի զոտներն են: Ե—Ե պրում պլիս թիակները արանքում նկատվում են բերանի խոռոչը և աալին աղիքն իրենց սեղքնական տաթնառում: Սաղմի վերջին մասում նկատվում և հետանցքը և վերջնաղիքը: Ինկուբացիայի ութերորդ օրը դոյանում և սաղմի ներթային սխառնը, աաալին չորս սեղմենաները միանալով կազմվում և դուխը: Նվին նայիս բալորովին չի նկատվում, վոր նա միացութուններից և կազմված, նույն ժամանակաշրջանում դոյանում և ներքին շրթունքը:

Ե—Ծ օրվա ընթացքում դոյանում են շնչանցքեր, վերջիններս միամասնակ են դոյանում, ինչպես կրծքի աաալին սեղմենաներում, այնպես էլ վորովայնի աաալին ութը սեղմենաներում, բայց հաաղայում կրծքի յերկրորդ և յերրորդ սեղմենաների շնչանցքերն անհետանում ին և դոյացած աաանակ դուշ շնչանցքերի փոխարեն մնում են միայն ինը դուշ:

Կեղծ վոտները դոյանում են վորովայնի բալոր սեղմենաներում, բայց հետաղայում դարդանում և միայն յերրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ և իններորդ սեղմենաներում, իսկ մյուս սեղմենաներում դոյացած կեղծ վոտներն անհետանում են:

Ինկուբացիայի 11—12-րդ օրերին աաալին և հետնաղիքների արանքներն ավելի յեն զարդանում և ունենում են կույր փերջավորությամբ խողովակներ, նրանց արանքում սկսում են դոյանալ միջնաղիքի պատերը: Այդ ժամանակ աաալին, միջին և հետին աղիքներն իրարից բաժանվում են: Այդ յերեք աղիքներն իրար հետ հարաբերության միջ են մտնում և մի աղիքի տպավորություն դրոնում միայն վորդը պատյանից դուրս գալու նախորդակին:

Ինկուբացիայի նույն 11—12-րդ օրը սաղմի դրությունը փոփոխման և յենթարկվում, այդ փոփոխման յենթարկվելու պրոցեսը կոչվում և բլաստոկինեզ: Մինչ այդ՝ վորդի մարմինը լինում և ծալած մեջքի ուղղությամբ, այսինքն՝ սաղմի վորովայնն ուղղված և լինում գրենայի կեղևի պատին: Բլաստոկինեզից հետո սաղմը ծալում և վորովայնի ուղղությամբ, իսկ մեջքն ուղղվում և դեպի գրենայի պատը: Սաղմն այս դրությունն ընդու-

նելով՝ ավելի լավ և սպասարժեռա՞ծ իր արամադրութեան տակ
յեղած սահմանափակ տարածութեանը: Յնթե սաղմը մնացած լի-
նեի իր նախկին դրութեան մեջ, այսինքն՝ չըջված չլինելու, այն
ժամանակ նրա վտանքը կ'ենթանայ գրեթե անախն, տարա-
ծութեան լրիվ սպասարժեռելն անհնարին կ'լինելու: Բխստոկենեղից
հետո՝ սաղմի վտանքը տեղափոխվում են ներսի կողմը և առավել
ապրիտնալ և սպասարժեղում կենդանի միջի այդ տարածութեանը:

Չարդացման 13—14-րդ օրը սաղմն արդեն արտաքինից
յերևում և 16-րդ օրում սկսում են գոյանալ մաշկի մազիկները:
16-րդ օրից մաշկում սկսում են գոյանալ սեղմենտները: Առաջին
հերթին մաշկանում և գլուխը, իսկ հետո աստիճանաբար մուգ
գույն են ստանում մարմնի մնացած մասերը:

Տասնութերորդ օրում սաղմի զարգացումն հասնում և իր
վերջավորութեանը, սաղմն սկսում և բաժանվել կենդանից և սաղմի
ու կենդանի արանքում գոյացած տարածութեանը լցվում և սղով-
հենց այդ պատճառով այդ ժամանակ գրեթե արտաքինից ավե-
լի բաց գույն և ստանում կամ, ինչպես ընդունված և առել, գրե-
թե անսպիտակում և Դա նշան և, վոր վորդերի գրեթե անց գույն
գույն ժամանակը մտնեցել և:

Միանգամայն կաղմակերպված և ձվից դուրս գալու պատ-
րաստ վորդը շոշափում և ձվի ներսի հարթ մակերեսը և գտնե-
լով միկրոպիլլար անցքը՝ այդ տեղում կրծում և, ապա բավական-
ին անցք բանալով՝ սկզբում դուրս և հանում գլուխը, հետո
կուրծքը և կրծքի վտանքով հենվելով ձվի կտրված մասին՝ դուրս
հանում ամբողջ մարմինը և սկսում և իր ինքնուրույն կյանքը:
Ձվի կենդան կրծելու համար վորդը մոտ մի ժամ ժամանակ և
կորցնում:

ԳԼՈՒԽ 4-Բ

ԳՐԵՆԱՅԻ ԻՆԿՈՒԲԱՅԻԱՆ

1. ԳՐԵՆԱՅԻ ԱՐԹՆԱՑՄԱՆ ԶԵՎԵՐԸ ՅԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շերամապահության մեջ բերքատվության բարձրացման հիմնական պայմաններից մեկը հանգիստնում և գրենայի ինկուբացիայի տեխնիկան։

Ինկուբացիա բառն առաջացել և լատիներեն incubare բառից, զորը նշանակում և թխնեցնելը Գրանդախելում այդ անվան տակ հասկացվում և զորդերի արթնացումը՝ հասուն պայմաններում։ Այս մեթոդի կիրառումը բոլորովին տարբեր և բնական պայմաններում արթնացնելուց։

Գրենան ճիշտ ժամանակին արթնացնելը մեծ նշանակություն ունի բարձրորակ բոժոժ ստանալու համար։

Ապացուցված և, զոր չերամբի վաղաժամ խնամքը դժակալ արդյունք և տալիս թե՛ բերքատվության և թե՛ վաղակի բարձրացման տեսակետից։ Սա բացատրվում և նրանով, զոր կերակրումներն ավարտվում են մինչ ամռան շոգերի սկզբից և տերևի կոշտանալը։ Մերը գրենան ուշ են արթնացնում և խնամքն ընկնում և ամռան շոգերին, զորզը հիվանդանում և դանազան հիվանդություններով և ստացվում և ցածր և անորակ բերք։

Վորպեսզի ունենանք վաղ կերակրում և զորդերը չվարակվեն տարբեր հիվանդություններով, անհրաժեշտ և գրենան յնթաթաղել ճիշտ ինկուբացիայի, զորը կատարվում և հասուն ինկուբատորներում։

Առաջներում գրենան արթնացնելու համար լցնում եյին փոքր քսակներում և դնում ծոցում, հավի թխուի կամ թևի տակ, գոմաղբում, վառարանի մոտ։ Ընդհանրապես բարձր ջերմություն ունեցող տեղերում գրենան այդ ձևով արթնացնելու դեպքում հնարավոր չեր լինում ստեղծել անհրաժեշտ ջերմու-

թյուն և ոգափոխություն: Դրա հետևանքը լինում էր այն, զոր նախ զբննան լրիվ չէր արթնանում և բացի զբանից արթնացած վորդերն ունենում էին ցածր կենսունակություն:

Դրենան կարելի չէ արթնացնել նաև բնական ձևով. այս ձևի արթնացումն այն է, զոր յեղանակները տաքանալու և թթե-
նու բողբոջները բացվելու ժամանակ զբննան բարակ շերտով փռում են թղթի վրա և դնում սեղանին: Սենյակի տաքության աղդեցության տակ հետզհետե սկսում են վորդերն արթնանալ: Այս ձևով արթնացնելը տևում է 4—5 րո: Առսումնասիրություն-
ները ցույց են տվել, զոր ցրտերի հետևանքով բնականների շեր-
տասախճանի փոքր տասանումներն առանձնապես մեծ վնաս չեն
պատճառում զբննայի արթնացման վրա:

Ինչպիսի պայմաններումն էլ զբննան արթնացվի, անհրա-
ժեշտ է պահպանել հետևյալ որոշումները.

1. Ըստ սաղմի դարգացման աստիճանի պահպանել համա-
պատասխան շերտասախճան. վերջինը խոշոր նշանակություն
ունի զբննայի լուր արթնացման և վորդերի կենսունակության
համար:

2. Նյութափոխության և անխաթթու գազի հեռացման նպա-
տակով պահպանել անհրաժեշտ ոգափոխությունն ու խոնավու-
թյունը:

3. Արթնացվող զբննային տալ համապատասխան պայման-
ներ՝ շերտություն, խոնավություն, անհրաժեշտ տարածություն,
մաքրություն և փռել բարակ շերտով:

Վերահիշյալ բոլոր պայմանները կարելի չէ ստեղծել արհես-
տական ձևով: Դա միանգամայն հնարավոր է զբննան ինկուբա-
տորներում արթնացնելիս:

2. ԻՆԿՈՒԲԱՑԻԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ԴՐԵՆԱՑԻ ԱՐԲՆԱՑՄԱՆ ՅԵՎ, ՎՈՐԻՒ ԲԱՇԽՄԱՆ ՏՅԵՆԻԿԱՆ

1. Դրենայի ինկուբացիայի համար պետք է ընտրել այն-
պիսի շենք, զորտեղ կարելի չէ պահպանել միապաղաղ շերտու-
թյուն:

2. Շենքը պետք է լինի չոր, լուսավոր, ունենա ոգափոխ-
ման հարմարություններ: Ճանկալի չէ հասակը տախտակամեծ
լինի, իսկ հողից լինելու դեպքում ավագ փռել կամ մաքրելուց
դեռնին ցանել ջուր, զորպեսզի փոշի չբարձրանա:

Ինկուբացիայի շննքը պետք է ըստդիացած լինի առնվազն յնքհուսնյակներէց: Դրանցից մեկը պետք է ողտազրծնել զբննայի արթնացման համար, իսկ մյուսը՝ արթնացած վորգերի համար, մինչև շերտապահին հանձնելը՝ խնամելու:

Վերապահել շերամապահն արթնացած վորգն ստանալիս յերկար տարածութիւն շանցնի և ըացի դրանից տեղափոխման ժամանակ վորդերը ֆերմաստիճանի տատանման և այլ վատ պայմաններին ալելի ցիչ յանթարկվին, ինկուբացիայի շննքը պետք է ընտրել սպասարկվող շրջանի կենտրոնում: Ինկուբատորի սղտաարկման շառաւիղը 5—6 կիլոմետրից ալել չպետք է լինի:

Ինկուբատորը պետք է կազմակերպել փաշտա ճանապարհներէց, սղրոտ վայրերից և ճահիճներէց հեռու տեղերում:

Ինկուբացիայի համար ընտրված շննքը պետք է ախտահանել:

Ախտահանումը պարտադիր է: Ախտահանման պետք է գործածնել չորս տոկոսանոց ֆարմային: Վերջինս ստանալու համար պետք է վերցնել մեկ լիտր վահաւքի ֆարմալին (40 տոկոսանոց, և խառնել 9 լիտր սոլիքական ջրի հետ: Այնուհետև աղւղ վիթիզատորի և կամ հննց ալելի ողնությամբ շաղ տալ ամբողջ շննքում: Վոչ մի տնկչուն առանց սրակման չթողնել: Սրակելուց առաջ ըոլոր անցքերը պետք է փակել և 24 ժամ պահել փակ վիճակում, վորից հետո բանալ ըոլոր անցքերն այնքան, մինչև ֆարմալինի հոտը ըոլորովին հեռանա:

Ինկուբացիոն շննքն ընտրելիս առաջնորդվել հետևյալ տաքածություններով:

Շննքի ողտազրծումը	Անկումելու տարածութիւնը 4 հարկանի գարակներ ողտազրծելիս (շառաւիղու մետրերով)							
	50 տուփի համար	75	100	150	200	250	300	400
Արթնացման սենյակ	9	9	12	12	15	15	20	25
Վորգերի սենյակ	15	18	20	30	40	50	60	80

Արթնացման սենյակում հնգից ալելի հարկերով գարակներն ողտազրծելն աննպատեկահարմար է, իսկ շերամիկներուց ման սենյակում բազմաթիւ գարակներ ունենալու դեպքում հա-

մատչատեսիան չտալով պահպանում է պահանջված շենքի տարածությունը:

Ինկուբացիայի յերկրորդ կարևոր խիղիճներէց մեկը համագիտանում է կահալորումը: Ինկուբացիայի սենյակում պետք է ունենալ—

1. Վառարան՝ տաքության համար:
2. Դրնան և վորդերը դասավորելու դարակներ:
3. Փայտյա կամ թղթյա շրջանակներ զրնայի և տրվնացած վորդերի համար (արթնացած վորդերը դնել միայն թղթյա շրջանակներում):
4. Զերմաշափ և խոնավաշափ:
5. Դանակ, տախտակ տերևը կտրելու:
6. Տերևը տեղափոխելու կողմներ:
7. Սեկատար՝ ճյուղերն ետևու համար:
8. Տյուլ՝ արթնացած վորդերը հալագելու և տեղափոխելու:
9. Կշեռք յուր կշռաքարերով 0,1 գրամ հշտությամբ:

Ինկուբատորիան տաքացնելու համար ցանկալի յն ունենալ պտտի վառարան, իսկ ազդիտին չունենալու դեպքում կտրելի յն ոգտադործել թիթեղյա վառարանը, միայն թն վառարանի չորս կողմը պտտել աշրված աղյուսով և կամ ուղղակի աշրված աղյուսից պտտարատել այսպես կոչված խտուխան սխտեմի վառարան: Այդ ձևի վառարան պտտարտաելը շատ հեշտ է և շատ քիչ քանակությամբ աղյուս և պահանջվում 125—180 աղյուսը միանգամայն բավական է:

Թիթեղյա կամ թուջի վառարանների ոգտադործելը արգելվում է զլխավորապես այն պատճառով, վոր դրանցով հնարավոր չի լինում միապաղաղ տաքություն պահպանել, տաքանում են շերմատիճանի ուժեղ տատանումներ: Ինկուբատորիան տաքացնելու համար՝ արխմուսներ, կերտախնկաներ, լամպեր ոգտադործելը խտիով արգելվում է, վորովհետև արնակում են բավականին ածխաթթու գազ, վորը վտանգավոր է վորդերի համար, բացի այդ՝ կարող է տաքանալ հրդեհ:

Վորպեսզի դրնան շատ հաստ շերտով չլինի, մեկ տուփի համար պետք է բնդունել 450 քառակուսի սանտիմետր տարաբանություն ունեցող շրջանակներ: Կշեռքու գործողություններն ալիլի հշտացնելու համար՝ ցանկալի յն վորպեսզի շրջանակներն ալիլի յերկարավուն լինեն: Տյուլերը պետք է կտրել ըստ շրջանակի մեծության: Մեկ տուփ դրնայի համար անհրաժեշտ է 300 քառակուսի սանտիմետր աշուլ:

Նշված բոլոր նախադասարանական աշխատանքները կատարելուց հետո՝ կարելի չե անցնել գրենայի արթնացման աշխատանքին՝ ինկուբացիային:

Գրենայի ինկուբացիան պետք և սկսել այն ժամանակ, յերբ արդեն թթնեռու բողբոջներն ուռնի և այն հաշվով, վոր տերեւը բացվելիս վորդերը դուրս գան:

Գրենան գործարանից ինկուբատորիա պետք և տեղափոխել քանի որ առողջը չի սկսել իր գարնանային դարգացումը, իսկ մինչև ինկուբացիան պետք և պահպանել 8—10° Ց. ջերմության մեջ:

Արթնացման ճիշտ ժամկետը վորոշելուց հետո՝ պետք սկսել գրենայի ինկուբացիայի աշխատանքները: Դրա համար գրենան բարակ շերտով պետք և փռել նախորոք պատրաստված շերտանակների մեջ և զաստվորել դարձանների վրա: Ինչպես արդեն տեղած և, մինչ ինկուբացիայի սկսվելը գրենան պահվում եր 8—10° Ց. ջերմության մեջ: Ուրեմն ինկուբացիան ձևնարկելիս՝ ջերմաստիճանը ժխանգամից 10—12° Ց. չպետք և բարձրացնել: Իսկ այն դեպքում, յերբ ինկուբացիան գրենայի պահպանման վայրում ջերմաստիճանը արդեն բարձրացված եր 13—14° Ց.-ի, այդ դեպքում ինկուբատորիայում ջերմաստիճանն բարձրացնելը նույնպես պետք և սկսել նույն տատիճանից, վորովհետև հիշյալ աստիճանում արդեն սկսվում և առգմի գարնանային դարգացումը և ջերմաստիճանը ցածրացնելուց կարող և վատ հետևանքներ թողնել:

Ինկուբացիայի աշխատանքներում ամենակարևոր և պատասխանատու մոմենտներից մեկը հանդիսանում և ջերմաստիճանի անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելը:

Ինկուբատորիայում աշխատողներին պետք և պարզ լինի, վոր մասամբ նրանց կանոնավոր և անհրաժեշտ պայմանները պահպանելուցն և կախված շերտավազների ստանալից բերքի քանակը, հետևաբար և նրա աշխատանքի արդյունքը:

Ինչպես արդեն տեղած և, ինկուբացիան սկսելիս պետք և տալ 10—12° Ց. ջերմություն, ապա որակյա կամ յերկու որը մեկ աստիճան բարձրացնելով հասցնել 22 աստիճանի: Այս ջերմաստիճանի մեջ գրենան աղիտակում և, դա նշան և, վոր վորդերի դուրս գալը մոտեցել և Յերբ գրենան սպիտակում և, անհրաժեշտ և ջերմաստիճանը բարձրացնել ևս մեկ աստիճան՝ հասցը-

Ներքո 23° Շ. ի Սյա Զերմաստիճանում դուրս են գալիս մի քանի վորդեր, վորոնց ընդունված է տնօրենի հետախույզներ, Զատախույզները դուրս գալիս պետք է Զերմաստիճանը բարձրացնել ևս մեկ աստիճան՝ հասցնելով 34-ի: Սյա Զերմաստիճանը պետք է պահպանել մինչև վորդերի լիակատար արթնանալը: Հիշյալ ձևով Զերմաստիճանը բարձրացնելու դեպքում ինկուբացիան տեսնում է մոտ տասնյոթ որ, իսկ վորդերի գրեհայից դուրս գալու պրոցեսը հետախույզների դուրս գալուց հետո տեսնում է 3—4 քրից մինչ ավելի:

Յեթե ինկուբացիայի ժամանակ Զերմաստիճանը վորեն պատճառով իջնում է, վոր ցանկալի չէ, վորովհետև սաղմի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն է թողնում, անհրաժեշտ է Զերմաստիճանը որակա՞ն 1—2 աստիճանով բարձրացնել և հասցնել անհրաժեշտ սահմանին և ապա ընդունված կտրոցով շարունակել Զերմաստիճանի բարձրացումը:

Կարող է պատահել նաև հակառակը, այսինքն՝ Զերմաստիճանը սահմանված նորմայից ավելի բարձրանա, այդ դեպքում Զերմաստիճանի իջեցնելը ցանկալի չէ: Յեթե Զերմաստիճանը ավելի որովա համար սահմանված 18°-ի փոխարեն հանկարծ 23-ի չէ հասել, պետք է պահպանել մինչև այն որը, յերբ Զերմաստիճանն աստիճանաբար նորմալ բարձրացնելով պետք է հասնի 22°-ի: Դրանից հետո ընդունված կարգով շարունակել Զերմաստիճանը բարձրացնելը: Զերմաստիճանը 25—26°-ի հասնելու դեպքում պետք է աստիճանաբար իջեցնել և հասցնել մինչև 20—24 աստիճանի և այդ Զերմաստիճանը պահպանել մինչև վորդերի լիակատար արթնանալը:

Անհրաժեշտ է իշխել, վոր ինկուբացիայի ժամանակ Զերմաստիճանը 25—26° Շ. բարձրացումը վտանգավոր չէ: 28° Շ. բարձրանալը ցանկալի չէ, իսկ 30° Շ. արդեն վտանգավոր է, վորովհետև վորդերը լավ չեն արթնանում, իսկ արթնացածներն էլ ունենում են ցածր կենսաունակություն: Լսա՝ Դեյլա-Կորտի փորձերի՝ 32° Շ. Զերմության մեջ կենդանանում են միայն 0,50%-ը, իսկ 34° Շ.-ի մեջ բոլորովին չեն արթնանում:

Ինկուբացիայի ժամանակ նորմալ Զերմություն պահպանելուն զուգընթաց մեծ նշանակություն ունի նորմալ խոնավություն պահպանելը, վորովհետև խոնավությունից կախված է գրեհայի մեջ պարունակված ջրի գոլորշիացման չափը: Ինկուբացիայի ժամանակ նորմալ խոնավություն համարվում է

60—70 °/օ-ը, բայց անհրաժեշտ և ասել, վոր նշված խոնավութ-
յունն աբթնացած վորդերի համար բարձր և, այդ իսկ պատ-
ճառով նրանց պետք և տեղափոխել վորդերի սենյակը, վորտեղ
խոնավությունը չպետք և անցնի 50—60°/օ-ից ավելի:

Սոնավությունը չափվում և պարիբոմեարով, Պսիխրոմետրը
կազմված և յերկու ջերմաչափերից, վորոնցից մեկի գնդիկը փա-
թավված և կտորով, վորի ծայրը իջեցված և նրա տակը պտնված
ջրով լի սրվակի մեջ: Զուրը կտորի միջոցով ձմելով՝ իջնում և
ջերմաչափի գնդիկը: Զրի գոլորշիացումը կախված և ջրապատի
ջերմաստիճանից և խոնավությունից: Զուրը գոլորշիանալու ժա-
մանակ իջեցնում և գնդիկի ջերմությունը, այդ իսկ պատճառով
թաց ջերմաստիճանի ցույց տված ջերմաստիճանը միշտ ևլ չորից
ցածր և լինում:

Պսիխրոմետրով խոնավության տեղոր պետք և հաշվել թաց
և չոր ջերմաչափերի ջերմաստիճանի տարբերությամբ: Պսիխրո-
մետրով ոգտվելու համար գոյություն ունի հատուկ աղյուսակ,
վորը բերում ենք հաջորդ կնում:

Վարպետի պարզ լինի պսիխրոմետրով ոգտվելու ձևը, բե-
րում ենք հետևյալ որինակը: Սենթադրենք թաց ջերմաչափը
ցույց և տալիս 20°, իսկ չորը՝ 25°. ուրեմն թացի և չորի տար-
բերությունը լինում և 25 — 20 = 5: Աղյուսակի թաց ջերմաչա-
փի սյունյակում 20-ի և ջերմաստիճանի տարբերության սյու-
նյակի՝ 5-ի համասն տեղում նշված և 61, վորը ցույց և տալիս
ավյալ շենքում յեղած խոնավության տեղոր:

Շենքում վորքան բարձր և խոնավությունը, այնքան ևլ
պակաս կլինի չոր և թաց ջերմաչափերի տարբերությունը: Շեն-
քում 100 տեղորով խոնավություն լինելու դեպքում չոր և թաց
ջերմաչափերը ցույց են տալիս նույն ջերմաստիճանը:

Բացի պսիխրոմետրից խոնավությունը կարելի չե վորդել
հիդրոմետրով և հիդրոդրաֆոյ:

Այն դեպքում, յերբ ինկուբատորիայում խոնավությունը
սահմանվածից ավելի բարձր և, կարելի չե իջեցնել՝ ուժեղացնե-
լով վենտիլացիան, իսկ ընդհակառակը, խոնավությունը պակաս
լինելու դեպքում գետինը թրջել՝ հասցնելով անհրաժեշտ առախ-
ճանին: Այն դեպքում, յերբ խոնավությունը այնքան և բարձ-
րանում, վոր հնարավորություն չի լինում վենտիլացիայով կա-
նոնավորել, կարելի չե ինկուբատորիայում դնել չհանգրթած կիթ:
Զհանգրթած կիթը հեշտությամբ ձծում և խոնավությունը:

Բնական թվեր- մասերի թիվը մասերի մեջ	Բաց և չոր փոփոխականի փոփոխականի տարբերությունը													
	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	
0	100	90	81	73	64	57	50	43	36	31	26	20	16	
1	100	90	82	74	66	59	52	45	39	33	29	23	19	
2	100	90	83	75	67	61	54	47	42	36	31	26	23	
3	100	90	83	76	69	63	56	49	44	39	34	29	26	
4	100	91	84	77	70	64	57	51	46	41	36	32	28	
5	100	91	85	78	71	65	59	54	48	43	39	34	30	
6	100	92	85	78	72	66	61	56	51	45	41	35	33	
7	100	92	86	79	73	67	62	57	52	47	43	39	35	
8	100	92	86	80	74	68	63	58	54	49	45	41	37	
9	100	93	86	81	75	70	65	60	55	51	47	43	39	
10	100	94	87	82	76	71	66	61	57	53	48	45	41	
11	100	94	88	82	77	72	67	62	58	55	50	47	43	
12	100	94	88	82	78	73	68	63	59	56	52	48	44	
13	100	94	89	83	78	73	69	64	61	57	53	50	46	
14	100	94	89	83	79	74	70	66	62	58	54	51	47	
15	100	94	89	84	80	75	71	67	63	59	55	52	49	
16	100	95	90	84	80	75	72	67	64	60	57	53	50	
17	100	95	90	84	81	76	73	68	65	61	58	54	52	
18	100	95	90	85	81	76	74	69	66	62	59	56	53	
19	100	95	91	85	82	77	74	70	66	63	60	57	54	
20	100	95	91	85	82	78	75	71	67	64	61	58	55	
21	100	95	91	86	83	79	75	71	68	65	62	59	56	
22	100	95	91	87	83	79	76	72	69	65	63	60	57	
23	100	96	91	87	83	80	76	72	69	66	63	6	53	
24	100	96	92	84	84	80	77	73	70	67	64	62	59	
25	100	96	92	88	84	81	77	74	70	68	65	63	59	

Ինկուբացիայի ժամանակ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել նախնական վերնախլացիայի զրա: Քանի մոտենում են անընթացման օրերը, այնքան պետք է ուժեղացնել վերնախլացիան:

վորովհետև վորքան կադմակերպվում է ստղծը և մոտ է լինում արթնացմանը, այնքան ուժեղ են կատարվում կենսական պրոցեսները, հետևաբար այնքան էլ թթվածնի մեծ պահանջ է դրացվում:

100 տուփ գրենան ըստ որերի արտաշնչում է հետևյալ քանակի ածխաթուփ՝

Ինկուբացիայի օրերը	1	4	7	10	13	14
Ածխաթթվի արտաշնչում ըստ որերի (գրամներով)	2.6	4.2	8.1	13.7	25.5	32.4

Դրենան արթնա՛նալուց հետո վորդերին պետք է տեղափոխել շերամատուն: Վորդերին շերամատուն տեղափոխելիս շերմաստիճանը պետք է լինի արթնացման ժամանակվա շերմաստիճանի և շերմաապահի սենյակի շերմաստիճանի միջինը: Որինտե՛կ յեթե արթնացման շերմաստիճանը 24 է, իսկ շերմաապահի բնակարանի շերմաստիճանը՝ 18, ուրեմն վորդերի սենյակի շերմաստիճանը պետք է լինի $24+18:2=31^{\circ}$ Ց.:

Շերմաստիճանի փոքր տատանումներն այնքան էլ մեծ նշանակություն չունեն վորդերի կենսականության համար:

Ինկուբացիայի ժամանակ գրենան՝ պետք է պահպանել արևի ճառագայթների ուղղակի ազդեցությունից, այդ իսկ պատճառով արևաճաղից լուսամուտներից անպայման պետք է վարագույր կախել:

Ըստ որերի արթնացման տեղոսը հետևյալն է՝ առաջին օրը արթնանում է մոտ $5^{\circ}/_{\circ}$, յերկրորդ և յերրորդ օրերին՝ մոտ 35 տեղոս, չորրորդ օրը $5^{\circ}/_{\circ}$, նույնքան և հինգերորդ օրը:

Պետք է ասել, վոր ըստ որերի՝ արթնացման հիշատակոսը վորդելը դժվար է, վորովհետև այդ սերոսորեն կապված է դրենայի ձմեռելու տևողությունից, ինկուբացիայի կոնսնավոր կատարելուց, ցեղից և այլն:

Տարբեր որերում արթնացած վորդերին քերքեք չի կարելի իրար խառնել. դա չափազանց դժվարացնում է շերամի կերակրելը: Պետք է այնպես անել, վոր յուրաքանչյուր շերմաապահ ատանա միևնույն օրվա արթնացած վորդերը:

Հաշվումներից հաստատված է, վոր մեկ տուփ գրենայից

(25 դրամից) ստացվում և տասնյոթ դրամ վորդ: Տացրեքու՞թյա՞նք
նը կազմում և զեղևի քաշն ու ինկուբացիայի օտամանակ ջրի պո-
լորդիացման և շնչասուծյան հետևանքով առաջացած պակաս-
որդը:

Այսպիսով շերամապահին մեկ տուփ գրենայի փոխարեն
պետք և տալ 17 դրամ նույն որում արվանացած և նույն պար-
տիայի վորդեր: Բայց վորովհետև ինկուբատորիայում վորդերը
նույն որում չեն արթնանում, և բացի այդ՝ տարբեր շերամա-
պահներ ըստ իրենց ունակության տարբեր քանակությամբ վորդ
են պահանջում, անհրաժեշտ և վորդերի կշռման մի վորդ ձև ըն-
դունել, վորի մասին ստորև մանրամասն կխոսենք:

Ինչպես ստացինք, վորդերը կենդանանում են հասուն կ շր-
ջանակներում: Յերբ նրանք բավականին արթնանում են, շրջա-
նակի վրա պետք և դնել համապատասխան մեծությամբ տյուլ:
Այնուհետև շրջանակը տյուլի հետ միասին կշռել և գրանցել հա-
մապատասխան տախտակում: Դրանից հետո շրջանակի վրա պետք
և դնել յերկրորդ տյուլը և վրան լցնել մանր կարտիված թթմնու-
տերև: Վորոշ ժամանակից հետո շերամները յերկու տյուլերի
անցքերից դուրս դալով կարծրանան թթմնու տերևի վրա: Յերբ
վորդերն ամբողջությամբ բարձրացած կլինեն, յերկրորդ տյուլը
վորդերի հետ միասին պետք և վերցնել և դնել նախորդ պատ-
րաստված թղթյա շրջանակների մեջ, իսկ դեռ չկենդանացած
վորդերը շրջանակով կշռել և վերջինս գրանցել մինչ այդ կա-
տարված գրանցման կաղթին: Շրջանակից կենդանացած շերամ-
ներին հաժաքելու հետևանքով յերկրորդ քաշն առաջինից պակաս
կլինի: Այդ յերկու կշիռների տարբերությունը՝ համասար և հա-
վաքված վորդերի քաշին:

Վորովհետև վորդերը կենդանանում են մի քանի որվա ըն-
թացքում, հետևաբար կշռումը և վորդերի հաժաքելը պետք և
շարունակել մինչև արթնացման վերջը:

Յերկրորդ որվա կշռումը կատարվում և հետևյալ ձևով:
առաջին որվա կշռումից արդեն պարզվում և առաջին անգամ
հաժաքված վորդերի շրջանակով տյուլի կշիռը: Այնուհետև շրջա-
նակի վրա ուղղակի դրվում և յերկրորդ տյուլը, ապա տյուլի
վրա հաժաքված վորդերին տյուլով անդամոխելուց հետո շրջա-
նակը դարձյալ պետք և կշռել և կշիռը գրանցել նույն տախտա-
կում: Նախորդ որվա քաշի տարբերությամբ վորդվում և հաժաք-

ված վորդերի քաշը՝ Նույն ձևով պետք է շարունակել յերկրորդ և յերրորդ որերը:

Առաջին կշռումը յերբեք չպիտի կատարել վորդերը դեռ դուրս չեկած ժամանակ, վորովհետև, ինչպես արդեն ասված է, ինկուբացիայի ժամանակ գրենան ամեն որ իր քաշից բավականին կորցնում և, վորի հետևանքով կշռման արդյունքը հիշատակելիս Իսկ այն դեպքում, յերբ ամյալ ինկուբատորիայում արթնացվում է մեծածանակ գրենա (300—400 տուփ), այդ դեպքում կարելի չէ ստաջին կշռումը կատարել գրենան սպիտակելու կամ հետախուզների դուրս դալու որը:

Ընդհանրապես վորդերը մեծ մասամբ կենդանանում են աստվոյան ժամի 5—10: Վորդերին պետք է հավաքել ժամի 10—11-ին, այսինքն՝ այն ժամանակ, յերբ նրանց մասսայական դուրս դալն արդեն ավարտված է: Այն դեպքում, յերբ վորդն առաջին անգամ հավաքելուց հետո, դարձյալ բավականին մեռած են, պետք է կրկին հավաքել և կշռումը կատարել վերև հիշված ձևով:

Յուրաքանչյուր ինկուբատորիայում պետք է արթնացնել մի քանի պարտիաներ. ուստի հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել, վորպեսզի թե տարրեր պարտիաները և թե տարրեր որերում արթնացածներն իրար չխառնվեն: Երա համար անհրաժեշտ է հավաքված վորդերով թղթյա շրջանակների վրա գրանցել պարտիայի համարը, արթնացման որը և վորդերի քաշը:

Ընդհանրապես առաջին որվա արթնացածները՝ հետախուզողները, լինում են շատ քիչ: Այդ վորդերն անհրաժեշտ է վոչնչացնել, իսկ ամենավերջին հերթին արթնացածները, վորոնք նույնպես քանակով աննշան են լինում, վորպես թույլեր, դարձյալ պետք է վոչնչացնել:

Կշռումը պետք է կատարել 0,1 գրամի ճշտությամբ, իսկ գրանցման ժամանակ մինչև 0,4 գրամը կարելի չէ հաշվել չառնել. 0,4—0,6 գրամը կարելի չէ հաշվել 0,5 գրամ, իսկ 0,7—0,9 գրամը՝ մեկ գրամ:

Կշռումը կատարելուց հետո յուրաքանչյուր որ ստացվում են մեծ քանակությամբ մանր պարտիաներ, ըայց շերտավորապես պահանջը յերբեք չի կարող կշռման ժամանակ դոյացած պատահական կշիռների համապատասխան լինել, այլ իսկ պատահաբով պետք է նախորոք պատրաստել յուրաքանչյուր շերտավորապահին տրվելիք վորդի քանակի ցուցակը և ըստ այդ ցուցակի նույն որում դուրս յեկած 4 նույն պարտիայի վորդերը միացնելով

կազմել պահանջվող կշիռը: Միացման այս տեխնիկան ավելի պարզ լինելու համար բերում ենք հետևյալ որոնակը: Յենթադրենք ըստ շերտմանների կազմած ցուցակի՝ արվելու յեր շերտմապահներին՝ 17 դրամ, 15 դրամ, 10 դրամ և այլն, իսկ նույն որում կենդանացած և նույն պարտիայի վորդերից հոն 4,5, 5,0, 2,5, 0,0, 7,0. 1,5, 3,5, 4,0, 2,0, 2,0 գրամանոց պարտիաներ: Շերտմապահի պահանջի համաձայն պարտիաներ ստանալու համար կարելի յե միացնել՝ $4,5+3,5+9=17$ -ի կամ $5+7+3=15$ -ի, $2,5+1,5+4+2=10$ -ի

Պարտիաների միացման ժամանակ միշտ ել կարող և պատահել այնպիսի դրություն. յերբ մոչ մի կերպ հնարավոր չի լինում ստանալ այն քանակով վորդ, վորքան վոր պետք եր: Այդպիսի դեպքում պիտի վարվել հետևյալ կերպ՝ կշռել այն շրջանակը, վորից պետք և պակասեցնել վորդը և կշռից վերցնել այնքան դրամ, վորքան վոր պակասացվելու յեր տվյալ շրջանակի մեջ յեղած վորդերից, ապա շրջանակի մեջ դնել նախորոք պատրաստված թթննու և լիարտաված տերևները, ապա ել մինչև վորդերը հաճաքվեն, ապա պինցիտի ողնությամբ վերցնել հաճաքված վորդերով տերևները այնքան, մինչև կշռի թաթերը հավասարվեն: Այս ձևով պակասեցնելը պետք և կատարել արթնացման որը: Վորքան ուշացվի, այնքան արդյունքը սխալ կլինի, վորովհետև վորդերը թթննու տերև ուտելով ծանրանում են:

Պարտիայի քաշը պակասեցնելու համար դոություն ունի ես մի այլ միջոց: Դրա համար անհրաժեշտ և միշտ ունենալ վորոք քանակությամբ միանդամայն յոր թթննու տերև: Վերցնել վորոք քանակությամբ յորացրած թթննու տերև, կշռել, ապա դնել պակասեցվեքք պարտիայի վորդերի վրա: Վորդերը տերևի վրա բարձրանալուց հետո՝ դարձյալ կշռել. ստացված քաշի և յոր տերևի քաշի սարքերությունը կլինի վերցված վորդի քաշը: Յերբ գրենան ինկուբատորիայում սկսում և սպառտկել, իսկույն պետք և հայտնել շերտմապահին վորդերն ստանալու որվա ժամին:

Ինկուբատորիայի աղխատանքներն այնպես պետք և դասավորել, վոր արթնացած վորդերը նույն որը և կամ ամենատուրը հաջորդ որը հանձնվեն շերտմապահին: Արթնացած վորդերը մինչև շերտմապահին հանձնելը պետք և կերակրել պահպանելով շերտմի այդ հատակի խնամքի բոլոր դոկանոնները:

Ինկուլքացոյի աշխատանքների ժամանակ պետք է հսկել, վոր տարրեր համարներէ և տարրեր որերում արթնացած վորդերն իբար չխառնվին:

Վորովհետեւ, ինչպէս ասացինք, առաջին և վերջին որերում արթնացած վորդերը վաղնչացում են: Այդ իսկ պատճառով յուրաքանչյուր ինկուլքատորիայում արթնացման համար պահանջած ից մոտ 1—2⁰/₀ ավելի գրենա պետք է դնել:

Յեթե ինկուլքատորիայում չկան համապատասխան կշեռքներ, կարելի չէ կիրառել այսպէս կոչված՝ առանց վորդերը կշեռլու բաշխման սխառնմը:

Այս դեպքում կշռում են ամեն մի շերամապահի հասունելիք գրենան առանձին-առանձին և ապա արթնացում: Վորպէսզի տարրեր շերամապահների գրենան իբար չխառնվին, անհրաժեշտ է գրենան շրջանակների մէջ լցնելուց հետո՝ շրջանակի վրա նշանակել՝ շերամապահի համարը և արթնացվելիք գրենայի քաշը, իսկ մնացած աշխատանքները կատարվում են նույն ձևով, ինչպէս վորքը կշեռլու դեպքում:

Արթնացնելու և կշեռլու նշման ձևի բացատրական կողմերն ախ են, վոր ամեն մի շերամապահ նույն որվա վորդեր ստանալու փոխարեն ստաննում է 3—4 որվա արթնացած վորդեր: Տարրեր որերում կենդանացած վորդերին իբար խառնել չի թույլատրվում, հետևաբար այս դեպքում շերամապահը մեկ պարտիայի հետ գործ ունենալու փոխարեն գրազվելու չէ 3—4 պարտիաների հետ: Ծիշտ է, վորդերի հետագա խնամքի ժամանակ կարելի չէ տարրեր որերում կենդանացածներին հավասարեցնել և մեկ հասակի պարտիա կազմել, բայց դա բավականին դժուար է, ժամանակագ առիթով շերամապահի համար: Հավասարեցման ձևի մասին մանրամասն կանդ կառնենք հետագա գլուխներում:

Վորդի բաշխման ձևերից ամենալավը հանդիսանում է վորդերի կշռման ձևը, վորովհետեւ շերամապահներն ստանում են նույն որում կենդանացած վորդեր:

Գրենան ինկուլքատորիայում արթնացնելուց բացի, կարելի չէ արթնացնել նաեւ հատուկ ապարտաներում — ինկուլքատորներում: Գրենան ինկուլքատորներում կենդանացնելու ժամանակ միանգամայն հնարավոր է պահպանել թե ցանկալի շերմաստիճանը և թե խոնավությունը: Ինկուլքատորները լինում են մի քանի տեսակ, բայց հիմնականում բաժանվում են յերկու սխառնմի, առաջինում շերմաստիճանի բորձրացումը կատարվում է

պատերի արանքում գտնված ոգի միջոցով: Այս սխառնի ինկու-
բատորները կոչվում են Որլիանդի: Իսկ յերկրորդում պատերի
արանքում ոգի փոխարեն լցված և լինում ջուր և կոչվում և
Պասկվալիսի:

Հիշված յերկու սխառնի ինկուբատորներից ավելի զործնա-
կանը Պասկվալիսի սխառնի ինկուբատորներն են, զորովհետև
ջուրն իր մեջ ջերմությունն ավելի յերկար պահելով, ջերմատ-
ախճանի ուժեղ աստանուկներ տեղի չեն ունենում: Վերոհիշյալ
ինկուբատորներն իրենց կառուցվածքով գնակ կառարնչագործ-
ութ չեն, այլ իսկ պատճառով մասսայական դործածության մեջ
չեն ընդունված:

ԳԼԵԽ 5-Բ

ՇԵՐԱՄԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ

1. ՇԵՐԱՄԱՏՆԵՐ

Վորդի կերակրման համար կարող են ծառայել այն բոլոր սովորական շենքերը, վորոնք իրենց հարմարություններով կարող են բավարարել նրա պահանջները:

Թրանսիայում մինչև անցյալ դարի կեսերը անհրաժեշտ ելին գտնում վորդերի կերակրման համար կառուցել նոր խոշոր շենքեր: Նման հատուկ շենքեր կառուցել ելին Սենն գավառում: Մակայն ներկայումս վորդեր խնամելու համար հատուկ շենքեր պատրաստելու խնդիրը սուր չի դրվում, վորովհետև շրջափակումը միայն յերկու ամիս պետք և ծառայի շրջամապահության: Պրակտիկայում պահպանելով մի քանի ելեմենտար առողջապահական կանոններ՝ սովորական շենքերում կարելի չե հաջողությամբ կեր տալ վորդերին, միայն յեթե այն բավարարում և ներքոհիշյալ պահանջները.

1. Շենքը չպետք և լինի շատ փոքր և նեղված:

2. Շրջամասան ծովալը մեկ տուփի համար չպետք և 90—100 խոր, մետրից պակաս լինի:

3. Շենքը պետք և լինի լուսավոր, ոդառատ և ոժտված բավականաչափ մեծ անցքերով՝ լուսամուտներով և հողե տանիք ունենալու դեպքում յերգիկով: Հարկ չեղած դեպքում յերգիկներ ռդնությամբ շատ հեղտությամբ կարելի չե կատարել ոդափոխություն:

4. Նախքան կերակրելը՝ շենքը պետք և լախտանան:

Ընդհանրապես խոնավ շենքերից պետք և խուսափել, խոնավությունը վատ և առողջապահում թե՛ վորդի կյանքի և թե՛ մետաքսաթելի վորակի վրա, խոնավ շենքերում առաջանում են զանազան հիվանդություններ:

Ձի կարելի չերամի կերակրման համար ընտրել այնպիսի շենքեր, վորոնք ընկած են վոչոտ նանապարհների վրա, վորովհետեւ փաշու միջոցով տարածվում են դանազան հիվանդութիւններ աստիացնող բակտերիաներ:

Չպետք է կերակրել այն շենքերում, վորոնք չըշտպատված են խիտ ծաւերով, վորովհետեւ վերջիններս խանգարում են ողի շարժումը: Բացի դրանից՝ ծաղկման ժամանակ առաջացնում են սուր հոտ: Խորհուրդ չի տրվում ընտրել նույնպես այնպիսի շենքեր, ուր կան մեծ քանակութեամբ մրջյուններ և մկներ: Թրանք մեծ քանակ են հասցնում շերամի վորդերին, հաճախ խաղաղ զոչնչացնում են ամբողջ կերակրումը:

Յանկալի յե, վար շերամատունը կառուցված լինի քարից՝ փորձերը ցույց են տվել, վոր քարից և չթրծված աղյուսից կառուցված շենքերում շերամէթյան տատանումներն ուժեղ չեն լինում: Մեղ մեղ մոտ շերամի խնամքի համար հատուկ պատրաստված շենքեր չկան, շերամի վորդերին խնամում են սովորական բնակելի շենքերում, մարագներում և նույնիսկ գոմերում, վորոնք կառուցված են թե տեղական քարերից և թե աղյուսից: Ունեն հողածածկ կտուրներ, հաճախ յերգիկներով:

Պարսկաստանում վորդերին խնամելու համար կառուցում են հատուկ թեթեւ և եծանաղին շենքեր՝ նման խրճիթների, վորոնք կոչվում են «տիլիմ-բարներ»^{*)}:

Թեք ծածկոցի տակ, հաստ ձողերից պատրաստում են դարակներ, վորոնց վրա մարդը ման դալով կերակրում և վորդերին: Վորդերը դառնում են այդ դարակի տակ՝ յերկրորդ ավելի թեթեւ կառուցվածք ունեցող դարակի վրա: Այդ յերկու դարակների միջև ընկած տարածութիւնը լինում և մոտ կես մետր, այնպեւ վոր կերակրողի ձեռքը հեշտութեամբ հասնում և վորդերին:

Վորդերը հասունանալիս՝ այլևս ցախ չեն դնում, այլ ուղղակի բարձրանում և ապա տանիքի վրա հյուսում են բոժոժները:


Իտալիայում ազատ շենքեր չլինելու դեպքում նույնպեւ պատրաստում են հարթածածկ տիլիմբարներ, բայց ավելի ցածր, քան պարսկական տիլիմբարները:

*) Տիլիմ-բարները յերկկողմանի, թեք կտուրներ ունեցող ծածկոցներ են, ամբողջած սյուների վրա հասունները ծածկված են հարգով:

Շերամի վորդերն չի կարելի կերակրել սեղանների և հատակի վրա, վորովհետև այդպիսի տեղեր կերակրելիս՝ խոտինները մնում են խոնավ՝ վատ պալիտիսթյան հետևանքով, և քաղցի դրանք՝ շենքի ծավալը լրիվ չի ոգտադործվում:

Վորդերը կերակրելու համար պատրաստում են հատուկ դարակներ: Դարակներն ոգտադործելիս հնարավոր և լինում Ծույն շենքում կերակրել ավելի շատ շերամ:

Դոյուլթյուն ունեն մի քանի ձևի դարակներ, բայց հիմնականում, կարելի չե բաժանել յերկու խմբի՝ շարժական և անշարժ: Ավելի նպատակահարմար են շարժական դարակները, վորովհետև կերակրումը վերջացնելուց հետո կարելի չե հավաքել, իսկ շենքն ոգտադործել այլ նպատակների համար: Դարակներ պատրաստելը շատ հեշտ և Թուրքական շերամապան կարող և պատրաստել: Այն կաղմված և յերկու կամ չորս հնարաններին, վորոնց վրա ամրացնում են դարակները: Դարակները պետք և կառուցել այնպես, վոր հեշտ լինի քանդելը և հավաքելը:




Նկ. 23. Գնդակամ տիպի շարժական դարակներ:

Բանդված վիճակում ներանք շատ քիչ տեղ են բռնում, հետևաբար նրանց պահելը դժվար չի:

Դարակները պատրաստում են դանազան նյութերից: Այն չբջաններում, ուր կան յեղեղնուտներ, կարելի չե դարակներ պատրաստել յեղեղնից, իսկ յեթե յեղեղնուտներ չկան, կարելի չե պատրաստել փայտյա չբջանակ և արանքում հյուսել յերկաթալարով կամ վույթի թելով: Դարակներ պատրաստելիս՝ յերկարությունը և լայնությունը պետք և վերցնել ըստ շենքի հարմարության: Այն դարակները, վորոնք դրվելու չեն պատի մոտ և միայն մի կող-

ժից և հնաքաղաք վարդերին կերակրել: լախությունը պետք է լինի 75 սմ-ից մոշ ավելի: Խակ աչն դարակները, վարձնք գրվելու յնն շերտաժառան մեղանդում և հնաքաղաք և վարդերին յերկու կողմից ել կերակրել: լախությունը պետք է լինի 1,5 մետր: Կարելի ցե նույնպես պատրաստել, այսպես կոչված կախված դարակներ: Դրա համար անհրաժեշտ և պատրաստել շրջանակներ (դարակներ): Այդպիսի դարակներ պատրաստելու համար առատագից պետք է կախել 4 թռի: Յուրաքանչյուր կողմի դույզ թակերը մի քանի հարկի բաժանելով՝ պետք է ամրացնել կարճ ձողեր և նրանց վրա դնել դարակները:



Նկ. 23. Կախված դարակներ:

Հարժարության համար դարակներն բարձրությունը մեկը մյուսից պետք է լինի 45—55 սմ, խիչ շարժական դարակներ պատրաստելիս՝ ներքին հարկի բարձրությունը գետնից պետք է լինի 30—40 սմ:

Կա նույնպես մի այլ սխեմա՝ դարակ, վորը կոչվում է Կաժալոյի սխեմա: Այդ սխեմայի դարակներ պատրաստելու համար պետք է վերջնել 4 հաս ճեպոյա ձող, ամրացնել իրար և այդ ձողերի վրա իրարից 10—12 սմ բարձրությամբ թեք ձե-

վաղ գամել մեխեր, ապա ըստ դարակի լաֆաւթյան պատրաստել
բարակ փայտյա ձողեր և տեղադրել թեք խփած մեխերի վրա,
հենց այդ ձողերի վրա կերակրելով վորդերին:


Յերբ կերակրման ժամանակ խշտիներն անընդհատ հաս-
տատարով հասնում են հաջորդ շարքի մեխերին, վերջիններե-
ս վրա դնում են նոր ձողեր և վրան փռում տերև:

Վորդերը ձողերի արանքից բարձրանում են նոր գլգլած
ձողերի վրա:

Յերբ վորդերն ամբողջութեամբ բարձրանում են վերևի ձո-
ղերի վրա, ներքևի խշտիները ձողերի հետ միասին հանվում են:
Այդ սխառեմի դարակներն ունեն այն աստվելութեամբ, վոր
խշտիների հանելը շատ հեշտ և արագ և կատարվում:

Կավալոյի դարակների ոգտողործումն ասանձնապես ձե-
ռնառ չե վորդի վերջին հասակների համար այն դեպքում,
յերբ նման դարակներում վորդերին վաղ թե մի հարկի վրա չեն
կերակրում, այլ մի քանիսի վրա:

Անհրաժեշտ և խշտիների մաքրման ժամանակ տակն հար-
կի վորդերի վրա սաղան փռել, վորպեսզի կեղտը չլիճփվի
Այդ սխառեմի դարակների ոգտազօրծման ժամանակ տեղի



Նկ. 24. Կավալոյի սխառեմի դարակներ

մեծ խնայողութեամբ և լինում. բացի դրանից վորդերն աստղա-
պահական լավ պայմաններում են դնում, կղկղանքը վորդերի
տակը չի մնում: այլ շարունակ անցնելով խշտիների արանքից՝
նրանք չեն բորբոսնում:

Բացի Կավալոյի սխառեմից՝ կան նաև Կավալոյի ոչսառեմի
դարակներ: Վերջիններս պետք և կառուցել հետևյալ ձևով: Հաստ
և չոր ձողերից պետք և պատրաստել յերկու կողմերից իրար
հենված զույգ յնուանկյունաձև հենարաններ մօտ 65° անկյունով:
Հենարանների յերկու գագաթները միմյանց միացնել մի այլ

ձողով, ապա յերկու հեռարանների արանքներում յեղած տա-
բանության մեջ՝ ըստ լայնության՝ անցկացնել բարակ ձողեր,
վորոնց ներքևի մասում, թեք ձևով, պետք և մեխել տախտակի-
կառու, վորպեսզի վորդերին կերակրելիս ճշուդերը ուղղահայաց
գրվեն նրա վրա:

Կալալանին կարելի չե տարատեսել տարբեր մեծությամբ:
Հնարագիտության և կարիքի ղեկըրում կարելի չե պատրաստել
մոտ 1—2 մետր բարձրությամբ: Մեղ մոտ տասնմասկես Մեղ-
բու շրջանում մեծ չափով տարածված և հետևյալ ձևի դարակնե-
րի գործածությունը: Շերամատան առատագից կախում են թո-
կեր կամ յերկաթյա լարեր, իսկ սրանց վրա ամրացնում են
հաստ ձողեր յերկու կամ յերեք հարկից:

Ձողերի վրա դառնում են սովորական յեղնդնուց գործած-
այապես կոչված սլաքանո՝ Վերջինս գործում են վաղ թե ցանցա-
նե, այլ յեղեղը կողք-կողքի դասավորելով և թելով մեկը մյուսի
հետ կապելով: Սեթե յեղեղ չի ճարվում, չաթանը պատրաստում
են ուղիղ և բարակ ճյուղերից: Նման դարակներն ունեն այն
առավելությունը, վոր նախ՝ ողջ շարունակ անցնելով խշախների
արանքից՝ վերջիններս չեն բարձրանում: Սերկըրոզ՝ կերակրում
ավարանուց հետո հեղատությամբ կարելի չե զոթաթել և տեղա-
փոխել, ուր վոր հարկն և և յերրորդ՝ հիշյալ շրջանակները սրն-
անության մեջ կարելի չե ողորդարձել և այլ նպատակների
համար, որինակ՝ Մեղրիում ընդունված և ամառանոց զնալիս՝
դրանցով շրջադասել վրանները և կամ մրգեղեն են չարացնում:
Վորդեր խնամելու համար բացի դարակներից՝ անհրաժեշտ և ու-
նենալ հետևյալ պարագաները՝

1. Գերմաչուփ.

2. տախտակներ և սուր գանակներ՝ տելել կորատելու
համար.

3. կողով և սափան՝ տեղափոխելու համար.

4. սեկաար (մկրտա)՝ ճյուղերն անելու.

5. Թգթեր՝ վորդերի տակը փռելու համար.

6. ծակոսակեն Թգթեր՝ վորդերը տեղափոխելու և խշախները
մաքրելու:

7. ձևքի փոքրիկ աղացներ կամ կեռ գանակներ՝ ճյուղեր
եռելու:

Կերակրելը հաջող կատարելու համար ամենաանհրաժեշտ պայմանը շենքի մաքրումը և ախտահանումն և Կերակրելուց առաջ շենքը պիտի մաքրեն, պատերն սպիտակացնեն, պատահաններն ու դռները մաքրել փոշուց, դարակները մոխրաջրով լվանալ:

Ենթե շենքը յերեք չի ծառայել վորդերի կերակրման և կտն անցյալ տարի վորդերը կերակրելու ժամանակ շեն նկատվել հիվանդացած վորդեր, այն ժամանակ կտրելի յն բալարարվել միայն շենքի պատերն սպիտակացնելով: Կերակրելուց առաջ դարակներն ու չափանը լվանալուց հետո՝ պետք է միառժամանակ պահել դրսում արևի ճառագայթների ուղղակի ազդեցության տակ. արևի ճառագայթների ազդեցությամբ հեշտությամբ վոչընչանում են տարրեր հիվանդություններ առաջացնող բակտերիաները:

Նախորդ տարում վորդերի մեջ հիվանդություն յերևալու պեպքում ախտահանումը պարտադիր և:

Պրակտիկայում ախտահանումը կատարվում և դիսանոբոսպես յերեկու բուժանյութներով, այն և՛ ֆորմալինով և ծծումբով: Ախտահանումը Ֆորմալինի զուրու միջոցով.— 100 խորանարդ մետր ծավալ ունեցող շենքի համար պետք և վերցնել մեկ լիտր վաճառքի (40⁰/o) ֆորմալին և ամանով դնել կրակի վրա: Առաջիկա սկսում և բարձրանալ ֆորմալինի գոլորշին:

Նախքան ախտահանելը պետք և մաքրել շերամատունը, ծածկել բոլոր անցքերը և գոլորշիացման հենց առաջին իսկ բուպեյին՝ պիտի դուրս դալ շենքից, ամուր փակել դուռը և այդ գոլորշյամբ պիտի պահել մինչև 48 ժամ:

4. ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄԸ ՀԵՂՈՒԿ ՖՈՐՄԱԼԻՆԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

100 խորանարդ մետր ծավալ ունեցող շենքի համար պետք և վերցնել մեկ լիտր վաճառքի ֆորմալին և խառնել 30 լիտր ջրի հետ, ապա պալվերիդատորի ուղնությամբ արակել շերամատան պատերին, առաստաղին, հատակին և նրա մեջ գտնվող բոլոր իրերին: Այս գործողությունը պետք և կատարել չափազանց արագ, վոքովհետև ֆորմալինը վատ ազդեցություններ և թոքնում ժարդու որդանիզմի վրա: Վորքան դրսում յեղանակը տաք և

լինում, այնքան ֆորմալինի ազդեցությամբ հաջող է կատարվում, ուստի ցանկալի չե ակտահանումը կատարել որպես առժամեքին: Ինչպես առաջին դեպքում, այնպես էլ այստեղ, պիտի ծածկել բոլոր անցքերը և այդպես թողնել մինչև 68 ժամ:

Պայվերիդատոր չլինելու դեպքում՝ խառնուրդը կարելի չե-լազ տալ ազելի միջոցով:

5. ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄԸ ՆՍԽԱՆԱԳՈՎ

Նախքան ակտահանելը, ինչպես ֆորմալինով ակտահանելու ժամանակ, նույնպես և այս դեպքում պետք է ծածկել պատահանները, դռները և բոլոր անցքերը. ապա կրակարանում պատրաստել թեժ կրակ և դնել յնոթոտնու վրա: Հրդեհից խուսափելու համար, յնոթոտնին պիտի դնել ջրով լի ամանի մեջ, ապա ուժեղ կրակի վրա դնել համապատասխան քանակությամբ ծծումբ և դուրս դառնվ փակել դուռը: Վորպեսզի ծծումբը լավ աչքի չանհրաժեշտ և ազելացնել ծծումբի քաշի մոտ 5%-ի չափով սեղմաբա, իսկ ակտարա չլինելու դեպքում կարելի չե դնել ջր տաշեղի կտորներ:

Ցուրաքանչյուր 100 խորանարդ մետր ծավալ ունեցող շենքի ակտահանման համար պետք է վերցնել 3 կգ ծծումբ. շերտառանք պետք է փակ պահել 24 ժամ: Վորպեսզի ծծմբի գաղն ազելի լավ ներգործի, անհրաժեշտ է ակտահանելուց առաջ պատերը թրջել:

6. ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄԸ ՔԼՈՐՈՎ

Ընդհանուր կարգով բոլոր անցքերը պետք է փակել. 100 խոր. մետր ծավալ ունեցող շենքի համար պետք է վերցնել 10 կիլոգրամ քլորապիլի և խառնել 9 լիտր ջրի հետ: Պարծոպությամբ կատարել փայտե կամ հավե ամանի մեջ, վորպեսզի մետաղյա ամանները փչանում են: Մի ուրիշ ամանում վերցնել մեկ լիտր ջուր և խառնել 0,5 կիլոգրամ ուժեղ ծծմբաթթվի հետ: Այս քլորապիլի և ծծմբաթթվի խառնուրդները խառնել իրար: Խառնելիս անհրաժեշտ է ղոնջ թե քլորապիլի խառնուրդը լցնել ծծմբաթթվի խառնուրդի վրա, այլ ընդհակառակը, ծծմբաթթվի խառնուրդը լցնել քլորապիլի վրա: Ծծմբաթթվի ազդեցությամբ սկսում է անջատվել քլորը. այդ իսկ պատճառով յեքիտ խառնուրդներն իրար խառնելիս իսկույն պետք է շենքից հեռանալ և փակել դուռը:

Շերամատուհան անհրաժեշտ և փակած պահել 24—48 ժամա-
Քլորը ծանր դադ լինելով՝ շարունակ ցածր և իջնում, զբա հա-
մար ևլ պետք և աշխատել քլորակիրով ամանը, վորքան կարելի
յն, բարձր տեղ դնել: Քլորը վատ և աղյուս մետաղների վրա,
սուսի նախքան ախտահանելն անհրաժեշտ և շնեքից հանել բա-
լուր մետաղյա իրերը:

Քլորը վատ ազդեցություն և ունենում նույնպես մարդկանց
որպանիովի վրա. հետևապես շերամատուհանը քլորով ախտահանե-
լիս պետք և չափազանց զգուշ լինել:

Ախտահանումից հետո անհրաժեշտ և շնեքի դռներն ու պա-
տահանները բանալ և թողնել բաց այնքան, մինչև ախտահանիչ
նյութի հոտն իրպես վերանա:

Վորդերի կերակրման ընթացքում չպետք և շերամատուհանը
փոշոտվի և կեղտոտվի: Շերամատուհանը մեծ գոգաշաղկապ պետք
և ավելի՝ նախորոք ավելի քան թրջելով: Բայց ավելի լավ և
ազգապի թաց շորով մաքրել փոշին:

7. ՊԱՐՏԻԱՆԵՐ ՀԱՎԱՍԱՐՆԵՐԵԼԸ

Վարդհեստ վորդերը միաժամանակ շնե մաշկափոխվում, այդ
խակ պատճառով նրանց առանձին-առանձին ևլ պետք և լոնտելի:
Յեթե անգրեք որերում մաշկափոխած վորդերին խառնենք իրար
և միասին կերակրենք, այն ժամանակ կատարվի վորդերի անհա-
վասաբեցում: Նշանից մի մասը դեռ ջնած, մյուս մասը կակսի
կեր փնտել: շնածները կարող են բարձրանալ ջնածների վրա
և նրանց անհանգստացնել: Յեթե այդ ժամանակ շարունակելու
լինենք արթուն վորդերի կերակրումը, ջնածները քնալով կերի
տակ խոնավ պայմաններում կանհանգստանան և այդպիսով
կլոանգարվի նրանց մաշկափոխությունը: Իսկ արթուններին չկե-
րակրելու դեպքում սովորաբար կլինեն:

Ընդհանրապես մաշկափոխություն ժամանակ վորդերն ավե-
լի մեծ ջանա են ունենում վարակիվելու: այդ խակ պատճառով
պետք և առանձնակի ուղադրություն դարձնել և նրանց համար
ստեղծել առողջապահական սահմանով պայմանները:

Նոր մաշկափոխված վորդի արտաքին մաշկն այնքան նուրբ
և լինում, վոր կոշտ տերեխն ցավելիս հեշտությունով հանկուտա-
վում և, վորից ևլ շատ դեպքերում ուռի և գալիս վարակում,
մանավանդ յեթե տերեխները փոշոտ են լինում: Վարքան նորմալ

ընթացում մաշկափոխությունը և վարքան նրանք աչք պրոցեսում լինեն ազատ տարածության մեջ, ազատ ողում, այնքան առողջ կլինեն և այնքան քիչ կենթարկվեն հիվանդություններու:

Կերակրումը հաջող լինելու նպատակով պարտիայի բոլոր ժողովներ միասին պետք և կատարեն մաշկափոխությունը: Վարդերը համատարացնելու համար անհրաժեշտ և ունենալ մի քանի հարկանի դարակներ:

Տաք ողոր շերտատաան վերին մասում և լինում, հետևաբար վարդերի տաշին որդա դուրս յեկածներն աղելի արագ չղարշանան, անհրաժեշտ և նրանց տեղադրել զարակի ներքին հարկում և կերակրել աղելի քիչ, որինակ՝ 4 անգամ: Յերկրորդ որդա դուրս յեկածներին տեղադրել մեջանգի յերկրորդ հարկում և կերակրել 5 անգամ, իսկ յերրորդ որդա դուրս յեկածներին՝ ամենաղերին հարկում և կերակրել 6 անգամ: Վարդերին հիշալ նետվ գտադրելով և կերակրելով շատ կարն ժամանակում նրանք համատարվում են:

Վարդերի աղելի պարզ շինի համատարեցումը, ստորև բերում ենք պրոֆ. Պայարկովի կադման տախտակը:

Կենդանացման օրերը	Բարձրագույն ընկեր մասին	Կերակրումների քանակը						Ընդամենը կերակրումները
		I օր	II օր	III օր	IV օր	V օր	VI օր	
I օրը կենդանացման են	90 սմ	4	4	4	4	4	4	24
II օրը կենդանացման են	60 սմ	—	4	5	5	5	5	24
III օրը կենդանացման են	90 սմ	—	—	5	6	6	6	24

8. ՎՈՐԴԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՏ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վարդերը դարակների ժրա պետք և լինեն ազատ տարածված: Ազատ լինելու դեպքում ժաղի միջոցով աղելի լավ են դուրսլացնում և կողքերի շնչանցքերով աղելի լավ և կատարվում շնչատափյունը, նրանց դարգացումն ընթանում և կանոնավոր և աղելի առատ մեռաքս են տալիս:

Ին վարքան փնտառվար նեռեանք և առաջանում խիա պա-

հելուց, ժամանակնդ առաջին հասակներում, այդ յերևում և հետևյալ աղյուսակից, զորը բերում և Լաֆոնը 1901 թվին.

Ճեղք և պարանան	Խ ն ո մ ը ռ		Ստացված բոժոժի քանակը	Ցեղած մե տաքի առկայք
	1-ին շրջանում	2-րդին շրջանում		
Պատահական A	ազատ	խիտ	70	16,9
Բիփդալին պարան B	խիտ	ազատ	89	16,4
Վատ, ցեղի A պարան	ազատ	ազատ	70	16,2
B	ազատ	խիտ	68	15,4
C	խիտ	ազատ	48	15,6
D	խիտ	խիտ	45	14,5

Այս աղյուսակից պարզ յերևում և վորդերին խիտ պահելու ազդեցությունը բոժոժի բերքի և նրա մետաքսալիսի վրա:

Ըստ Մայոի վորդերը պետք և իրենց մարմնի մեծությամբ համեմատությամբ 3 անգամ ավելի տարածություն ընեն նա մեկ տուփից դուրս յեկած վորդերին տալիս և հետևյալ նորման.

առաջին հասակում 5 քառակ. մետր

յերկրորդ » 10 » »

յերրորդ » 20 » »

չորրորդ » 40 » »

հինգերորդ » 55—60 » »

9. ԿՅՐԻ ՆՈՐՄԱՆ ՅԵՎ ՍՆՆԴԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բոժոժի բերքի քանակը և վորակը մեծ չափով կախված և վորդերի սննդառությունից: Վորքան վորդերը լավ են սնվում, այնքան խոշոր և ծանր են լինում նրանց բոժոժները. վատ և քիչ կերակրված վորդերը թույլ են լինում և շուտ են հիվանդանում, իսկ բոժոժներն ել լինում են չափազանց մանր և անաբակ: Մեկ տուփ դրենան կերակրելու համար անհրաժեշտ և ըստ հասակների տալ հետևյալ քանակությամբ տերև.

I հասակում	4 կիւ	20 կիւ
II >	11 >	44 >
III >	36 >	108 >
IV >	108 >	216 >
V >	622 >	650 >
Ընդամենը	781 կիւ	1037 կիւ

Այս աղյուսակից յերևում է, Վորդի առաջին չորս հասակներում Վորդերին տրվելիք տերերը յեթե թողնենք՝ իր լրիվ հասունացածան ստանձանին հասնի, այդ դեպքում 158 կիւողրում տերերի փոխարեն կունենանք 387 կիւողրում տերեր հետևաբար անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել առաջին հասակներում կերի ողորդարձման վրա և կերն անտեղի չփչացնել:

Աղյուսակում հիշված 781 կգ թթենու տերերից Վորդերն ուտում են միայն 420 կգ, մնացածը մնում է նրանց տակը, Վորդեն խշտի: Բարձրարուսն և լրիվ ձևավորված թթենիներից յուրաքանչյուրը մեկ տարում կարող է տալ հետևյալ քանակությամբ պերե:

6 տարեկան հասակում	5 կիւողրում
10 >	15 >
20 >	25 >
30 >	50 >
50 >	80 >

Յեղնելով հիշյալ աղյուսակից՝ յեթե վերցնենք 20 տարեկան ծառ, Վորդը տալիս է միջին թվով 25 կգ տերեր, անհրաժեշտ է ունենալ 40 ծառ, Վորդովհետև մեկ տուփը կերակրելու համար պահանջվում է 1000 կգ տերեր:

10. ՎՈՐԴԻ ՀԱՍԱԿՆԵՐԸ

Առաջին հասակ.— Խնչպես արդեն տալիս է, Վորդի կյանքը բաժանված է 5 շրջանների, այսպես կոչված 5 հասակի: Վորդն իր կյանքի յուրաքանչյուր հասակում պահանջում է յուրահատուկ խնամք: Վորդերի արթնացման առաջին որն անհրաժեշտ է տալ 4—5 անգամ կեր: Յեթե մի տեղ Վորդերը խիտ են, ան-

ներածնալ եւ այնտեղ դնել մատուղ տերևս Վորդերն այդ տերևի վրա հալածվելուց հետո՝ պետք և վերցնել և դնել դարակի յեզրինս Ամբողջ տաաջին հասակում պետք և տալ ամենապակասը 4—5 անգամ կեր. յեթե շերամատան ջերմատեմանը 23—25° Յ. է, պետք և 7—8 անգամ կեր տալ:

Առաջին կերը ժամի 5-ին, յերկրորդը 8—9-ին, յերրորդը 12—1-ին, յորրորդը՝ 4-ին, հինգերորդը՝ յերեկոյան ժամի 8—9-ին. իսկ վեցերորդը՝ գիշերվա 11—12-ին: Վերջին կերն անհրաժեշտ և ավելի առատ տալ, վորովհետև հաջորդ կերը պիտի տրվի հետևյալ որը ժամի 5-ին, և այդպես շարունակաբար: Տները պետք և տալ հալասաքապան և պետք և խռատվել մի տեղ կուտակելուց. վորովհետև վորդերը կարող են մնալ կուտակված տերևի տակ և փչանալ:

Յերրորդ օրն արդեն վորդերը բավականին մեծացած են լինում. մաշկն սկսում և սպիտակել, ախորժակը ըսրձրանում և, հետևաբար թե տեղերը պետք և լայնացնել և թե ավելի տերև տալ, վորպեսզի քաղցած չմնան:


Չորրորդ օրն արդեն վորդերն ավելի յեն մեծանում և ավելի սպիտակում: Եթե շերամատան ջերմությունը նորմալ և և անուշոք կանոնավոր, վորդերի մաշկը դառնում և փայլուն, ախորժակը քիչ պակասում է: Վորդերը պատրաստվում են առաջին քունը մանկելու:

Այդ ժամանակ պետք և նրանց տակերը փոխել նակուկեն թղթով կամ տերևներով: Վորդերին տեղափոխել մօքուս թղթի վրա և տալ մեկ տուփին հինգ քառակուսի մնալ առանձնություն: Հինգերորդ որը նկատվում և, վոր վորդերը չեն ուտում և զլուխները բարձրացրած՝ անշարժ են: Դարող և պատահել, վոր մի թղթի վրա դառնված ըսրը վորդերը միասին չքնեն: Պետք և մի թեթե կեր տալ, վորպեսզի չքնած վորդերը սոված չմնան մինչև իրենց քնելը: Վորդերը քնելիս մնաքսի թեկ բաց թողնելով իրենց իրենց ամբացնում են այն առարկային, վորի վրա գտնվում են: Սա դուրացնում և արթնանալիս նրա մաշկափոխությունը: Եթե քնած վորդն իր տեղից անջատենք, նա յերկար ժամանակ տանջվում և մաշկից աղատվելու համար և հաճախ հնարավորություն չունենալով հին մաշկից աղատվելու՝ մահանում է: Եթե սխալմամբ քնած վորդը տեղից անջատվի, պետք և նրան դնել սղոցված կոշտ տախտակի վրա, վորտեղ նա վրա-

ներս ամրացնելով սղոցված տախտակի կողմությաններին, կամ մանր փշերին՝ ազատվում ե հին մաշկից:

Վորդերի քնած ժամանակ այլևս անրև չպետք և տալ, փորովհետև չեն ուտում:

Քնած վորդերի հանդիսար չպետք և խանդարել, դարակները չցնցել, եղի ուժեղ հոսանք չստեղծել շերտամատանը. այդպիսի դեպքերում վորդերը կարող են պոկվել իրենց տեղից և



Նկ. 25. Մակուկեն քղերի համեմատական չափերը:

մաշկը չփոխել, ուտել աջդ շրջանում որպիսության համար կարիք չկա պատուհանները բանար. դուռը բալական և որպիսության համար:

Ջերմությունն, ինչպես ասացինք, պետք և լինի 23—25° Ցելսիուսի. ավելի ցածր աստիճանում, իհարկե, հնարավոր և վորդերին պահել. սակայն արժնանալուց հետո՝ 4—5 արվա փոխարեն կքնեն 9—10—11 որ և նույնիսկ ավելի շատ:

Ի հարկէ, վորդի կշանքը յերկարացնելու մեջ շերամառանը վոր մի շահ չաւնի. զա միտաւ և Ամելի բարձր Զերմաստիճանում նուշնպես կարելի յն վորդերին պահել, նրանք կարող են դիմա- նալ, սակայն նորմալ և համարվում 23—25⁰ Բ: Ինչքան եւ վոր- դերը կարողանան դիմանալ բարձր կամ ցածր Զերմաստիճանե- րին, աշնուամենայնիվ Զերմության արագ յերկնջները վատ են ազդում նրանց առողջության վրա. հետեւաբար ցանկալի յն, վորքան հնարավոր և միատեսակ Զերմություն պահպանել: Պա- տի վառարաններէ միջոցով շատ հեշտութեամբ հնարավոր և ցանկալի միտրինակ Զերմությունը պահպանել:

Յերկարդ հաստի.—20—24 Ժամ անշարժ մնալուց հետո՝ վոր- դերն սկսում են շարժվել աջ ու ձախ. մաշկը ճեղքվում և դադաթից, Գլխի մաշկը դուրս և գալիս դիմակի նման, ապա գանդի ճեղք- վածքից նախ դուրս և գալիս վորդի կրծքի վտակները, հետո դրանց ողնութեամբ հետզհետեւ դուրս և գալիս և ամբողջ մար- մինը՝ հին մաշկը թողնելով կպած այն առարկային, վորտեղ նա քննել երա Մաշկափոխութեանից հետո վորդը միաւժամանակ մնում և անշարժ. կարծես հանգստանում և և սպասում և մինչև նոր մաշկը չորանա: Գիշ հետո սկսում և տերեւ փնտռել:

Գինից նոր արթնացած վորդի գլուխն ամելի մեծ և յերևում. սկզբում լինում և ամելի դորշ գույնի և ապա մուգանում և մաշկը լինում և մոխրագույն:

Վորդն ամելի դուրսաշարժ և դառնում, կարողանում և կենդիւն և յերկարել Այս մոմենտին վորդերն արթնացած որդա համեմատութեամբ 14 անգամ ամելի ծանր են լինում և 4 ան- գամ ամելի խոշոր:

Յերբ վորդերի մեծագույն մասն արթնացել և, նրանց վրա պետք և ծակտակն թուղթ փակել կամ տերևներ և սպասել մինչև վոր վորդերը համաքվեն վերջինների վրա: Յերբ թափականալով համաքված են, պետք և տեղափոխել նոր թղթի վրա. միաժամա- նակ վորդերի տակը փոխվում և: Գինից արթնացած վորդերին համաքելը և տեղափոխելն այնպես պետք և կատարել, վոր մանր պարտիաներ չստացվեն, այլ սպասել, վոր կեսն արթնանա, ապա նոր տեղափոխել. իսկ մնացած կեսն եւ արթնանալուց հետո նույն- պես համաքել և տեղափոխել:

Այսպիսով կատարել միայն յերկու պարտիա: Յեթն ըստ վորդերի արթնանալուն՝ նրանց շարունակ համաքել և կերակրել, կատարել պարտիայի անհամասարում, վորի բացասական կողմն-

քի մասին մանրամասն արդեն ասված է, Անթնացած վորդերին պետք է տեղափոխել նախորդ պատրաստված մաքուր թղթի վրա:

Առաջին նվազում հաժադած վորդերին տեղափոխել դարակի ներքին հարկի շրջանակի վրա, իսկ յերկրորդ նվազում հաժադածներին՝ յերկրորդ հարկի կամ վերևի հարկերը:

Վորդերի հաժադելուց հետո յեթե մնան մի քանի հատ հետամնացներ, պետք է մի առանձին տեղում խնամելով՝ կազմել հետամնացների խումբ: Շերտավազը պետք է ուշադրութեամբ քննի խալիները: Յեթե նրանց արանքում մեռածներ կան, այդ նշան է, զոր կերակրումը նորմալ չի գնում, զորեն ծանր հիվանդութիւն կա, զորն առաջացել է կամ սերմի անորակ լինելուց և կամ վատ պայմաններում պահելուց:

Վորդերը քան մանելիս և քնից արթնանալիս խորթակ շնն աշննում, հետևաբար նրանց պետք է շատ թեթև կերակրել: Հաջորդ որը նրանց ախորժակն ավելի չե բացվում. հետևաբար անհրաժեշտ է ավելի առատ կեր տալ և ավելի հաճախ տեղը նստացնել, զորովհետև նրանք զգալիորեն ունեն սր աճում են: Յերկրորդ որը վորդերն ավելի մեծ խորթակ են ունենում, իսկ չորրորդ որն արդեն խորթակը պակասում է և սկսվում է յերկրորդ քուշը: Ամփոփապես պիտի սկսել տակերը մաքրել: Յերկրորդ շրջանը ամենակարճն է: Այս շրջանում նուշնպես պետք է պահպանել 23—25՝ Յ. ջերմութիւն և քնելիս մեկ տուփի համար պետք է տալ 10 քսո. մեար ասարանութիւն:

Յերկրորդ շրջանում վորդերին պետք է տալ դարձյալ կրտստված տերևներ, սակայն ավելի խոշոր կտրատված քներով:

Յիրարդ հասակ.—Յերկրորդ քնից արթնանալիս պետք է կատարել այն բոլորը, ինչ զոր կատարված էր առաջին քնից արթնանալիս, այսինքն՝ ասկերը փոխել և նստացնել:

Վորդերն այս հասակում առանում են իրենց սովորական դուշնը: Լինում են սպիտակ, սպիտակ-սև ողակներով, սպիտակ-խալտաղետ, թուխ, սև խալտաղետ. դուռնչի թուխ դուշնը փոխվում է դառնում է մուգ շնկ. վորդն ավելի յերկարում է, վտաները և թաթերն ավելի ուժեղանում և ամուր են կաշում առարկային. վորդի քաշն առաջին քնի համեմատութեամբ քառապատկվում է. այս շրջանում պետք է պահպանել 22—24՝ Յ. ջերմութիւն:

Ուստիսութիւն վրա ավելի մեծ ուշադրութիւն պետք է

դարձներ Երբ քաժիկներէ եւ անձրիկներէ հետեանքով պատուհաններէ բանալն անհնարին եւ գառնում, պետք եւ ողափոխության համար զառաքաններում ըսց առաջացներ 6—8 անգամ կերակրելու փոխարեն պետք եւ կերակրել 4—6 անգամ՝ տալով ավելի առատ կեցւ։ Այս շրջանում աւելազն յերկու անգամ խշտիները պետք եւ մօքքել։ մեկը յերկուրդ որը, խոկ մշուսը քուն մտնելուց առաջ։ Վերջին անգամ խոտիները փոխելիս մեկ առաջին պետք եւ հատկացնել քսան քառակուսի մետր տարածություն 4—5-րդ որերին աստիճանաբար պետք եւ կերը պակասացնել։ 5-րդ որը նրանք մօնում են յերկուրդ քունը։ Այս քնի ժամանակ արդեն վորոշակի յերևում ե, թե ինչպես վորդերը մետաքսաթել են հանում իրենց բերանից եւ կտպում առարկային։ Քնից արթնանալուց յերևում ե, թե նրանց գցած մաշկը եւ թե խշտիների վրայի մետաքսաթելը։ Այս շրջանում կարիք չկա տերերը կարտտելու։ կարելի չե նույնիսկ փոքրիկ նյութերով կերակրել։ Հիվանդության սկզբնավորությունը, մանավանդ պերբրնան, այս շրջանում արդեն հաշտնաբերվում ե։

Զարդ հասակ.—Յերբորդ քնից արթնանալիս տնհրածեղս ե վորդերին նոսրացնել ե խշտիները փոխել այնպես, ինչպես նախորդ շրջաններում։ Վորդերը յերբորդ քնից արթնանում են ավելի մեծացած։ լինում են ավելի ուժեղ եւ առույգ։ Քնից արթնանալիս վորդերն ունենում են քիչ մուգ դույն, սակայն մեկ-յերկու կեր ուտելուց հետո՝ ստանում են իրենց սովորական դույնը։ Տերեր կարելի չե տալ նույնիսկ մանր նյութերով։ Խըտիները պետք ե հաճախ մօքքել։ Կերակրել որական 4—5 անգամ։ Առանց նյութերի տերեւով կերակրելու շրջանում վորդերը գրավում են 40 քաւ. մետր տարածություն, խոկ նյութերով կերակրելու շրջանում՝ քիչ պակաս, այսինքն՝ նույնիսկ 30 քաւ. մետր տարածությունն ել բավական ե։ Այս շրջանում վորդերը բավականին մեծ ախորժակ են ունենում, ուստի տերերը պետք ե տալ առատ եւ կանոնավոր, վորպեսզի վոչ մի վորդ տուանց կերի չմտ. դրա համար կերը աալուց հետո՝ պետք ե ստուգել ե վորտեղ պակաս ե, շրացնել։ Այս շրջանում 22—23՝ 8. Չերմությունը միանգամայն բավարար ե։ Ողը հաճախ պետք ե փոխել. անհրաժեշտ ե ունենալ կանոնավոր զինախլացիւ։

Զորբորդ շրջանում դրսում ցուրտ չի լինում ե հնաքաժար ե դռներն ու պատուհանները բաց պահել, որական մի քանի ան-

դամ վաւարանում փայտի ճյուղերով կամ առշերով բոց առաջացնել որոգիտութեան համար:

Հիմնդեղը հաստի.— Զորքորդ է վերջին քուշը տեսւմ և 36—40 ժամ: Արթնանալիս պետք և վարվել այնպես, ինչպես նախորդ շրջաններում: Այս քնից հետո վորդերը լինում են բազմաանին մեծացած, ակորթակը հետզհետե բարձրանում և, սկսւմ են ազահորին ուտել և առատ տերեխ կարիք են դրում. այլևս չի կարելի կերի քանակը վորդել. պետք և առաջ պահանջված քանակութեամբ:

Անհրաժեշտ և խշտիներն ավելի հաճախ փոխել: Գրի շերմաթյունը բարձր լինելու դեպքում շերտատառնն արդեն վաւարանով առաջացնելու կարիք չի դրւմ:

Ոգի փոփոխութեան համար անհրաժեշտ և պատահաններն ու դուռը միշտ բաց պահել:

Յեթի վորդից, մնացորդ տերեխից առաջացած խոնավութեանը և շերտառների արտաշնչած աղը մօտն շերտատառն մեջ կուտակված, վորդը կթուլանա և անպայման յենթակա կլինի դանադուն հիվանդութեաններին:

Կուտակված խոնավութեան հետեանքով կուտակման մեծ քանակութեամբ խմորում խշտիների մեջ, վորը նույնպես պատահաւ և դառնում հիվանդութեան: Հիվանդութեաններն առաջ են դալիս նույնպես վորդերի խիտ ազահելաց: Ինչպես հայտնի չե, վորդերը շնչում են ստեղծաներով: Յերը վորդերը շատ խիտ են լինում, այս անցքերը ծածկվում են, վորով խոնավութեամբ և շրջառութեանը:

Հաջող բերք ստանալու համար այս բոլոր անհաջող պայմանները պետք և վերացնել, կերտուելով հետեյալ կանոնները.

1. վորդերը պետք և պահել նոսր.

2. շերտատառն շերտատառնները պետք և լինի 23—25° Մ.

3. շերտատառնները պետք և ունենալ վենտիլացիոն որոգիտութեան համար.

4. շերտատառնները պետք և լինի լուսավոր.

5. չպետք և խշտիները յերկար պահել դարակներին վրայ, ալ հաճախ փոխել և մաքրել խմորումից դրուխտալու համար.

6. թրջված տերեխ չաւր:

Վերջին շրջանումն և, վոր հիվանդութեանը հայտնաբերվում և ծավալվում եւ Գլխավոր վարակման շրջանը հիմնականում և

Ինչպես արդեն ասված է, ուսանողին հասանելուս վերջերին պետք է կերակրել ավելի մատղաշ և փափուկ տերեւներով, Վարդեսպի կերի ավելի մեծ խնայողություն լինի, անհրաժեշտ է բնից հանաչած և կամ կտնոնավոր տնած վոստերի կողքերից դուրս յեկած անպետք, փաքրիկ վոստերն ետել և նրանց վրայից պոկելով տեղիւ տալ շերտաւորին, Յերկրորդ և յերրորդ հաստիներուս, յերբ նույնպես կերի տաանձնապես մեծ պահանջ չի գաղտնիւմ, նույն նպատակով պետք է ետել մասի փոքրիկ վոստերը կամ գլխավոր և կտնոնավոր վոստերից դուրս յեկած յերկրորդական փոքրիկ վոստերը:

Չորրորդ և հինգերորդ հասակներուս, յերբ կերի տաովել մեծ պահանջ է գաղտնիւմ, պետք է ետել մնացած ըստը կտնոնավոր վոստերը: Ինչպես արդեն ասված է, գրենան վաղ արթնացնելն ունի յերկու հիմնական պատճառ. 1) խնամքը չսւշտնա և չհանդիպի ամուսն շողերին և 2) մինչև տերեւի կոշտանալը շերտմի խնամքն արդեն ավարտված կլինի: Վարդեսպի ավելի պարզ լինի կերակրուլն ուշացնելու բացասական կողմերը, ստորե բերուս ենք հետևյալ աղյուսակը, վորի փորձը կատարված է չինական տեսակի նմանամամբ:

Արթնացման ամսաթիվը	վորդի միջին ծանրությունը	մեկ կիւտի մեջ յե- ղած բաժոժի քանակը
ապրիլի 27-ին	4 գրամ	532 հատ
մայիսի 14-ին	3,63 >	596 >
հունիսի 11-ին	3,80 >	685 >
հունիսի 26-ին	3,43 >	701 >
հուլիսի 22-ին	3,00 >	724 >
սեպտեմբերի 22-ին	3,00 >	780 >

Այս Թվերից պարզ յերևում է, վոր վորքան ուշանում է վորդի խնամքը, այնքան Թույլ և մանր բոժոժներ են առլիս, վորովհետև բացի շերտաւորմանի բարձր լինելուց, տերեւի մեջ հետդիտեն պակասում են սպասակար նյութերը և, ընդհակառակը, անպետք մոտերն ավելանում: Այդ աթիվ շատ փորձեր են կատարված, բայց ըստրն էլ նույն արդյունքն են տվել:

Վայրի Թթնուս տերեւը Թե ավելի նուրբ է և Թե ավելի գլուխամարս ու աննդարար, բայց քիչ տերեւ է առլիս: Ընդհան-

բազմա յիշելով վերահիշյալ հասակներից՝ խորհուրդ և ուղ-
ղում վորդերին փոքր ժամանակ խնամել վայրի տերևով։ Վայրի
թթենու տերևով սնված վորդի մեծաքանակ լինում և ափսիս նուր-
բայց վարժենալ տալովստոված ծառն ափսիս առատ տերև և տա-
լիս, այդ խել պատճառով վորդերին վերջին հասակներում խնա-
մում են պատվաստած թթենու տերևով։

Շերամի առաջին և յերկրորդ հասակների համար հավաքած
տերևը պետք և լցնել և աղաղակել կաղաֆերով կամ սփռացով։
Տերևը հազովի մեջ լցնելիս չպետք և սեղմել, վորպեսզի չհզմվի
և չառաքանա։

Սփռացը կամ հազովը լցնելուց հետո՝ պետք և բարակ շեր-
ամով սափնը տեղում փռել սափանի վրա և յերբեմն խառնել, վոր-
պեսզի չառաքանա։

Անձրեռային յեղանակներին տերևը շերամատան քերելուց
հետո պետք և լցնել սափանի մեջ, թաղնել փռած դրուխյամբ
աչնքան, մինչև խնամովությառն ամբողջությամբ կծծվի, վորքից
կետո միայն կտրելի յե կերակրել վորդերին։ Իսկ տերևը ճյուղե-
քով պոկած լինելու դեպքում՝ ճյուղերը դնել սդի հասանքում ջա-
բանալու համար։ Ծածաքնելուց հետո կերակրել վորդերին։

Անտառային վորդերին թաց տերև չպետք և տալ Այն
դեղքում, յերբ տերևը թաց և և կամ ժամանակավոր նեղությառն
և դրացվում, պետք և իջնցնել շերամատան ջերմաստիճանը, վաղ-
պեսզի վորդերը շատ քաղց չպահեն։ Շերամներին կտրելի յե կե-
րակրել թե առանց ճյուղերի տերևներով (հատ տերևով) և թե
ճյուղերով։

Շաանը միշտ ևլ հատ-հատ տերևներով են կերակրում. դա
իհարկե, իզուր աշխատանք և խլում և բացի այդ՝ ճյուղերով կե-
րակրելն սննի հետևյալ առավելությառնը։

1. Վորդերը յերբեք չեն նստում խոնավ խալիների վրա,
այլ լինելով ճյուղերի վրա՝ շարունակ ուտում են թաքմ, չկեղ-
ատված տերև։ Հիվանդացած և մահացած վորդերը մնում են
ներքևում, իսկ առողջներն ափսիս վերև, վոտերի վրա։

Նրանք վոտերի վրա դառնելով՝ ափսիս յեն ոգավում մա-
քուր ողբի, վորովհետև աղապնչած անխաբի՝ դադն, իջնուծ և
ներքև։

2. Հնաքավոր և լինում ամբողջությամբ ոգառաքածի տերևը
վորդերին հատ-հատ տերևով կերակրելիս փխնում և տերևի մաս
35%-ը՝ գառնալով խլաի։ Իսկ ճյուղերով կերակրելիս նախ, տե-

ընդ ջիշ և կնդատւում և յնրկըորդ՝ համարյա ամբողջ տերեւներն
սւտում են:

Թթենին ավելի առցիոնալ ոգտազործելու համար անհրա-
ժեշտ և հյուղերը միանգամից կտրել ծառից և վոշ թե հյուղերի
վրայից նախ՝ մանր ժոտերը կտրել, տպա՝ ամբողջ հյուղը:

Վերջի ն անով ոգտազործելիս՝ ծառը կրում և կրկնակի
քսաւ:

12. ՎՈՐԴԵՐԻ ԵՆԱՄԻՐԸ ՄԱՇԿԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Մաշկափոխության ժամանակ վորդերին կերակրելը պետք
և դադարեցնել, հակառակ դեպքում շնրամատանն առաջանում և
խոնավություն և ծանր ող Բացի այդ՝ կերակրելիս քնած վոր-
դերը կարող են անհանգստանալ, վորով և կգծվարանա նրանց
մաշկափոխությունը:

Վրջան եւ վոր կանոնավոր հիմքերի վրա դրված լինի
վորդերի հավասարեցման գործը, այնուամենայնիվ վորդերը միա-
տին չեն քնում:

Արթուն Թաղթի վորդերին սոված թողնել չի կարելի. այդ
իսկ պատճառով նրանց պետք և շարունակել կերակրել, միայն շատ
մեծ գլուխությամբ, վորպեսզի քնածները չանհանգստանան: Դրա
համար եւ ինչ հասակում եւ վոր լինի, պետք և կերակրել հա-
տերևով և վոշ թե ժոտերով, վորովհետեւ ժոտերը քնածների
վրա ընկնելով՝ կարող են նրանց ճնշել, անհանգստացնել և
նայնիսկ քնասել:

Պնած վորդերը մնում են անշարժ: Նրանք հենվել-ով կնգծ
վտաների վրա՝ իրանի վտաները, գլուխը պահում են բարձր:
Մաշկը փոխելուց հետո՝ նրանք սկսում են դանդաղ շարժվել,
բայց դարձյալ ընդունում են նախկին դրությունը, այս անգամ
աջակիս ասած նրանք հանգստանում են: Հանգստի այս դրու-
թյունը տևում և 2 -3 ժամ, վորից հետո սկսում են կեր փռնա-
ռել: Յնթե պարտադիր վորդերի խնամքը տարված և հիշա և
յիթե վորդերն առողջ են, քնից հետո պետք և լինեն միաշափ:
Խշտների մեջ չպետք և լինեն վոշ մեռածներ և վոշ եւ հիվանդ-
ներ: Յնթե թեթե փշելու լինենք արթնացած վորդերի վրա,
նրանք միաժամանակ պետք և շարժեն իրենց կուրծքը:

13. ՇԵՐԱՄԱՏԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹԵԱՆ ԶԱՓԸ ՅԵՎ ՎԵՆՏԻԼԱՅԻԱՆ

Շերամի մեջ առաջացած նյութերի փոխանակման հետեւում, շերամատան ողջ խոնավանումն է:

Վորովհետեւ տերեխի մեջ խոնավությունը կազմում է 65—70 ասիս, վարդը տերեխն ուտելուց հետո՝ իր մաշկի ծակոսթիւնների միջոցով գոլորշիացնում է սառածութեամբ կուտակված ալդ ավելորդ քուրը: Շերամատան խոնավությունը պետք է լինի 60—65%: Վերականգնող պարզ լինի խոնավության և չոր ողի ազդեցությունը, ստորեւ բերում ենք պրոֆ. Պայարկոֆի հետեւյալ աղյուսակը:

Ձգի սառածութեան	խոնավութեան քանակությունը հասանելի	խոնավութեան քանակությունը հասանելի	խոնավութեան քանակությունը հասանելի	խոնավութեան քանակությունը հասանելի
1. 2 ուր	3,51	1,84	0,28	15,2
3. Նորմալ	3,75	1,96	0,31	16,7
2. Ծոռով	4,10	2,07	0,34	16,4

Իսկ յիժի շերամատան խոնավությունը նորմալից ցածր է, անհրաժեշտ է հատակին շուր ցրտել կամ թրջած սալմաններ կախալ շերամատան ներքո՝ խոնավություն առաջացնելու համար:

Լույս.—կույսը խոշոր նշտակություն ունի՝ վարդերի համար, նրանք արեւի հառազայթների ուղղակի ազդեցությունից խուսափում են:

14. ՎՈՐԴԻՆԻ ՑԱԽ ԲԱՐՁՐԱՆԱԼԸ

Հինգերորդ հասակի վերջում վարդերի ախտածակը հետզհետեւ պակասում և և նրանք ակտում են հասունանալու: Հասունացած վարդերի ախտածակը պակասում է, մարմինը փոքրանում, մաշկում և իր սառածութեան կերի մեացորդներից: Հասունացած վարդի մարմինը դառնում է թափանցիկ և չորչորուն՝ վարովհետեւ սառածութեան լինում է միտնգամայն մաքրված, իսկ մեռածսի գեղձերը լրիվ դաբաղած:

Դեղին վարդերը դեղմադույն են դառնում, իսկ ուղիտակները՝ սպիտակադույն (կաթնադույն):

Հասունացած վորդի բերանից ծորում և մեղաքսաթիւը և տեղ և վարդնում բոժոժ հյուսնելու համար: Յախ բարձրանալուց առաջ՝ վորդն արտաթորում և մի քանի կաթիլ դեղնա-
գույն հեղուկ: Դա աղաքույց է, վոր ստամոքսում և աղիքներում ալիս վաշխն էլ ձեռքեր: Բոլոր վորդերը միաժամանակ չեն բարձրանում ցախ: զբա համար ևլ պեւք և շարունակել կեր տալը, վորպեսզի հետամնացներն ևլ հասունանան և ցախ բարձ-
րանան: Եկրամասան ցերձուխուքը պեւք և լինի 21—22° Ե. պեւք և ուժեղացնել սղափոխությունը:

Յեթի վորդերը հաճախոր են պահում և ուսող են, 2—3
որդա բնթացքում բոլորն
ևլ ցախ են բարձրանում:
Յախ գնելու հիմնական նը-
պատակն է՝ ստեղծել հար-
մար միջովայլ, վորտեղ
շերամի վորդը հաբութո-
րություն ունենա հյուսել
իր բոժոժը: Յախ չղնելու
կամ անհարմար ցախ գնե-
լու դեպքում վորդերը բարձ-
րանում են պատերի, սյու-
ների, առաստաղի վրա և
կամ ուղղակի խշտիկների
մեջ են հյուսում բոժոժը.
զբա շնորհիվ բոժոժը բոլո-
րովին կարցնում և իր ձեն
ու վորակը և վոր պլաս-
վորն և, վորդն անտեղի վո-
րոնումներ կատարելու հե-
տեանքով կարցնում և մեծ
քանակությամբ մեղաքս:



Նկ. 26. Ազիլ բոժոժներով

Յախերը կարող են լինել
յերկա. ախլի՝ բնական և արհեստական: Բնական ցախերի թվին
են պատկանում այն բոլոր բույսերը, վորոնք ունեն բազմակա-
նին նյութավորում և զուրկ են հոտից ու վոլերից: Հայաստանի
պայմաններում զոքածածական են՝ ալեւուկը, չխնին, կաղնու
հյուսերը, լոբու և սխսիկ հորացած ցողունները, պանդղը և այլն:
Ղորպես արհեստական ցախը նդունված են Դավթիկայի սխսիկի

ցախերը, վոր պատրաստվում են հետեյալ ձևով. բարակ սյու-
զերն ամրացվում են 3 ամ հասաւթյուն ունեցող իրար զուգու-
հեռ զույգ ևողերի վրա: Զողերի հետաձորությունը ճնկը մյուսից
լինում է մոտ 3 ամ: Հենց այդ ևողիկների արանքում շերտով
հյուսում է իր բոժոժը: Կա նույնպես մի այլ սխառեմ արհես-
տական ցախ, վորը դառնալի է, պատրաստվում է հետեյալ ձևով.
յերկու տախտակյա շրջանակներ ամրացվում են միմյանցից
30 ամ հեռաձորության վրա անցնող առանցքի միջով: Յերկու
շրջանակների միջև ընկած տարածությունը ևզված է լինում
շողագտանքով, վորոնք և բոժոժ հյուսելու հիմքն են կազմում:
Վորպես արհեստական ցախ կարող է ծառայել նույնպես տաշկը:
Բոժոժ հյուսելու ժամանակ շերտաւորումը պետք է ապահովված
լինի վեհաթիւղայով: Յեթն կերակրումն ընթացել է նորմալ
յերեքից չորս որվա ընթացքում վորպէ հյուսում է բոժոժը: Հե-
տաւանց վորդերին պետք է առանձնացնել:

Ծախերը պիտի այնպես դնել, վոր հնարաւոր լինի կերակ-
րել հետաւանց վորդերին. ցախերի փնջերը պետք է խիտ չլինեն.
նեղվածք լինելու պատճառով վորպէ բոժոժ հյուսելու համար ող-
տագործում է ցախի միայն վերին մասերը: Բացի գրանից՝ բո-
ժոժները լինում են մանր, ամէն և զույգի տակաւը բարձր:

Բոժոժ հյուսելու ժամանակ վորդին չպետք է անհանգստաց-
նել, իջարժել ցախերը, հակառակ դեպքում վորպէ թողնելով
սկսած աշխատանքը՝ սկսում է վորոնէլ նոր տեղ, վորի ընթաց-
քում կորցնում է մեծ քանակությամբ ժեւաքս. հաճախ էլ առանց
բոժոժ հյուսելու՝ ձեակերպվում է հարսնուկի: Բոժոժի վորակը
խոշոր չափով կախված է ցախի տեսակից, նրա դնելու ձևից և
ժամանակից. վորդերի դեռ չարքորդ հասակից անհրաժեշտ է
պատրաստել ցախերը՝ հովաքել չարացնել, կապել փնջերով և այլն:

Ծախերը պետք է դնել այն ժամանակ, յերբ վորպէ հասու-
նանում է և անհանդիսա սկսում է տեղ փնտռել, բոժոժ հյուսե-
լու համար:

Ծախը պետք է դնել ճիշտ ժամանակին, հակառակ դեպքում
վորպէ տեղ փնտռելու ժամանակ բաց է թողնում իր միտաքսա-
թիւը, վորն իզուր կորչում է: Ծախը պետք է դնել դարակների
ցողերից, ապա գարակների մեջ զուգահեռ շարքերով շարժե-
լաքցից 30 ամ հեռաձորությամբ:

Բոժոժ հյուսելուց հետո՝ վորպէ 3—4 որվա ընթացքում
ձեւօրեւում է հարսնյակի, իոկ վերջին 10—15 որում թիթեւի-

Մշակութային ներքին պայմաններում խնամոված Բազումդի ցեղի վերջը մինչև թիթեա դառնալը բոժոժ էյուսուած է 31—22 ուրվա ընթացքում: Բանի դեռ վերջը չի մեղհերպիւն հաքանյակի, բոժոժի քաջը պակասուած է շատ աննշան քանակով: հաքանյակի մեղհութիւնաց հետո՝ քաջի պակասելն զգալի յն դառնուած:

Բոժոժները քախից պետք է հալածել: էյուսուելու ոկղրից հալովելով 12-րդ արը, կուս էյուսուելուց հետո 9-րդ արը: Յեթի դառնիներէ վրա խնամք է տարված, առաջին հերթին պետք է հալածել ներքին հաքիլ: Բոժոժները, վերջինստ յիթի բոժոժ հալածելն սկսվի վերին հարկից, այն մամանակ խշտիները, մահաքոժ վերջերը կարող են թափվել ներքևում գտնված բոժոժների վրա, կեղտոտել և անպետքացնել նրանց:

Բոժոժը հալածելուց հետո յերբեք հասա շերտով փակել չի հարելի, այլ պետք է բարակ շերտով փակել ստվերոտ և մաքուր տեղ:

Բոժոժը հալածելուց հետո պետք է մաքրել նրա վրայի մաքուրը՝ բլաղը (լամբակը): Վերպեսպի բոժոժը չիլանա չիկդտաովի, տնիբաժնիտ և բլաղը մաքրելու հետ զսաղընթաց տատնանացնել թույլ էյուսոված բոժոժները, այլ կերպ դրանք կիկդտոտեն մաքուր բոժոժները, վերով և կցածրանա բոժոժի ընդհանուր արժեքը, վերանը:

Բոժոժն անպայման պետք է տեղափոխել կողմերով կամ ծակառկեն արկղներով: Պարկերով, շորով, սալաններով և այլն, բոժոժ տեղափոխել չի թույլատրվում:

ԳԼՈՒԹ Ե-ԲԴ

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ^{*)}

1. ՊԵՐՐԻՆԱ

Պերրինա հիվանդությունը շերամի ամենատարածված հիվանդություններից մեկն է, բայց պայքարի միջոցներ լինելու շնորհիվ՝ զարմել է անվտանգ։

Պերրինա հիվանդությունն իր առավել զնաարար ներգործործությունն անհեղեղ է XVII—XVIII դարերում. միայն Ֆրանսիայում, ուր տարեկան մթերվում էր 26 միլիոն կիլոգրամ ըստ, 12 տարվա ընթացքում մթերումն իջնում է 5,5 միլիոնի։ Հիվանդությունը Ֆրանսիայից տեղնում է Իտալիա, Իսպանիա, Ժամակատան, Հնդկաստան, Չինաստան և այլն՝ ստանալով այնպիսի համաճարակային բնույթ, զոր հույսիսկ սպառնում էր շերամապահությունն իսպառ վաշխացնել։

Այդ ժամանակներում իր մանրնարանական աշխատանքներով մեծ հաշակ էր վայելում Լ. Պաստյուրը. դրա համար նա ֆրանսիական կառավարությունը պերրինա հիվանդության պայքարի գործը հանձնում է Լ. Պաստյուրին։ Վերջինս հինգ տարի շարունակ դրազվելով այդ հիվանդությամբ՝ հաջողում է զանեղ պայքարի միջոցները։

Շերամապահական գրականության մեջ պերրինա հիվանդության անունը մտցված է կատարճաժի կողմից։ Նա յն առաջին անգամ գիտականորեն նկարագրել այդ հիվանդությունը։

Շերամի վորդը կարող է վարակվել պերրինա հիվանդությամբ թե վորդ ժամանակ՝ կերի հետ ընդունելով պերրինա հիվանդության սպորը և թե նվից դուրս դառնալով իր մորից ժառանգարար ստանալով սպորը։

^{*)} Հիվանդությունները նկարագրելիս մեծ ժառանգողով նախ Զ. Պ. Պանկով-ի «Курс практического животноводства» հեռանդրից։

Հիվանդութիւնը ժառանգաբար անցնելու դեպքում դրե-
նայի արթնացումը կատարվում է աննորմալ և անհամասար:
Մէյն դեպքում, յետոյ կենդանացած վորդերի վարակման առո-
նանը լինում է շատ բարձր և ազգում է վորդի առաջիկ կարեւոր
որդանների վրայ, վորդը մահանում է դարգացման հետո առաջին
որերին:

Յեթն վարակումն ավելի ցածր աստիճանի յն, և վարակվել
են վոչ այնքան կարեւոր որդանները (ազիքները, սիրաւ, նյաւ-
դային սխտեմը), վորդի դարգացումը կարող է ավելի առաջ
դնալ, բայց նրա դրութիւնը լինում է նորմալից ցածր, և նա
իր դարգացման ժամանակ առողջ վորդերից հետ է մնում: Հետ
մնալն առանձնապէս աշխի յն ընկնում մաշկափոխութիւն ժա-
մանակ: Հիվանդութիւնն ավելի դարդանալիս՝ վորդն սկսում
է լզարել, փոքրանալ: Այդ ժամանակ որդանների քայքայում
կամ նեխում չի նկատվում, ալ վորդն ուղղակի մաշվում է: Նրա
նիհարած մարմնի սեղմենտները ներս են սեղմվում մեկը մյուսի
մէջ: Մաշկը համախ լինում է թուլահաղաղայն: Հիվանդացած
վորդերի մէ մասը քաշվում է դարակի յեղրները, վորանդ և մա-
հանում է: Ավելի վթույները, վորոնք շարժվելու ընդունակ չեն,
մնալով խոտիների մէջ՝ մահանում են և այդպիսով դառնում
առողջ վորդերի վարակման աղբյւր:

Ինչպէս թույլ է վարակված վորդը, այնքան և էլ ուշ է մա-
հանում: Առաջիկ թույլ վարակվածները կարող են հասնել միան-
դամայն հասունացման աստիճանին, հյուսել բոժոժ և դառնալ
հարսնյակ:

Պերրինա հիվանդութիւնն դեպքում կարելի յն հանդիպել
հիվանդութիւնն աւորեր աստիճանների, ամենատեղից մինչև
ամենաթույլ վարակվածների: Յերը վորդերն առողջ են լինում,
դարդանում են միանգամայն համասար. մաշկափոխութիւնն
սկսում են միասին և վերջացնում միասին. իսկ այդ բանը զգը-
խալօր պայմանն է վորդերի համար՝ միասին բոժոժ հյուսելու:

Պերրինայով վարակված կերակրումներն^{*)} իրենցից ներ-
կայացնում են դարգացման աւորեր աստիճաններում դանդա-
վոր դերի խառնուրդ: Պերրինա հիվանդութիւնն հիմնական նշան-

*) Այստեղ, ինչպէս և հետագայում ովերակրումներ, «կերակրում» բա-
ռերը դորժածում են առերեւն «покорен», «поборен» բառերի իմաստով,
վոր նշանակում է շնորհաւորում կերակրող վորդերի ամբողջութեան՝ դա-
րան:

ներքից մեկը հաճախապես և վորդերի շահապաշտ անհոգաբար լինելը: Պերբինայով վարակված վորդերի յերկրորդ նշանը նշանաց մարմնի վրայի սև մանր բծերն են:

Հետ պրոֆ. Պայարկովի՝ բծերը՝ ողակված են դեղնափուն չբջանակով, իսկ ըստ Վան-Շեր-Յուստի՝ պերբինայով հիվանդացած վորդի մարմնի սև բծերն



Նշ. 37. Պերբինայով հիվանդ վորդերի յեղ բերանների արտափն Նշանները

ցած վորդի մարմնի սև բծերն անպայման պնդին չբջանակով ողակված չեն լինում: Նրա հարձիքով հիշյալ սև բծերն առաջանում են թափանցիկ կուտիկուլայի մաշկի տակ սպարների կուտակումից: Պայարկովին այդ բծերի դրսևացումը վերագրում և հյուսվածքների քայքայմանը:

Այդ սև բծերը դրսևանում են վորդի մարմնի ըստ մոտերում, բայց ափսիս չառ՝ կեղծ վստենքի շուրջը, շնչանցքների մոտ, կամ այլ կեղծ ասած՝ մարմնի աջնպիսի մասերում, ուր արջան

չբջանառակթյունն ափսիս թույլ և կտաարվում, և վարանդ պերբինայի սպորն իր վարդայման համար առավել նպատառվոր պայմաններ և դառնում: Վորդերի մարմնի այլ մասերում, ինչպես կրծքի և փորիկի սեղմնեղանքում, գլխում և մարմնի մյուս մասերում բծերն անհամեմատ ուշ են դրսևանում: Կրծքի վրա ափսիս շուտ և յերեսում, քան փորիկի: Պատահում և, վրա վարդի մարմնին այդ բծերով ծածկված չի լինում, բայց վարակված և լինում պերբինայով: Հիվանդագիտի բծերը յերեսի չպեսք և խառնել պատահական բծերի հետ: Վերջիններս մաշկափոխակթյուն ժամանակ հին մաշկի հետ անհեռանում են: Բացի դրանից, պատահական բծերը վորդի մարմնի վրա դասավորված են անկանոն: Սերբեն հիվանդագիտի բծերն այնպես են դասավորվում վորդի մարմնի վրա, վրա կարծես պղպեղ շաղ ափսիս լինի: Չրա համար էլ այդ հիվանդակթյունն իր անուան ստացել և *pebro* — պղպեղ բառից:

Յերբ վորդերը պերբինայով վարակվում են ձննդանացումից հետո, ըստ վարակման ժամանակի և ինտենսիվության՝ հիվանդակթյունը կարող և ընդունել ըստբովին այլ բնույթ: Մյն

զեպտում, յերբ վորդը վարակվում և հինգերորդ ջրջանում (հաստկում), նա կարող և վոչ միայն հասունանալ և բոժոժ հյուսել, այլ նույնիսկ բոժոժներն արտաքինից հնարավոր չի լինում զանազանել նորմալ և առողջ վորդերի հյուսած բոժոժներից, Իսկ այն զեպտում, յերբ վարակումը տեղի չեն ունենում յերբորդ կամ չորբորդ հասակներում, ապա հիվանդության ներկայությունն ապացուցող նշանները յերևան են գալիս և բացի դրանից՝ բոժոժներն ևլ անհամեմատ ավելի թույլ են լինում: Յեթն հիվանդությունն առաջ և գալիս ավելի փոքր, այն և, առաջին, յերկրորդ հասակներում, այդ դեպքում հիվանդությունն առաջն լուրջ բնույթ և ստանում:

Պերրինա հիվանդությունն ավելի շատ վատնալու և այն տեսակետից, վոր անցնում և ժառանգաբար, և արտաքուստ միանգամայն նորմալ դրենան կարող և իր մեջ պարունակել այդ հիվանդության սպորները:

Ինչպես վերևում ասացինք, պերրինա հիվանդության նշանները կարող են մշտապես չերևալ: Պերրինա հիվանդությամբ վորակված վորդն անսխալ կերպով կարող ենք միկրոսկոպային քննության միջոցով վորդել:


Յեթն վարակված վորդի մարմինը արտքենք սանդի մեջ և ասացված մասսայից վերցնենք մի կաթիլ ու միկրոսկոպի տակ դնենք, կտեսնենք բազմաթիվ մանր, ձվաձև ու փայլուն մարմնիկներ: Դրանք հանդիսանում են հիվանդությունն առաջացնող պարադիտի սպորները և կոչվում են *Noëma bombycis*:

Պերրինա հիվանդությունն առաջացնողը պատկանում և ամենապարզ, միաբջիջ կենդանիների զտին՝ *sporozoa* կոչված խմբին: Հիվանդության պարադիտն իր զարգացման վորոշ ջրջանում վեր և անվում սպորի, վորը պատած և լինում ամուր և հաստ պատյանով, ապրում և բավակառի յերկար, լայնությունը լինում և 0,002 միլիմետր, իսկ յերկարությունը՝ 0,006 միլիմետր: Ունի լույսը բեկելու ունակություն: Մյու իսկ պատռառով միկրոսկոպի տակ դիտելիս փայլուն և յերևում: Ինչպես արդեն ասացինք, պատյանը բավակառի հաստ և: Նրա մեջ պտնվում և բազմակորիզավոր պլազմային մարմնիկը: Կորիզները 7 են, փորոցից 4-ը հենդանի յեն, իսկ 3-ն անկենդան:

Պրազման սպորի պատյանի տակ ընկած ամբողջ դառաջկառաբանությունը չի բռնում, այլ միայն մի մասունք և: Կենդանի կորիզները դասավորված են պլազմայի միջին մասում:

Մպորի ներքին ամրողը յերկարությամբ ողակված և բևեռային կապուսուլով (полярная капсула), վորի մեջ գտնվում և զսպանակաձև թելիկը:

Անկենդան հորիզներից 2-ը գտնվում են պատյանի վրա և կոչվում են պատյանի հորիզներ, իսկ մեկը գտնվում և բևեռա-



Նկ. 26. Պերիկարի մարմնիկները - մարմնիկները միկրոսկոպային պաշտում

յին կապուսուլի վրա և կոչվում և բևեռային կապուսուլի կորիզ:

Զսպանակաձև թելիկը բաղականին յերկար և. նա սպորի յերկարությունից 8 անգամ ավելի յերկար է: Սեթև սպորն ընկնում և իր զարգացման համար նպաստավոր միջավայր, ադիքային նյութի ազդեցությամբ զսպանակաձև թելիկը դուրս և շարժվում: Պլազմային մարմնիկը, վորը հանդիսանում և պարագիտի սալմը, դուրս և դալիս բացված անցքից. նա ունենում և 0,0005—0,0015 միլիմետր տրամագիծ, շարժվում և ամիդրանման և բազմանում և պարզ բաժանմամբ:

Ընդունված և հիշյալ ամիդրաձև մարմնիկն անմիանել պլազման: Պլանոնտն սկզբում բազմանում և ստանձնում, ապա ստամոքսի պատերից անցնում և արյան մեջ, ուր նույնպես բազմանում և և արյան միջոցով տարածվում և վորդի մարմնի բոլոր մասերում:

Պլանոնան ընկնելով հյուսվածքներէ բլիշներէ մեջ՝ կարց-
նում և իբր ամիրորանէ շարժելու ունակութիւնը: Զարգաց-
ման հիշալ ստադիայում ընդունված և նրան անվանել մետաբո-
լիզմը: Մերոնսը քննարկելով հյուսվածքը՝ սկսում և նախկերպիւ զա-
նայն սպորթի շիվանդութիւն սկզբից մինչև լրիվ սպորթի նա-
խկերպութիւն: Նպաստաւոր սպանմաներում՝ ըստ Տիրոմիքովի՝ տե-
վում և 4 տը: Այն դեպքում, յերբ սպորթները նախկերպում են
միջնադէքի պատերի մեջ, աղիքի պատերը քայքայվելով կարող
են ընկնել աղիքի ներքը և անուհեակ խառնվելով մարմնի
տեքներին՝ կղկղանքի հետ լողաւս են գալիս: Սպորթը դուրս գալով
կարող և ընկնել տեքերի վրա և վարակել շերտները, յիթե
նրանց կերակրվել են նման տեքերով: Մահացած վորդերի քայ-
քայված մարմնի սպորթները նույն նկարով կարող են վարակման
նոր աղբյուր հանդիսանալ:

Պարադիքը պլանոնա վիճակում կարող և ընկնել նույնպէս
եզ վորդի մարմանի մեջ և այդպիսով վարակել միւրը: Վարակ-
ված միւրն իրենց մարմնի մեջ ունենալով սպորթ՝ հենց տալիս
հասակից վարակված են լինում: Առ ժառանգական վարակում է:

Պատայորն իր մի շարք փորձերով հաստատեց, վոր սպորն
ընկնելով չոր տեղ և չարանակ սղի հետ շրման մեջ լինելով՝
կարող և իր դոյութիւնը պահպանել 2—3 ամիսից վոչ ավելի:
Բայց պետք և ասել, վոր առավել նպաստաւոր վայրում խոնավ
տեղում նո իր դոյութիւնը կարող և պահել տարւց եւ ավելի:

Պերրինա հիվանդութիւն դեմ պայքարի հիմնական միջոցը
հանդիսանում և՛ յմուշտաբել, վոր վարակումն անցնի ժառան-
գաբար: Դա հնարավոր և Պատայորի կողմից առաջարկված և մինչ
որս տարածված ցելյուլար գրենայի պատրաստման միջոցով,
վորի ժամանակ ամին մի եզ թիթեռ մեկաւտցվում և առանձին
ցելյուլներին (քսակներին) մեջ և յնթարկվում միկրոսկոպային
քննութիւն: վարակվածները վոչնչացվում են:

Վարակված թիթեռն իր մարմնի մեջ պարանալում և մեծ
քանակութիւնը պերրինայի մարմնիկներ. այդ իսկ պատճառով
չստ հեղաութիւնը կարելի յն նրա վարակված լինելը վորդեր:
Բացի դրանից՝ վարակված թիթեռի փորիկի և թևերի վրա լի-
նում են թուխ-կապարագոյն բծեր: Մակայն վոչ բոլոր վարակ-
ված թիթեռներն են հիշալ բծերից ունենում. այդ իսկ պատճա-
ռով հիվանդութիւնը վորդելու ամենաեղիւ միջոցը միկրոսկո-
պային քննութիւնն և:

Պերբինայով վարակված արու թիթեւը դուզավորման ժամանակ չի կարող վարակել նրին, վորովհետեւ նախ՝ սպերմատոզոֆոն այնքան փոքր և, վոր չի կարող իր մեջ պարունակել և ձվի մեջ մտցնել վարակը, յնքերորդ՝ միկրոպիլյար ապարատի անցքն այնքան նեղ և և այնպիսի բարդ կառուցվածք ունի, վոր անհնարին և դառնում վարակի ներս մտնելը: Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, վոր սղորը դուզավորման ժամանակ կարող է կըռչել ձվի կեղևին և այդ ձևով գրենային կենդանացման ժամանակ վարակել վորքը, ապա պետք է ասել, վոր դուզավորման ժամանակ սղորները, յնթե նույնիսկ անցած լինեն եղի սեւաւեան գործարանից ներս, նրա դուզակցական տալրակի մեջն ևլ ձնում են և չեն անցնում ձվատար խողովակի մեջ. դրանով սղորի կըռչելը գրենային նույնպես անհնար և դառնում:

Պերբինա հիվանդության նշաններն են՝

1. գրենան արթնանում և վատ.
2. լինում են մահացության գեղքեր, ժանսվանդ մաշկափառության ժամանակ.

3. վորզերն անհագասար են գորդանում.

4. վորզի մարմնի վրա լինում են սև բծեր.

5. վարակված վորզի մարմնում լինում են պերբինա հիվանդության ժարմնիկներ. հիվանդությունը վորոշելու համար վերջիններս ունենում են աւաղել վնասկան նշանակություն:

Պերբինա հիվանդության գեմ պայծարի միջոցներն են՝

1. իբրև նախազգուշական միջոցառում՝ ա) գրենան պատրաստել բացառապես ցելլուլար միջոցով՝ արգելելով նրա պատրաստումը անայնագործական ձևով. բ) կերակրումից առաջ ախտահանել շերտաւաններն ու տալ առողջ կերակրումներ՝ մեկուսացնելով հիվանդներին:

2. Բուժման միջոցները գեա անհայտ են: Հիվանդությունը յերևաւուն պես անհրաժեշտ և իսկույն փոխել խախնիքը և տեղափոխել միայն այն վորզերին, վորոնք արագությամբ կը բարձրանան կերի վրա: Խախնիքը հիվանդ և մահացած վորզերի հետ միասին անհրաժեշտ և զգուշությամբ հովաքել, տանել դուքս, այրել և կամ հորել հողում: Այն վորզերը, վորոնք հնչաությամբ բարձրացել են ին կերի վրա, անհրաժեշտ և տեղափոխել նոր շնջ, նորացնել և յնթե հնարավոր և, ջերմությունը մի քանի աստիճանով բարձրացնել. դրանով կարողանա վորզերի դարգացումը և հազաավի բերքի մի մասը:

Գրենաժի անխառն ծների ներկա դրված քով պերբինա հի-
վանդության ժառանգաբար անցումը միանգամայն վերացվում
է. հետևաբար հիշյալ հիվանդությունը համաճարակի բնույթ կրե-
լի կարգի:

2. ՖԼԱՆՇԻ

Ներկայումս շերամի վորդի հիվանդությունների մեջ ամե-
նավատանգավորը հանդիսանում է Ֆլաշերին: Սա այնպիսի մի հա-
մաճարակային հիվանդություն է, վոր 2—3 որվա ընթացքում
կարող է ամբողջությամբ վռնչացնել կերակրվող վորդերին:

Հիվանդությունը դարգանում է շատ արագ, վորդերը դա-
ղաբույժ են օւտեղուց, առանձնանում են մյուս վորդերից և քաշ-
վում դարակների յեղրերը:

Վորդերի մարմինն սկզբում նոսր է և լինում, իսկ հետո
թափանում է. մասով սեղմելիս մարմինը դիմադրություն ցույց
լի տալիս. յերբեմն վորդի բերանից դուրս է գալիս թուխ հեղուկ:



Նկ. 39. Ֆլաշերիի աստիճան վորդերի արտաքին տեսքը

Հետանցքը կեղտոտվում է և հաճախ արտաթորվում է թանձր
հեղուկ:

Ֆլաշերիով վարակված վորդի բնորոշ հատկությունն է
մաքմի սեանալը: Սկզբում սեանում են մահացած վորդի կրծքի
և փոքրիկ տաղին 2 սեղմենաները, հետո սեանալն ավելի ուժե-

դասնում և և տարածվում փոքրիկ Մնացած սեղմենաների վրա։
Մարմինը չափադանց նմանվում և թուխ հեղուկով չցղած պար-
կի մի փոքր սեղմելիս մաշկը պատալում և, մարմնից դուրս և
զալիս թուխ հեղուկ և տարածվում և Այդ հիվանդությունը հա-
տուկ և տնախորտ, սուր հոտ։

Ֆլաշերին մեծ մասամբ առաջանում և հինգերորդ հասա-
կում, այն ել 5—6-րդ որերում կամ վորդերի ցախ բարձրանալու
նախորդակին։ Պատահում և, վոր վորդը ժառանգում և հենց ցախի
վրա։ Այդ դեպքում վորդի մարմինը մնում և ցախի վրա, կրճի
վառները թուլանում են, իսկ փոքրիկ վառները ցախին աճելի
պինդ կաշվով մեջքի ուղղությամբ կախվում են նրանից։

Ներքին սիմպոմներին հն՝ դեմոցեաների քանակի պակա-
սումը, նաքային մարմնիկների քայքայումը և առանձնապես
մարսողության խանգարումը, վորովհետև ուժեղանում և աննոր-
մալ թթվեցումը, աղիքային հյուլի սեղմելիան ալկալիական փո-
խարեն գտանում և թթու, աղիքի պատերը գտանում են անկեն-
դան, այդ իսկ պատճառով փայլուն դաշնը գտանում և թուխ,
ապա փառում առաջացնող բաղադրիչների աղղեցությունը Մնացած
ներքին ոքզանները քայքայվում, անկենդան են դառնում։ Դա յե
պատճառ, վոր վորդը վերում նկարագրված թուխ հեղուկով լի
պարկի ձև և ստանում։


Կնում են դեպքեր, յերբ ֆլաշերին աճելի մեղմ ձև և ըն-
դունում, հիվանդությունը տեսում և ավելի յերկուր և համեմատա-
բար ավելի քիչ ֆուս և հոսցնում։ Պատահում և նախնադոս, յերբ
ֆլաշերին աչնդիսի սուր ձև և ընդունում, վոր վարակումն ալա-
դությունը մի վորդից մյուսին անցնելով շատ կարճ ժամանա-
կում վոշնչացնում և բոլոր շերտերը։

Այս հիվանդության ամենավատագուրը կոչմն այն և, վոր
վորդերը հիվանդանում են վերջին հասակում և կամ ըստժ հյու-
սեռն նախորդակում, վորի հետեանցով շերտավազի տմբողջ ալ-
խտանքը կորչում և։

Պետք և տեսլ, վոր ֆլաշերին շերտի վորդի հիվանդու-
թյանների մեջ ամենավատագուրն և և յուրացանչուր տարի-
մեծ ֆուսներ և հոսցնում շերտավազությունը։ Սակայն այս
հիվանդությունը դեռ լրիվ ուսումնասիրված չէ. դեռ չի պարզ-
ված և հաստատված հիվանդության ժառանգաբար անցնելու հա-
դանքը։ Տարբեր գիտնականներ հիվանդության մասին տարբեր
կարծիքներ են հայտնում։ Ծրանսխացի գիտնականները ֆլաշ-

քիթ առաջանալը քիթադրում են վորդի՝ ձողիկա՝ ման բակտերիաներով վարակվելու, վորը դեռ շատ առաջ նկարագրված էր Պասաշյորի կողմից։ Այդ բակտերիան (բացիլը) կոչվում է *Bacillus bombycis*։ Բացիլն առաջ-ցնում է սպորներ, վորոնք բավականին նման են պիրրինայի բացիլին (սպորին), բայց անհամեմատ մանր են։

Կա կա՝ ձիք, թե վորդերը Ֆլաշերով հիվանդանում են վոչ այնքան հասուկ բակտերիայով վարակվելուց, վորքան վորդի գլմադրականությամբ, պահածու պահածով, վորը կարող է



Նկ 30 Պիզիթի առաջնագ—*Bacillus bombycis* յեվ նրան ազնկցող—*streptococcus bombycis*

առաջանալը դրենան վատ պայմաններում պահելուց, դրենայի արթնացման աշխատանքներն անկանոն կատարելուց, հին և առաջացած տերեթի շերտերին կերակրելուց, խոնավությունը շատ բարձր լինելուց, վորդերի կերակրման մասնակցի վրամատի-նանը շատ բարձրանալուց, հիվանդ ծնողներից դրենա պատրաստե-լուց և այլն։ Նրանց կարծիքով աղիքներում բակտերիաների առաջանալն արդեն յերկրորդական յերևոյթ է հանդիսանում։

Պրոֆ. Ակվաշի կարծիքով՝ յիսկի Ֆլաշերին առաջանում է մալպիգյան անոթների աշխատանքների խանգարումից, վորի հետևանքով վորդի մարմ-ը թունավորվում է թունալորման հե-

անանքով աղիքներն աշխատանքը դանդաղում և, կերն աղիքներում սովելն յերկար մնալով թթվում և, վորն հետևանքով տեղի չե աւնենում վորդի օրգանների քայքայումը:

Հիվանդութիւնն կոմիսիոն միջոցառումները.—Մուշեղբեով հիվանդացած վ որերը բուժելու միջոցները մինչ որս զեռ պարզ չեն. այդ իսկ պատճառով միակ պայքարը պետք և ուղղված լինի հիվանդութեան առաջացման գեւ, վորն համար անհրաժեշտ և ձեռք առնել հետեյալ նախադրուական միջոցները.

ա) խնամել այնպիսի դրնա, վորն ստացվի և տաղջ ծնողներէջ.

բ) դրնայի պահպանում և կենդանացումը կատարել ճիշտ.

գ) վորդի կերակրումից առաջ խնամանել շերտաժատումը.

դ) կերակրման ժամանակ պահպանել առողջապահական անհրաժեշտ կանոնները, առանձնապես հետեւել, վոր խշտիները չորորոսնեն.

ե) շերտաժատումը շարունակ պետք և ուղափոխել:

Միջոցառումներ՝ հիվանդութիւնն առաջանալու շնորհիւ.—Մուշեղբեով հիվանդ շերտաժատի վերաբերմամբ պետք և ձեռք առնել հետեյալ միջոցները.

ա) խելույն փոխել խշտիները և խնամել միայն այն վորս պերին, վորոնք աշխոյժ և արագ կերպով կրարձրանան կերի վրա, ապա նրանց տեղափոխել նոր շենք. ժանացած և տկար վորս պերին զգուշութեամբ հալածել և խշտիների հետ միասին այրել կամ թաղել հողում:

բ) վերջրած վորսերին պահել անհամեմատ նոր, շերտաժատի բարձրացնել՝ հասցնելով 28—30° Յ-ի:

Արեւմտյան շերտաժատի խորհուրդն և՛ շերտաժատն հասակը յերբեմն թացացնել, մեկ որ շերտաժատին չկերակրել. մինչև կ'կղանքը նորմալ ձև կ'նշուի. ապա շերտաժատն առաջանալաւ իջնցնել՝ հասցնելով 28° Յ-ի Սկզբում վորսերին կերակրել քիչ-քիչ, ապա աստիճանաբար շատացնել. կերակրել վայրի թթնաւ տերեւ-ի. ցանկալի չե, վոր թթնիները նախորդ տալում ետված չլինեն: Կերը վորս ժամանակ պահել, նոր շերտաժատին հասցնել շերտաժատն շերտաժատիճանին և ապա տալ Վորսերին Ըստ Ֆուկսերի՝ հիշյալ միջոցառումներով յերբեմն Ըն-բաժոր և ընում փրկել կերակրութեան խաղաղ վոչնչացումից:

Ինպես ֆրաչերին, աշխատեալ էլ չախտաւ՝ աղիքային հիվանդութեանն եւ Զախտաւ հիվանդութեան գեղարու զորդերը յիշ են ծառամ, չեն մեծանում, առողջ վորդերից առանձնանում եւ քայլում են դարակներէ յիզերը: Մայիլը լինում եւ թառաման եւ ծածկված կենդանւում: Գուշը թուի եւ լինում: Վորդի բերանից թուի հեղուկ չի հոսում: Ինչպէս այդ անդի յե ունենում ֆրաչերի ժամանակ: Հետանցքը կեղտոտվում եւ հեղուկով, կրկնըդանք ունենում եւ թթու անակցիա, աղիքներում կեր չի թուում: միջնաղիքի սկզբի մասում առաջնում եւ չորանում: հյուսիք, վորի հետանցքով վորդի մարմնի առաջին մասը փափանցիկ եւ դառնում:

Այս հիվանդութեան դեպքում վորդի վորդուծումն առաջանում եւ առամոքային հյուսիք առատութեամբ արտադրվելու հետանցքով: Վորդն իր փոքրիկ վորաներով բռնւելով իշ, իններից՝ վերեւ եւ բարձրացնում կտրված ու դուրսը, վորի ժամանակ կրծքի վորաներն ուղղված են լինում առաջ: Արյան քանակը մարմնում դադարում եւ, անդառնալով դնդիկները հետզհետեւ անհետանում են, հիվանդութեանը դարձանում եւ բազմակիս զանազա եւ յերեւելուց մինչեւ վորդի մահը տեսնում եւ մի քանի օր: Զախտաւ հիվանդութեան ժամանակ, չնայած վորդն առաւելանաւոր նիհարում եւ, բայց ախտաւոր չի կորցնում եւ չարանակում եւ ուտել, մաշկափոխվում եւ եւ վորոշ դեպքերում նույնիսկ կարողանում եւ բժշկել հյուսիք:

Զախտաւ հիվանդութեանից մահացած վորդի մարմինը չի քայքայվում, մինչդեռ ֆրաչերի դեպքում քայքայվում եւ վորդի մարմինը ձգելիս ձգվում եւ եւ չի կտրվում: մաշկը քայքայված չեւ, մարմինը ձգելուց հետո յիշե թողնել, աստիճանաբար կրծքանի իր նախկին՝ մինչ ձգել, ունեցած ձևը: Մահանալուց հետո վորդի մարմինը չորանում եւ՝ պահպանելով իր թուի գուշը: Զախտաւ հիվանդութեան ժառանգաբար անցումը հաստատված չեւ:

Հիվանդութեանն առաջացնում եւ *estrepto coccus bombycis* բակտերիան: դա գեղաձև բակտերիա չեւ եւ իր բաժանման ժամանակ նմանվում եւ չղիմայի:

Շերամի վորդի մեջ հիշյալ բակտերիայի դարձանում համար նպաստավոր պայմանները հանդիսանում են՝ ծառերի հիվանդացած լինելը, դրենայի պահպանման պայմանները, առանձ-

Նապիս ձմեռան վերջերին վորդերին բարձր շերտաաթիճանուէր կեն-
դանացնելը, մարիւր, ողի պակասը, վորդերի կերակրման ժամա-
նակ խոնավութեան բարձր լինելը:

Հիվանդութեանը կոնխիլու միջոցառումները.— Կերակրութեան
բից առաջ պիտի և ախտաւանել շերտաաթիճանուէր ինկուրացիան
կատարել ճիշտ, կերակրման ընթացքում պահպանել առողջ-
նական աւերածնունդ պայմանները՝ պարբերութեան, թարմ և մա-
քուր տերեւով հաճախելի և վոշ մեծածառակ կերակրութեան:

Միջոցառումներ՝ հիվանդութեան սոսքումարւոյ դեպքում.—
Քնակաւ հիվանդութեան բուժման միջոցները դեռ հայտնի չեն,
բայց այնուամենայնիւ հիվանդութեան նկատելի աւերածնունդ
և կերակուել հետեւյալ միջոցառութեանը.

1. անմիջապէս փոխել խաւիկները.

2. թոյնել ժողովն այն վորդերը, վորոնք առանց զգուշա-
թեան և արագորեն բարձրանաւ են նոր կերի վրա. այդ վորդե-
րին տեղափոխել մաքուր դարակներէ վրա, վերակել կերակ-
րումը՝ մի քանի անգամ ընդմիջում առելուց հետո մեղրում կե-
րակել ափսի մեծ ընդմիջումներով և քիչ-քիչ, այն եւ յերիւս-
տարդ և թարմ տերեւերով, իսկ հետագայում՝ նորմալ ձեռով
Ստականերին և խուլիներին այրել կամ թուղել խաւիկներ հետ
միասին:

4. ԳԻՂՆԱՅԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դեղնացածով վարակված վորդի մարմնում միկրոսկոպի տակ
չառ հեշտութեամբ կարելի չէ գտնել բազմանկյանաւի մարմ-
նիկներ:

Մյուս հիվանդութեաններէ համեմատ դեղնացածը բազմա-
նին տարածված և կերակրութեաններէ մեջ հաճախակի կարելի չէ
նկատել հիշյալ հիվանդութեամբ վարակված վորդեր. բայց շնայած
դրան՝ գեղնացածը յերբեմն կարող և վաշնչացնել համարյա մարդիկ
կերակրութեան, այդ իսկ պատճառով աւերածնունդ և հիվանդութեան-
նը յերկարու դեղքում ձեռք առնել հաւաքառութեան միջոցներ:

Դեղնացածը մեծ մասամբ յերեւում է յերկու ժամանակամի-
ջոցում, այն է՝ յերկրորդ մաշկփոխութեանից հետո, այսինքն՝
յերրորդ հասկում և յերրորդ մաշկփոխութեանից հետո՝ աշ-
տինքն՝ հինգերորդ հասկում: Առաջին դեղքում վորդի մարմնին
ընդունում է բացդէղին գոյն. վորդերն ախտահար չեն ճառար-
նիհարում են, գունդազարմ են գտնում և թուլանում:

Հինգերորդ հասկում գեղնացածը հանդես ե գալիս 2 ձևով.
 մի գեղքում վորդերը մի բիշ յերկարում են, յերկար ժամանակ



Նկ 31. Գեղնացածից սեռած վորդեր

չքջում են ցախի վրա կամ խշտիների միջ, մինչև վոր մահանում
 են և սեանում: Յերկրորդ գեղքում, բնդնակառակը, վորդի վորդ-




Նկ 32 Վարդի հարց-քանդ - արտաքին տեսքը

վի առաջին սեզմենտները լայնանալով՝ մարմինը կարճանում և
 և հաստանում: Հիվանդ վորդերն առանց շարժվելու մնում են

խշտիների մեջ: Ինչպես առաջին, այնպես էլ այս դեպքում վորպի մաշկն ուղեղի նյութում և և դառնում և վառվում: Դեղին բոժոժ հյուսիս գեղերի վորպի մարմինը դեղնում և, իսկ սպիտակ և կանաչ բոժոժ հյուսիս գեղերինը՝ կաթնասպիտակավուն են դառնում: Մարմնում կուտակված հեղուկի մեջ, մաշկի վրա՝ ցնալով աժեղանում և, և մաշկը պատալում: Ըստ ցնդի՝ մարմնից սկսում և հոսել տեղնավուն կամ կաթնասպիտակավուն հեղուկ՝ կեղտա-տեղով խշտները: Վորպը մահանում և կաշվում և խշտներին:

Դեղնացավը դարգանում և բավական արագությամբ, վոր-լակված վորպերը մինչև բոժոժ հյուսիսը մեծ մասամբ մահանում են: Իսկ այն դեպքում, չիլը վորպը վորակվում և հինգեր-ըց հասակի վերջին որերում, կարող և հյուսիս մինչև իսկ բավական վորակյալ բոժոժ և հուսնիսկ մեակի բազմից հարսնյակի: Բայց բո-ժոժի մեջ հարսնյակը մեծ մասամբ մահանում և: Կա այն կար-ծիքը, թե քանի վոր դեղնացավով վորակված վորպն անպայման



Նկ. 33. Բագմենյանի մորմենիներ, դեղնացավով նիվանգ վորպի աչքան մալ—միկրոսկոպային դաշտում

վորպ կամ հարսնյակի վիճակում մահանում և, այդ իսկ պատճա-ռով հիվանդությունը ժառանգաբար ի անցն: Ը: Սակայն այդ վորպիքը գեղ հաստատված չեն հիվանդուի ցան դարգացման վրա

աղբում և ջերմաստիճանը. բարձր ջերմաստիճանում հիվանդութ-
յունն ավելի արագ և դարգոտում, քան ցածր ջերմաստիճանում:

Ինչպես արդեն նշված է, գեղնացավով վարակված վորդերի
մարմնում նկատվում են մեծ քանակությամբ միկրոսկոպային
մարմնիկներ (0,003—0,01 միլիմետր): Սրանք լույսը բեկելու
մեծ ունակությամբ ունեն. այդ իսկ պատճառով փայլուն են յերև-
ում: Միկրոսկոպի տակ դիտելիս՝ այդ մարմնիկներն ակզում
կլոր են յերևում, իսկ ավելի ուշագիտ դիտելու ժամանակ պարզ-
վում է, վոր նրանք ղեցանկյունանի մարմնիկներ են: Այդ մարմ-
նիկներն ապիրաթ, նֆիրի և խլորոֆորմի մեջ չեն լուծվում: Թույլ
թթուներ և մոխրաջրի մեջ լուծվում են: անսկարաք կշռով
ջրից ծանր են: Նրանք առաջանում են հիվանդությունն առաջացնող
բակտերիայի աղբյուրությամբ քայքայված բջիջներում, իսկ հյուս-
վածքները քայքայվելուց հետո՝ այդ մարմնիկներն ընկնում են
վարակված վորդի արյան մեջ:

Հիվանդությունը վարակիչ է. յեթե գեղնացավով վարակ-
ված վորդի արյունից սրակենք առողջ վորդի մարմնի մեջ, վիր-
ջինս նույնպես կհիվանդանա գեղնացավով: Վորդերը մեկը մյուս-
ին ճանկակիս կարող են իրար վարակել: Դեղնացավից մա-
րացած և չորացած վորդի արյունն իր հիվանդության ունակու-
թյունը կարող և պահպանել մինչև մեկ տարի. այդ պատճառով
գեղնացավով մահացած վորդերի արյունով կեղտոտված դուրակը
հաջորդ տարին նույնպես կարող և վարակման աղբյուր ծառա-
յել: Վարակված կարող և անցնել նույնպես կղկղանքի միջոցով:

Ջափաղանց հետաքրքիր և այն հանգամանքը, վոր վարակ-
ված վորդի արյունը նույնիսկ հատուկ ֆիլտրից անցնելուց հետո
յիլ դարձյալ վարակելու ունակությամբ և ունենում:

Այս հանգամանքն ապացուցում է, վոր հիվանդությունն
առաջացնող միկրոբը բակտերիայից էլ փոքր է, այլ կերպ՝ նա
ձենապակյա ֆիլտրից անցնել չեր կարող:

Պայոյինը կարողացել է ու լորամանիշակագույն ճառագայթ-
ներով տեսնել հիվանդությունն առաջացնողին և ըստ նրա կար-
ծիքի՝ դա գրվում է բակտերիաների և միարջիշների միջև ընկած
տեղը: Պայոյինն այն անվանել է *borrellina bombycis*. բայց
զետք և ասել, վոր Պայոյինի կարծիքը դեռ հաստատված չէ: Մի-
շարք հեղինակների կարծիքով գեղնացավը կարող է առաջանալ
աբսոլյուն հետևյալ պայմաններից՝

1. յերբ գրենան ձմռան վերջերին և գարնան սկզբներին պահվում և վառ պայմաններում.

2. յերբ գրենան արթնացնում են խոնավ և վառ ուղափոխված պայմաններում.

3. խնամքի առաջին որերին շերամներից ցածր-ջերմաստիճանում պահելու.

4. շերամներին չափազանց կոշտ տերևով կամ ցրտահարված տերևով կերակրելու.

Վորդերի կերակրման ժամանակ շերամաստան ջերմաստիճանի հանկարծակի իջնելը նույնպես նպաստում և զեղնացավ ասաջանալուն:

Վորդերին թաց տերևով կերակրելիս՝ մանավանդ այն տարիներում, յերբ խնամքի ժամանակ ջարդանակ անձրև և դալիտ, վորդերը կարող են հիվանդանալ զեղնացավով:

Մի շարք հեղինակների կարծիքով վորդերը հիվանդանում են զեղնացավով մեծ մասամբ մ. զկափոխության ժամանակ և հիվանդության խնկարագրան ժամանակաշրջանը տևում և 7—8 օր: Վորդերը կարող են հիվանդանալ ինչպես առաջին, այնպես էլ վերջին շրջանում, վարովհետեւ, ինչպես արդեն ասված և՛ վարակը կարող և անցնել թե կերի և թե հանկուսվածքների միջոցով:

Կանխիկ միջոցները.

1. գրենան պարտապես բուցառապես առողջ ձնազներից.

2. շերամասները տխտահանել.

3. գրենան ճիշտ պահպանել.

4. կանոնավոր կերակրել և խնամել:

Միջոցառումներ՝ հիվանդությունը առաջացված դեպքում.

Դեղնացավով վարակված վորդերը բուժելու ձևը մինչև քս դեռ հայտնի չէ: Դեղնացավ հիվանդությանն առաջանալիս, անհրաժեշտ և փոխել խշտիները, և բույր հետաձագ ու մահացած վորդերը խշտիներով միասին այրել: Առողջ վորդերը պետք և վերցնել շատ զգուշությամբ՝ կամ մակ-տկեն թղթերով (септик): և կամ տերևավոր փռքիկ հյուղերի միջոցով: Յերբ չի թուշտարվում վորդերը վերցնել ձեռքով, վորովհետեւ մաշկը կարող և քնավել հիվանդությանն առաջացնող միկրոբը մաշկից անցնել ներս:

Առողջ վորդերը պետք և տեղափոխել ազատ, նոր և կերակրել 20՝ 30. ջերմության մեջ, վարովհետեւ, ինչպես վերևում

ասպանե, ցածր ջերմութեանում զեղնացալիս սարգացումն ամէ-
նի դանդաղ և ընթանում: Բաժնաճաղն ավարտելուց հետո ան-
հրաժեշտ և վորդերի մնացորդները (նկերեմենտը) խշտիների
հետ աչքից կամ թաղել, այնուհետև չերամատուեն արտահանել և
լավ մաքրել:

5. ՄՈՒՍԱՅԻՐԻՒՆԱ

Մուսկարդինայով վարակված վորդն սկզբնական ջրջանում
վնջող չի տարբերվում առողջներից: Բայց վարակվելուց մի
քանի մամ հետո նա զրկվում և անորմալից: Թողնում և կերը և
դանդաղաշարժ և դառնում, սրտի (մեջքի անոթի) աշխատանքն
այդ ժամանակ արագանում և:

Վորդի մարմինը շուտով թուլանում և, թուամում և փոք-
րանում: Մեղմենաները փոքրանում են և վորդը մահանում և
Փոքրիկ վտանքը մար-
մնի վրա համարյա
չեն նկատվում: Նրանք
ստանում են փոքրիկ
համկելվածների և,
վորդի գլուխը միայն-
գամայն անհանաչելի
չեղանում:




Նկ. 34. Մուսկարդինայի ստակած
վորդեր

Մուսկարդինայից
մահացած վորդի մար-
մինը շորանում և և
նախկինը կտարվում: Այդ նշանով մուսկարդինայով վարակված
վորդերը հետաքննմանը կարելի չեղանալանել մնացած բոլոր
հեղանգութեաններով վարակված վորդերից: Մուսկարդինայով
վարակված, խնչպես և դրանից մահացած վորդի մարմինը հա-
նախ վարդագույն և դառնում: Նրա պատճառը նրա վրա զարգա-
ցող հատուկ բակտերիաներ են (*Micrococcus prodigiosus*), մո-
րանք ունեն կարմիր պիգմենտներ: Այս միկրոօրգանիզմը (բակտերիա-
ները) հիվանդութեան հետ կապ չունեն, նրանք զարգանում են
մուսկարդինայից մահացած վորդի մարմնի վրա, վորտեղ նրանց
զարգացման համար ստեղծվում են նպաստավոր պայմաններ:
Վորդերի մեջ մուսկարդինան յերևում և բոլոր հասակներում,
բայց առավելագույն միաստում և վերջին յերեք հասակում: Ինչքան
վորդը փոքր և, այնքան արագ և ազդում մուսկարդինան:

Մուսկարդինայով վարակման բացասիկ դեպքեր նկատվում են նաև Թիթևա հատակում, յերբ յերկու վորդ միասին են հյուսում բոժոժը դրանցից մեկն ու մեկը վարակված և չինում մուսկարդինայով: Ղալակված հարսնյակը մահանալուց հետո նրա մարմինը սպոր կրող հիֆերով ծակվելով՝ վարակում և նաև մյուս առողջ հարսնյակը, վորը մեակերովում և Թիթևա, բայց Թիթևա վրձակում մահանում և քարանում և:

Մուսկարդինան առաջանում և սունկի միջոցով, վորը պահպանում և Basidiomyceti խմբին և կոչվում և Botrytis Bassiana:



Նկ 35. Մուսկարդինա հիֆոմիցոմիկոտառայ Botrytis Bassiana սկիւ աղ-բնից յիվ երկնից—միկրոսկոպային պաշտում

Մունկն իր անունն առացի և Իտալիայի գիտնական Ավգուստինո Բասսի անունով, վորի շնորհիվ 1807—1823 թ.թ. գտնվեց և այդ սունկը:

Գետք և ասել, վոր մեզ մաս՝ Հայաստանում մուսկարդինան համարյա բացակայում և, յերբեմն նկատվում և Իջևանի, Շամշադնի և Ղափանի շրջաններում, բայց այն աստիճան Թույլ և, վոր ֆունսներ չի հասցնում:

Նախագրութիւնս միջոցառումսնսրս.— Զի վանդռաքոսնսն Նկա-
տելիս խշտինհրն ու զորդերի մեացորդնսնսն պիտի աշուի: Շերտ-
մատունն ախտահանել ծծմբալազի միջոցով: Ծծումբ չլինելու
զեպոսակ կարելի չե շերտմատունսնսն ծխով լցնել՝ զորեւ չբռնի
աշուիով աշտակո: Անշրտակոս եւ նման զեպոսակ բռնի շերտմատուն
քոզոս անցքերը վազել մինչեւ 12 ժամ:

ԳԼՈՒԽ 7-ԲԴ

ԲՈԺ-ՈՒԺԻ ՎԵՐԱՄԵԱԿՈՒՄԸ ՅԵՎ ՏՆԽՆՈՒՈԳԻԱՆ

1. ԲՈԺ-ՈՒԺԻ ԷՆԴԴԵԼՆ ՈՒ ԶՈՐԱՅՆԵԼԸ

Անկախ նրանից, թե ա՛յալ բո՛ժո՛թի պարտեան հատկացվեալ յե սերմացվի, թե թեյի վերամշակման, ցախից պետք և բո՛ժո՛ժը հա՛վաքեղ իր ժամանակին: Այն դեպքում, յերբ վորդը բո՛ժո՛ժ հյուսելն ապարտել է, բայց դեռ չի՛վ հարսնյակի յի ձեռափոխել կամ տեղ նոր և ձեռափոխվում, այսինքն՝ այն ժամանակ, յերբ նա դեռ չափադանց զգայուն է, բո՛ժո՛թի հա՛վաքումն ու տեղափոխումն սրբելվում և նման չհասունացած բո՛ժո՛թները տեղափոխելիս՝ միջի հարսնյակը մահանում և և ցայտայման և յենթարկվում: Մայրացված հարսնյակից առաջացած հեղուկը օճիկելով բո՛ժո՛թի պտայանի մեջ՝ այն անպեղծացնում և թեյի վերամշակման համար: Բացի վերահիշյալից՝ դեռ հարսնյակի շեռափոխված վորդը կամ նոր ձեռափոխված հարսնյակն իր մեջ պարունակում և մեծ քանակությամբ ջուր: Այգակները շոգի կամ չոր ոգի միջոցով խեղդելու դեպքում հաճախ պատռվում են, և նրանց միջից դուրս յեկած հեղուկը օճիկելով բո՛ժո՛թի պտայանի մեջ՝ անպեղծացնում և այն:

Վերահիշյալ պայմաններից յեղնելով՝ բո՛ժո՛թի մթերման ժամանակ պետք և չափազանց զգուշ լինել և բո՛ժո՛ժը հա՛վաքեղ անպայման իր ժամանակին, այսինքն՝ վորդը բո՛ժո՛ժ հյուսելուց հետո՝ վա՛ղ շուտ 6—8 օրից, այն հաշվով, վոր բո՛ժո՛ժը խեղդելիս նրա միջի հարսնյակը չի՛վ ձեռափոխված լինի:

Հայանի յե, վոր ինչքան բո՛ժո՛ժը շուտ և հա՛վաքվում, այնքան ծանր և լինում, բայց պետք և հիշել, վոր ժամանակից շուտ հա՛վաքված բո՛ժո՛ժն ա՛վելի ցածր և գնահատվում: Եղ խի պատհառով թե շիբամապահին և թե բո՛ժո՛ժը գնոդ կազմակերպութանը ձեռնառա յե, վոր բո՛ժո՛ժը հա՛վաքվի ժամանակին:

Չնայած վոր շերամապահները բռնածը պետք է հաժարեն և տեղափոխեն միայն հարսնյակի լրիվ ձևով քվիելուց հետո, բայց պրակտիկայում հաճախ պատահում ե, վոր շերամապահը բռնածը համընդուն և միջի հա, անշակը դեռ լրիվ չձևավորված վիճակում։ Այդպիսի դեպքում բռնածն ընդունելուց հետո, պետք է բարակ ջերմով փակել և միայն հարսնյակը հասունանալուց հետո խեղդեր։

Բռնածի հասունանալը վորոշեալ համար պետք և սուր դանակով մի քանի բռնած կտրել, միջից հարսնյակը հանել և նայել, յնթե դեղնավուն դաշնի յն, այդ նշանն է, վոր այն դեռ հասունացած չէ։

Նախքան բռնած հյուսելն անհրաժեշտ և նրա միջի տաանձնացնել պետք է նույնիսկ շնեացած, բայց մեջը մահացած վորդով կամ հարսնյակով բռնածները, վորովհետև խեղդելիս բարձր քիմ-ստիհանի ազդեցութեան տակ նրանք պատռվում են և կեղտոտում։ Մեացած միանդամայն առողջ և մաշուր բռնածները։

Բռնածը տեղափոխելիս հատուկ ուշադրութեան պետք է դարձնել, վոր ճանապարհին չտաքանա և չնկմվի։ Բացի այն, վոր բռնածը տաքանալուց կարող և նրա միջի հարսնյակը նույնիսկ մահանալ, այլև բռնովի տաքանալը վատ ազդեցութեան և թողնում նույնպես մեատաքսութիւն վորակի վրա։ Չնայած անքաղտե բռնածն արտաքուստ վոնջնով չի տարբերվում նորմալ բռնածից, բայց դժվար է քանդվում և քանդվելիս չափազանց շատ և կշտառվում։ Պարզ և, վոր դրանով պակասում է մեկ կիւլ-գրամ բռնածից ստացված մեատաքսութիւն քանակը։

Անկախ նրանից, թե բռնածը հատկացվելու յն սերմի պատշաճումանը, թե թիւի վերամշակմանը, անպայման պետք է տեղափոխել կողովով և կամ դրա համար հատկապես պատրաստված հատուկ ծակտակն արեղներով։ Չնայած մինչև որս ինչպես մեղմատ, այնպես էլ Միութեան Մեացած շերամապահական հանրապետութեաններում բռնածի մի մասը տեղափոխում են պարկերով, բայց այդ մեի փոխադրութեանն առայժման պետք է վերացնել, վորովհետև բռնածն այդ մեով տեղափոխելիս արդունարերութեանը մեծ վնաս և հասնում։

Արևի ճառ-գայթերը վատ ազդեցութեան են թողնում բռնածի վորակի վրա, այդ պատճառով բռնածը պետք է պահպանել արեի ճառագայթների ուղղակի ազդեցութեանից։ Այդ նկատի ունենալով՝ խորհուրդ է տրվում բռնածը տեղափոխել գիշերը, այն հաղվով, վոր միերման կայան հասցվի վաղ առավոտյան Փոխ-

դրության ժամանակ բոժոժը փողու և արևի հառադայթներից
պաշտպանելու համար հաստ չորով կամ վերմակով ծածկելը խը-
սով արգելվում ևս Այդ նպատակի համար կտրելի յն սպասար-
նել համ քար-ը կտոր և կամ տերևովոր ճուղեր:

Բոժոժը կարելի յն խեղդել մի քանի ձևով: Խեղդելու հիմ-
նական նպատակն և՛ մահացնել բոժոժի միջի հարսնյակը, վոր-
պեսզի այն հնարավորություն չունենա ձևափոխվել թիթեակ,
վորովհետև վերջինս բոժոժը ծակելով՝ անպիտաքանում և, և աշ-
նահետև հնարավոր չի լինում այդ բոժոժը մանել:

Հին ժամանակներում, յորրդև հայտնի շնչին շողովով կամ
չոր ողով խեղդելու ձևերը, հարսնյակը մահացնելու նպատակով
բոժոժը փռում և չին արևոտ տեղ, բայց, խնչպես ասված և, այդ
մեթոդի կիրառումը չափադանց վատ և անդրադառնում բոժոժի
վորակի վրա և ցածրանում և մետաքսաթելի տեխնիկական հառ-
կությանը: Բացի դրանից՝ արևի աղդեցությամբ խեղդված բո-
ժոժն այրվում և, վարով ընկնում և մետաքսաթելի առավել մեծ
հառկություններից յերկուսը՝ փայլը և դույնը:

Բոժոժ խեղդելու ամենաընդունված ձևը տաք շողու միջո-
ցով խեղդելն և Դրա համար անհրաժեշտ և բոժոժը 15—20 բո-
ղե պահել 75—80° Ց. ջերմություն ունեցող քաղ զոլորչու աղ-
ցկցության տակ:

Հնդկանրապես ինչպես մեզ մոտ, այնպես և Միության շե-
քամապահական ջրջաններից մեծ մասում ընդունված և բոժոժը
խեղդել ջրգեփներում կամ հատուկ մեքենաներով:

Արկղներում բոժոժը պետք և լցնել 10 սմ-ից վաղ ավելի
հաստություն ունեցող շերտով: Տարբեր ցեղի և տարբեր վորակի
բոժոժներից առանձին պարսիաներ կազմել և առանձին առան-
ձին և խեղդել: Մինչև բոժոժի խեղդելն արգելվում և բոժոժը 40
սանտիմետրից ավելի հաստ շերտով փռելը:

Բոժոժը փոխ մեջ տեղափոխելու հետ մեկտեղ անհրաժեշտ և,
փոխ դառն վրա պատրաստված արկղիկում դնել մի քանի հառ
դույք բոժոժ, վորանցով վորովի՛լու յն փոխ մեջ դրված ամբողջ
բոժոժի խեղդված լնելը: Ստուգելու համար պետք և վերցնել
դույք բոժոժներից մի քանիսը, սուր դանակով կտրել, միջից
հանել հարսնյակը և ասեղով ծակել: Ենթե հարսնյակն ա. եղի
ծաղիցը չի զգում, և կամ նրա ստամոքսն արդեն կարծրացած և,
դա նշան և, վոր բոժոժներն արդեն խեղդված են:

Այն դեպքում, յերբ խեղդվում և բոժոժի մի այնպիսի պար-

ախա, վորի մեծաքանակութիւնը շատ հաստ է և կամ պարսիան
բողկացած և ամբողջութեամբ դուրս բռնածներէն, վոր թէ պիտի
բարձրացնել զիսկ շերմաստեաններ, այլ պահանջն է ընդունված
շերմաստեաններ և յերկարացնել խեղդման տեսողութեանը:

Բոժոժը խեղդելու ժամանակ զիսկ մեջ առաջացած գոլորշին
կուտակվելով զիսկ առատազուժ վեր և անվում ջրի Զրի կաթիլ-
ներն ընկնելով բոժոժի վրա՝ կեղտոտում և անպետքացնում են
այն, այդ պատճառով անհրաժեշտ է ըրեղենտով և կամ հատուկ մի
այլ կտորով դարակի վերին հարկում յեղած բոժոժները պաշտ-
պանել իրջվելուց:

Փոխ նոր հանված բոժոժները լինում են խնամ և պա-
տանները չափազանց փափկացած, դրա հետեանքով էլ շատ
ենչառութեամբ եղմովում են անհրաժեշտ և փոխ նոր դուրս յեղած
բոժոժները նույն արեղներում 20—30 րոպե պահել վորպէսզի
չորանան, և ապա տեղափոխել չորանոցի դարակներ՝ 10—15 ամ
հաստութեան շերտով:

Հաճախ պատահում է, վոր բոժոժները խեղդելուց հետո մի
քանի թիթիկ բոժոժ շաճկելով դուրս են գալիս Այդպիսի գեղ-
քում յերեք շաբաթ կ'ապրիվել, վոր վնասել կրկին խեղդելու կարիք
չի դառնում, ընդհակառակը, դա նշան է, վոր բոժոժները լավ
են խեղդված և փութում ավելի մնալու կամ շերմաստեաններ բարձր
լինելու հետեանքով չեն ալրված:

Վորպէսզի բոժոժները չորորոտեն և նրանց վորակը չընկ-
նի, անհրաժեշտ է շարունակ խոնելու մասնելու հետ միասին
անհրաժեշտ և միջից հանել այն անդետք, թույլ և կեղտոտված
բոժոժները, վորոնց խեղդվելուց առաջ չեյին նկատված և չեյին
առանձնացված:

Քանի բոժոժը չորանում է, կարելի չէ աստիճանաբար բո-
ժոժի շերտը հաստացնել, իսկ բոժոժը բոլորովին չորանալու
գեղքում կարելի չէ շերտը հասցնել մինչև 40—45 սանտիմետրի:

Դարակների վրայի բոժոժի շերտը պետք է հաստացնել հե-
տեյալ ձևով. ավելի չորացածները քաշել մի կողմը և ավելի ա-
ռավելի հաստ շերտի վերածել: Այսպիսով առաջանում է ազատ
առաժույթ, որ հնարավոր է լինում նորից բոժոժ լցնել:

Սկզբնական շրջանում բոժոժներն որակաւ պետք է խառ-
նել 2—3 անգամ, իսկ այնուհետեւ նայած չորացման աստիճա-
նին, կարելի չէ ուշուշ խառնել՝ հասցնելով 6 որը մեկ անգամիս
Բոժոժի չորացած լինելը վորոշելու համար դարակի տաք-

րեր աեղէրից պետք և վերցնել մի քանի բոժոժ, միջից հարսնյակը հաւել և մատնորով արորել։ Յերը հարսնյակը զիջովի, դա նշան և, վոր բոժոժներն ալդեն չորացած են։ Բացի վերահիշյալից՝ բոժոժի չորացած լինելը վորոշվում և նաև հետևյալ ձևով. դարակի տարրեր տեղերից պետք և վերցնել բազմաանաչաժ բոժոժ, ցնել պարկի մեջ և կռել։ 5—6 որ անցնելուց հետո կրկին կռել։ յիժի նախորդ և վերջին կռումների մեջ տարրերու թյուն չի լինու. մ, դա նշան և, վոր բոժոժներն արդեն չորացած են։

Բոժոժները հիշյալ ձևով չորացնելն ունի հետևյալ բացասական կողմերը՝

1. մեծ քանակությամբ բանում և գործադրում.

2. բոժոժի չորացումը տևում և յերկար.

3. անհրաժեշտ և լինում հատուկ մեծ շենքեր կառուցել, այն և է 2—3 ամսվա համար։

Ներկայումս Միսիճյան մեջ բազմաանին մեծ գործադրություն ունի աշաղես կոչված «Միմպլեկա» սիստեմի բոժոժ խեղդող և յիստամանակ չնրացնող մեքենան։ Սրա գործադրումը ժոխ համեմատությամբ ունի այն առավելությունը, վոր բոժոժ չորացնելու համար հատուկ չորանոցներ կառուցելու կարիք չի զգացվում, այլ «Միմպլեկա» թէ խեղդում և բոժոժը և թէ համապատասխան ֆերմություն ունեցող չոր ողում մի քանի ժամվա ընթացքում չորացնում։

«Միմպլեկան» ունենում և տարրեր քանակի բոժոժ խեղդելու և չորացնելու ունակություն, վոր հասնում և որեկան 7500 կիլոգրամ թաց բոժոժի։ Բոժոժը խեղդվում և չորանում և 80—90° Շ. չոր ողի ազդեցության տակ։

Բացի «Միմպլեկից», բոժոժը կարելի չի խեղդել և լրիվ կամ մասնակի չորացնել մի շարք բուրբոփին այլ կառուցվածք ունեցող մեքենաներով, ինչպիսիք են՝ «Շիլդեն»-ը, «Բիան» Դուքլին»-ը, «Պալլիգրին»-ն և այլն։

Բացի արեգակի շողու և չոր ողի միջոցով բոժոժ խեղդելուց, կարելի չի հարսնյակը ժահացնել նույնպես տարրեր քիմիական նյութերով։ Բայց պետք և ասել, վոր բացի լաբորատորիայի փորձերից, դրանցից վոչ մեկն ևլ պրակտիկայում չի գործադրության չեն արժանացած, քանի վոր նրանք միայն մահացնում են հարսնյակը և չչորացնելով բոժոժը՝ բացասական ազդեցություն են թողնում մետաքսութի վորակի և բանվորների առողջության վրա։

Բաժանիւն կարեւոր խնդիր և կազմում չորացման գործադիր-
 քը, այսինքն՝ բոժոժը չորանալուց հետո նրա քաշում առաջացած
 ապրերությունը, Ընդհանրապես պարակալկայում հաշվվում և,
 վոր յերեք կիլոգրամ թաց բոժոժից ստացվում և մեկ կիլոգրամ
 չոր բոժոժ:

Մի շարք փորձերով հաստատված և, վոր տեղոսային հարա-
 բերությամբ կենդանի հարսնյակում 7—8 տնգամ ավելի շատ
 քաշ և պարունակվում, քան մետաքսապայանում: Ինչպես թաց,
 այնպես էլ չոր բոժոժի մետաքսապայանում պարունակվում և
 միահավասար խոնավություն—մոտ 10⁰/₀: Հաստատված և և այն,
 վոր չոր բոժոժն իր մեջ պարունակում և մոտ 10⁰/₀ խոնավություն:

Հարսնյակը չորանալով՝ իր քաշից կորցնում և մոտ 75⁰/₀,
 այլ կերպ ասած՝ մեկ միավոր թաց հարսնյակը չորանալով դառ-
 նում և 0,245:

Այս թվերից յեղենով հեշտությամբ կարելի յև չոր բոժո-
 ժի քաշով վորոշել նույն պարտիայի թաց յեղած ժամանակվա
 քաշը:

Դա կատարվում և հետևյալ ֆորմուլայով՝

$$(A : 0,245) + B$$

A-ն հարսնյակի քաշն և.

B-ն մետաքսի քաշը:

Վելպեսդի այս հաշիվն ավելի պարզ լինի, բերում ենք հե-
 տեյալ որինակը. տվյալ պարտիայի մետաքս տալու ունակու-
 թյունն և 40⁰/₀, իսկ ամբողջ պարտիայի քաշն և 200 կիլո, կամ
 այլ կերպ ասած՝ ստացվում և 80 կիլո մետաքս և 120 կիլո հարս-
 նյակ, իսկ հիշյալ ֆորմուլայի միջոցով՝ մեկ կիլո չոր բոժոժը
 վորքան թաց բոժոժի հավասար լինելը վորոշելիս կստանանք՝

$$\frac{(120 : 0,245) + 80}{120 + 80} = \frac{400 + 80}{200} = \frac{570}{200}$$

Սա նշանակում և, վոր 200 կիլոգրամանոց պարտիայի թաց
 ժամանակվա քաշը յեղել և $200 \times 2,85 = 570$ կիլո:

Անհրաժեշտ և նույնպես նշել, վոր չոր բոժոժը մեծ կապ
 ունի այն տեղի կլիմայական պայմաններին հետ, ուր չորացված
 և բոժոժը, Խոնավ տեղերում միշտ էլ բոժոժը լրիվ չի չորանում
 Չոր և տաք տեղերի բոժոժի չորացման տարբերությունը կազ-
 մում և մոտ 3⁰/₀:

Վորդը բոժոժը հյուսելու և ցախին ամրացնելու համար սկզբում բաց և թողնում անհավասար թել, վորը նա հաճախ կտրատում և, ծախին միացվող այդ անհավասար և կտրատվող թելը կոչվում և մետաքսի բամբակ (сдор): Մետաքսե բամբակից հետո նա սկսում և հյուսել բոժոժը, վորի վերին շերտը կոչվում և Թրիզոն: Վերջինս ունի անկանոն կառուցվածք և կտրատվում և, Թրիզոնից հետո վորդը բաց և թողնում ամբողջական թել՝ կազմելով խիտ թաղանթ, վորը հանդիսանում և մետաքսե պատյանի ամենաարժեքավոր մասը, իսկական մետաքսաթելը:

Վորդը բոժոժ հյուսելու ալիստանքի վերջում բաց և թողնում չափազանց բարակ մետաքսաթել, վորը ստանձային նյութերով միանալով՝ կազմում և բոժոժի վերջին շերտը: Բոժոժների այս մասը կոչվում և մետաքսաթաղանթ (բասինետ), վորը մանրամասնում թել քաշելու ժամանակ չի քանդվում:

Շերամի ամեն մի ցեղ հյուսում և յուրահաասակ ձևի բոժոժ: Այն բոժոժները, վորոնք իրենց ձևով խիստ տարբերվում են այդ նույն ցեղի նորձալ բոժոժներից, կոչվում են աձև բոժոժներ: Հաճախ պատահում և, վոր ցախի վրա մի քանի վորդեր իրար մոտ լինելով՝ բոժոժը միասին են հյուսում: Այն բոժոժները, վոր հյուսել են յերկու կամ յերեք վորդեր միասին, ընդունված և անվանել զույգ բոժոժ: Անհրաժեշտ և նշել, վոր վորդերը բոժոժը միասին են հյուսում միայն այն ժամանակ, յերբ յերկուսն էլ բոժոժ հյուսելու ալիստանքը միասին են սկսել և միևնույն տեղում: Զույգ բոժոժներն իրենց ձևով միանգամայն տարբերվում են նորձալ բոժոժներից—լինում են ավելի մեծ, ավելի և անկանոն հյուսվածքով:

Այն բոժոժները, վորոնց պատյանը լինում և թույլ, փափուկ և շերտավոր, կոչվում են կերպասային (атласистый): Բոժոժների կերպասայնությունը լինում և տարբեր աստիճանի, վորի ծաղումը մինչ որս պարզված չի: Յենթադրում են, վոր այդ բացասական հատկությունը ժառանգական և: Տարբեր ցեղի բոժոժներ ունենում են կերպասայնության տարբեր աստիճան: Սպիտակ ցեղի բոժոժներում առաքսայիններն ավելի շատ են լինում, քան դեղին ցեղերում: Նույն պարտիայում լավ բոժոժների հետ միասին միշտ ևլ վորոշ չափով պատահում են թույլ և բարակ պատյան ունեցող բոժոժներ: Նման բոժոժները կոչվում են

կիսանյութական բոժոժներ—«սակ-փաշախ»։ Բոժոժների կիսանյութական լինելը բացատրվում է մի քանի պատճառներով։ 1) վորդը բոժոժ հյուսնելիս կատարում է վորոնուկներ, վորի հետևանքով վորոշ չափով կորցնում է մետաքսաթելը։ 2) բոժոժ հյուսնելիս մետաքսաթելի ամբողջությամբ չհյուսվելը։ 3) վերջին հասակում վորդերին պակաս կերակրելը և 4) վորդը դեղնացավով կամ մուսկարգինացով հիվանդանալու դեպքում։

Ֆլաշերիով կամ դեղնացավով հիվանդացած վորդը բոժոժը հյուսնելուց հետո մահանում է և քայքայվելով՝ կեղատում է բոժոժը։ Նման կիսանյութական կեղատված բոժոժները կոչվում են սևի յլատ։

Հաճախ պատահում է, վոր բոժոժի մի ծայրը ծակ կամ չափազանց քարակ ու թավանցիկ է լինում։ Նման բոժոժները կոչվում են ծակ բոժոժներ։ Այդ աննորմալ յերևույթը նկատվում է դեղնացավով վարակված պարտիաներում։

Յերբ առողջ բոժոժները քայվում են ու չխաբ բոժոժին, կամ յերբ վորդը ցախ և բարձրանում, արտադրած դեղնագույն հեղուկը քայվելով նախորդ հյուսված բոժոժին՝ կեղատում է այն։ Նման ձևերով կեղատված բոժոժները կոչվում են բծավոր բոժոժներ։

Բոժոժի ձևով ու գույնը.—Բոժոժներն ըստ իրենց արտաքին տեսքի հիմնականում կարող են բաժանվել 3 խմբի՝ ելիպսաձև, կլոր և սրածայր։ Յեղերից մեծ մասի բոժոժները լինում են ելիպսաձև՝ մեջտեղում ավելի կամ պակաս դուռկանման սեղմված։ Կան ցեղեր, վորոնց ելիպսաձև բոժոժների մեկ կամ յերկու ծայրերը լինում են սրածայր։

Ըստ ցեղերի՝ բոժոժները գույները լինում են սպիտակ, մաքնագույն, նարնջագույն, վարդագույն և կանաչ։ Բացի այս հիմնական գույներից՝ կարող են լինել ավելի մուգ կամ բաց։

Բոժոժի ընական գույնը ճիշդում է, արևի ճառագայթների ազդեցություներից խուսանում, իսկ սապոնաջրում յիփելիս բւրբուրի են սպիտակում և Բոժոժի գույնը կապ չունի մետաքսաթելի վերակի հետ, ըայց դեղին ցեղի բոժոժներն ավելի լավ են սպիտակներից, իսկ սպիտակներն էլ, իրենց հերթին, ավելի լավ են կանաչներից։ Յեթե մի պարտիայում լինում են գույնզգույն բոժոժներ, այդ նշան է, վոր այդպիսի՝ պարտիան մաքուր ցեղից չէ, այլ մի քանի ցեղերի խառնուրդ։ Ճառ բոժոժներից ստացված մետաքսաթելը միատեսակ չի ներկվում, դրա համար ել ավել-

լի ցածր և գնահատվում։ Մաքուր ցիգերում՝ բոժոժները լինում են միադուլն, բայց կարող են անշտան չափով իրենց հիմնական դուլնից ավելի բաց կամ մուգ լինել։

Բոժոժի հետիկավորությունը. — Բոժոժի պատյանն արտաքուստ հարթ չէ, այլ կազմված և հատիկավոր խորդաթյուններից։ Բոժոժի պատյանի փոքրիկ ուռուցիկները կազմում են նրա հատիկավորությունը։ Բոժոժի հատիկավոր լինելու պատճառը մինչև որս չի սկսում աստիճանաբար։ Ըստ Տիխամիրովի՝ հատիկավորությունն առաջանում և բոժոժը չորանալու հետևանքով՝ նրա պատյանում առաջացած սեղմումներից։ Բոժոժի հատիկավոր լինելու մասին առաջին այլ կարծիքներ չկան։ Ըստ ուռուցքների մեծության՝ բոժոժի հատիկավորությունը կարելի չէ բաժանել մեծի, միջինի և մանրի։ Մեծ բոժոժներ հյուսող ցիգերում հատիկավորությունն ավելի մեծ է, քան փոքր ցիգերում։

Բոժոժի ամրությունը. — Բոժոժի պատյանի ցույց ավանդի մազբությունը՝ սեղմումների՝ կազմում և նրա ամրությունը։

Բոժոժի ամրությունը կարելի չէ վորոշել հատուկ գործիքով կամ ուղղակի մատներով՝ սեղմելով։ Առաջին դեպքում բոժոժը դրվում է յերկու տափակ շերտերի մեջ և մինչև մեկ միլիմետր սեղմվում։ Բոժոժը մինչև մեկ միլիմետր սեղմելու անհրաժեշտ ուժը, արտահայտված գրամներով՝ կազմում և նրա ամրությունը չափելու բոժոժի ամրությունը մատներով չափելու համար անհրաժեշտ է հատություն ունենալ։ Այդ յերկու ձևերով էլ բոժոժի ամրությունը վորոշելը համարվում և վոչ այնքան ճիշտ։ Բոժոժներն իրենց ամրությամբ բաժանվում են յերեք խմբի։ Բոժոժի ամրությունը հանդիսանում և նրա վորակական ցուցանիշներից մեկը։

Բոժոժի ամրությունը գլխավորապես կախված և նրա խնամքից։ Վատ կերակրված վորդերը հյուսում են բարակ պատյանով բոժոժներ։ Ըստ բոժոժի պատյանի կառուցվածքի և նրա մեջ պարունակված միտաքսաթելի քանակի՝ ինչպես տարբեր ցիգերում, այնպես էլ միևնույն ցիգում բոժոժի ամրությունը նշանակալի չափով փոփոխման է յենթա բկվում։

Մանր կամ մեծ բոժոժները տեղասային հարաբերությամբ միտաքսաթել են պարունակում, բայց ամրության տեսակետից փոքր բոժոժները մեծերից ավելի ամուր են լինում, կամ այլ կերպ ասած՝ մեծ բոժոժներն ավելի հեշտ են սեղմվում, քան փոքրերը։

Բոժոժի բաղադրիչ մասերը.—Նորմալ հյուսված բոժոժը կազմված է հարսնյակից, մաշկից և մետաքսապայանից: Վերջը հարսնյակի ձևակերպվելուց 8—9 ար հետո՝ բոժոժի բաղադրիչ մասերը միջին հաշվով լինում են տոկոսային հարաբերությամբ.

հարսնյակի քաշը կազմում է	85,25%
մետաքսապատ. »	» 4,25 »
մաշկի »	» 0,25 »

Կենդանի արու բոժոժի մեջ մետաքսի ընդհանուր տոկոսը կազմում է 13—15%, իսկ եղ բոժոժում՝ 11—15%:

Արու և եղ բոժոժների բաղադրիչ մասերը հետևյալ տոկոսային հարաբերությամբ են լինում.

	արու	եղ
հարսնյակի քաշը կազմում է	84,5%	86,0%
մետաքսապատ. »	» 15,0 »	» 13,5 »
մաշկի »	» 0,5 »	» 0,5 »

Սեթի արու բոժոժի միջին քաշը հաշվենք 2 դրամ, եզինը 16%ով կամ 2,32 դրամով ավելի չե. այդ դեպքում բոժոժի կընային բացարձակ միավորները կլինեն հետևյալ կերպ.

	արու	եղ
հարսնյակը կընում է	1690 մգ	1995,2 մգ
մետաքսապատ. »	» 300 »	» 312,2 »
մաշկը »	» 10 »	» 11,6 »

Եղ բոժոժի մետաքսապայանը քիչ մանր և արվի մետաքսապայանից, բայց այդ տարբերությունը այնքան չնչին է, վեր բոժոժի վերակի տեսակետից առանձնապես մեծ դեր չի կարող խաղալ: Ըստ հարսնյակի հատանտնալում՝ թաց բոժոժի մետաքսանալությունը յենթարկվում և տատանման: Միջին հաշվով չոր բոժոժի 45%—ը կազմում է մետաքսը, իսկ մնացած 55%—ը՝ հարսնյակն ու պայանը:

Թե չոր և թե թաց կենդանի բոժոժում արվի և եզի մետաքսի տոկոսային հարաբերությունը ասարեր և Չնայած արու բոժոժը բացարձակ քաշով պակաս մետաքս և պարունակում, բայց տոկոսային հարաբերությամբ նրա մետաքսն ավելի չե եղից: Չորացրած արու բոժոժի մետաքսապայանը կազմում է 46,55%, հարսնյակը և մաշկը՝ 53,03%, Այսպիսով մետաքսն արու բոժոժում ավելի չափ է, քան եղ բոժոժում: Մետաքսապայանի բացարձակ քաշը կազմված է բոժոժի մեծությունը բնորոշող

աբաաքին նշաններին՝ այսինքն՝ քաշից, յերկարությունից, լայն-
քից, գոտկավորությունից, հատիկավորությունից և խորություն-
նից, իսկ տոկոսային հարաբերությամբ կամ կոեֆիցիենտով մե-
տաքսի պարունակությունը նույնաման կախումներ չունի։ Բոժո-
թի քաշը և ձևը մետաքսի յելույթի (աանդիման) հետ կապ չունի։ Եղ-
վորդի բոժոժը, ինչպես ասացինք, արվից քիչ ավելի ծանր է,
բայց միջին հաշվով, առանց տարբերություն դնելու սեռի մեջ,
մետաքսապատյանի քաշը հավասար է 0,3 զրամի։ Ինքնըստին-
քյան պարզ է, վոր ըստ ցեղերի և բոժոժի վարակի՝ մետաքսա-
պատյանի քաշը խիստ փոփոխման է յենթաբնկում։

Բոժոժի ամենակարևոր և ամենաարժեքավոր մասը կազ-
մում է մետաքսապատյանը. այդ իսկ պատճառով բոժոժի վո-
րակը վորոշելիս ուշադրություն պետք է դարձնել մետաքսապա-
տյանի վրա։ Տարբեր ցեղեր և նույնիսկ նույն ցեղի տարբեր բո-
ժոժներ ունենում են մետաքսապատյանի տարբեր կառույցվածք
և քանդվելու տարբեր ունակություններ, հետևաբար տարբեր
տոկոսային հարաբերությամբ են մետաքսաթել տալիս։

Նկատված է, վոր ավելի խիտ հյուսված բոժոժների մետաք-
սապատյաններն ավելի լավ են քանդվում և տոկոսային հարա-
բերությամբ ավելի շատ մետաքսաթել են տալիս։

«Բաղդադ» և «Ասկոլի» ցեղերը, վորոնք տոկոսային հարա-
բերությամբ նույնքան մետաքս են պարունակում ($43,6\%$),
միասեռակ. չեն քանդվում։ «Ասկալին», վորն ավելի խիտ է
հյուսված, ավելի հեշտ է քանդվում, հետևաբար մետաքսի թելի
յելույթն էլ բարձր է, ինչպես յերևում է հետևյալ աղյուսակից։

Տեսակները	մետաքս	Ֆրիզոն	Թաղանթ
«Բաղդադ»	72,2%	19,5%	8,3%
«Ասկոլին»	74,2 »	18,4 »	8,3 »

Բոժոժի քանդվելու ունակությունը վոչ մի կապ չունի նրա
մեծության հետ։ Թե մեծ և թե մանր բոժոժները քանդվում են
միահավասար։

Մետաքսապատյանի քանդվելու տեսակետից բոժոժի ձևն
ունի վորոշ նշանակութուն։ Ձվաձև ցեղի մեջ յեղած սրածայր
բոժոժները մյուսներից ավելի վատ են քանդվում։ Դրա հիմա-
կան պատճառն այն է, վոր քանդելիս սրածայր մասն ավելի
շատ քանդվելով՝ ծակվում է։ Բոժոժի նեղ կամ լայն լինելը
քանդվելու տեսակետից նշանակութուն չունի։ Այն բոժոժները,
վորոնց մեջտեղի գոտկանման սեղմվածքը շատ խորն է, ավելի

ժողով են քանդվում։ հաճախ սեղմված մասն ամբիլի շուտ քանդվելով՝ ծակվում են։ Բոժոժի նույնաման անկանոն կառուցվածքն առաջանում են նրանից, վոր վորդն անկանոն են հյուսում բոժոժը։

Մետաքսապայանի քանդվելու հատկութունն ուղղակի կախում ունի նրա մեջ յեղած մետաքսի քանակից։ Վորքան բոժոժի մեջ մետաքսն առատ է, այնքան հեշտ է քանդվում։ Նման կապն առաջանում են նրանից, վոր ինչպես ֆրիզոնը, այնպես էլ քաղաքը թե՛ առատ և թե՛ ամբիլի նվազ մետաքսաթել ունեցող բոժոժներում ունենում են նույն քաղը, մինչդեռ մետաքսը մետաքսը տարբեր քաղ ունի։

Թե՛ եզրի և թե՛ արվի մետաքսապայաններն ունեն նույն կառուցվածքը և նույնաման էլ քանդվում են։

Բոժոժը փորձնական դադարահում քանդելիս միջին հաշվով ապրիս և 73% մետաքսաթել, 19% ֆրիզոն և 8% թազանթ։

Բոժոժ Բոմիլը.— Բոժոժները քանդելուց առաջ տնդրածեղան նրանց միջից առանձնացնել զույգ, սև և սպիտակ չիտրը, ծակ, տձև, չափազանց քրածայր բոժոժները։

Բոժոժ քանդելը շերամի վորդի կատարած աշխատանքի հակառակ գործողութունն է։

Ինչպես արդեն գիտենք, վորդը բոժոժ հյուսելիս մետաքսաթելը պատում են դեռ չորացած խեժային նյութով, վորով և մետաքսաթելը կպչում է իրար։ հետևաբար, վորպեսզի մետաքսաթելը քանդվի, նախ և առաջ պիտք է փափկացնել այդ խեժային նյութը։ Բոժոժը վորդ ժամանակ 70—80° Ց. տաքութուն ունեցող ջրում պահելիս, հիշյալ խեժային նյութը վե՛լ միայն փափկանում է, այլ նույնիսկ նրա վորդը մասը լուծվում։ հետևաբար դրանից հետո միանգամայն հնարավոր է լինում քանդել բոժոժը

Լավ քանդված բոժոժը 800—850 մետր յերկարությամբ մետաքսաթել և ունենում։

Գործարանային պայմաններում յերբեք հատ-հատ բոժոժներից առանձին-առանձին մետաքսաթել չեն քանդում, այլ նույն յառանջին՝ 3—10 բոժոժի թելն իրար միացնելով՝ քանդում են։ Բոժոժից ստացված թելն ընդունված է անվանել գրեժ։ Այդ իրենից ներկայացնում են դեռ հում և չվերամշակված մետաքսաթել, վորը գործածական մետաքս դառնալու համար դեռ միշտ քվերամշակումների կարիք է զգում։

Գարտիայի տարբեր տեղերից վերցնում են ընդունված յեր-

Հարաբերումը նմուշ և կշռում: Պարզ և, վարձան բարակ և ավյալ նմուշը, այնքան քաղը պակաս կլինի և յեթե տարրեր նմուշների քաշի մեջ լինեն մեծ տարբերություններ, այդ նշան և, վոր պարական անհավասար գրեծայից և կազմված: Ինչպես վերևում հիշված և, գրեծան իրենից ներկայացնում և դեռ հում մեղաքս: Վերադառնալ նրա վերայից խեղճին նշալը հեռացվի, անհրաժեշտ և սաղոնաջրում յեփել: Դրա համար հարկավոր և նախ՝ յեփել 25%-անոց, ապա՝ աստը ասկոտանոց սաղոնաջրում: Խեղճին նշալը հեռացնելուց հետո գրեծան իր քաշից կորցնում և 17—28%:

Մեղաքսը սաղոնաջրում յեփելուց հետո՝ վոր միայն իր քաշից և կորցնում, այլև իր ամբողջականից՝ 14%-ով և ելուստից հատկությունից՝ 25%-ով: Բացի արանից, մեղաքսը Հափսդանց փոփկանում և, կորցնում իր բնական գույնը, փայլում և և լավ ներկվելու ընդունակ դառնում: Նորմալ պայմաններում, մեղաքսն իր մեջ պարունակում և իր քաշի 10%-ի Հափս խոնավություն: Խոնավ պայմաններում այն իր մեջ ընդունում և նույնիսկ 20—30%-ով խոնավություն: Այդպես խոնավություն պարունակելու դեպքում, մեղքով շոշափելիս այդպիսին չի դրացվում: Այդ իսկ պատճառով շատ հաճախ մեղաքսը ծախելիս՝ նույն մեղաքսաթելի արժեքով ծախվում և նաև նրա միջի ջուրը: Այդ դրությունը վերջ տալու համար այսպես կոչված հատուկ կոնգիցիոն ապարատում մեղաքսաթելի նմուշները վորոշ ժամանակ պահում են 120° Ց. ջերմաստիճանի մեջ: Մերք այդ նմուշները բացարձակապես չորանան՝ նրանց քաշի 20%-ի Հափսով ավելացվում և նորմալ խոնավությունը և այդ հարաբերությունը ընդունում ամբողջ պարական:

www.google.com

շարք արժեքավոր ցեղեր միանգամայն վոլնչացան Յեմերոպա-
յում, Փոքր Ասիայում և Անդրկովկասում:

Շերամապահուսթյան արագ ընկնելու հետևանքով կրճատվեց
մետաքսի արդյունաբերությունը: Այդ հանգամանքը պարտա-
դրեց բազմաթիվ ուղիներին լուրջ ուշադրություն դարձնել հիվան-
դություն պատճառների վրա: Անցյալ դարի 60-ական թվական-
ներին գերանական Պասսյորը ներկայացնում և իր հայտնի աշ-
խատությունը՝ ցելլուլար գրենա պատրաստելու մասին:

Ցելլուլար գրենա պատրաստելու սկզբունքը հետևյալն է.
Ամեն մի թիթեռ առանձին-առանձին մեկուսացվում և քսակնե-
րում: Թիթեռը ձուռն անելուց հետո՝ միկրոսկոպով ջննդում են և
վոլնչացնում այն թիթեռի հունդը, զորը հիվանդ և յեղել Պաս-
սյորի կողմից առաջարկված ցելլուլար գրենայի պատրաստման
ձևով. շերամապահուսթյանն աստիճանաբար վերականգնվում և և
մի շարք յերկրներում մինչև անգամ հնաբնակներ և դառնում
հոտցնել իր նախկին մակարդակին:

Պասսյորի կողմից ցելլուլար գրենա պատրաստելու ձևը
հայտարարվելուց հետո, մի շարք պետություններում գրենայի
արտադրությունն արագ կերպով սկսեց զարգանալ: Մյուս պե-
տությունների համեմատությամբ գրենայի արտադրությունը
չափազանց հեռու էր մնում ցարական Ռուսաստանում: Գրենայի
պատրաստումը Ռուսաստանին հայտնի չեր, իսկ կառավարու-
թյունը համարյա վոլ մի միջոց չէր ձեռնարկում գրենայի ար-
տադրությունը զարգացնելու համար: Այսպիսով նախկին Ռու-
սաստանի շերամապահուսթյան բախտն ամբողջությամբ կախված
եր արտասահմանի գրենաթի ֆերմաներից, զորոնք նախկին Ռու-
սաստան ելին ներմուծում միանգամայն ցածրորակ գրենա, զորը
հաճախ նույնիսկ չէր ապահովում միևնույն բերքատվությունը:

Շերամապահուսթյունը հիշյալ զրուսթյան մեջ եր մինչ խոր-
հրդայնացումը: Խորհրդայնացման հենց ուռաշին ռեբրից մեր
պետությունը ձեռք է առնում անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ գրե-
նայի պետական արտադրություն ստեղծելու ուղղությամբ և
հիշտ միջոցառումներ ստեղծելու հետևանքով կարճ ժամանակում
գրենայի արտադրությունն այնպիսի աստիճանի յե հասնում, զոր
վոլ միայն միանգամայն ազատվում ենք արտասահմանյան գրե-
նայից: այլ նույնիսկ ներկայումս մեր գրենայի մի մասը մեծ
հաջողությամբ արտահանում ենք:

Գրենան պետք է լինի միանգամայն վերահյալ Վորոկյալ

գրեմեա ասելով պէտք է հասկանալ տնային գրեմեա, վերից ստացված վորդերը լինում են առողջ, կենսունակ, միավազութայիններին դիմացող յեւ բացի դրանից՝ ընդունակ են տալու հետագա սերնդին իրենց դրակամ ամենաեղանակ հասկանիւնները:

Յեղացու բազայի ճիշտ կազմակերպումը և արտադրողների ընտրութիւնը՝ վերդերի, բոժոժի և թիթեռների սելեկցիան վորդակի չափով կարող են ապահովել վորակյալ գրենայի նկատմամբ թմրակիմած վորակական ցուցանիշները: Սակայն անհրաժեշտ է հիշել նույնպէս մեկ կտրեւորապէս պայման. դու գրենայի պահպանման տեխնիկական պայմանների ճիշտ կիրառումն և՛ սկսած ձու անելուց, մինչև գրենայի կենդանացումը: Առանց հիշյալ պայմանը կիրառելու, ամենաբարեխիղճ սելեկցիոն աշխատանքն անգամ չի տա ցանկալի արդյունքը, վորովհետև ամենալավ ծնողներից ստացված գրենան վերամշակման և պահպանման պարզեցումներում անբարենպաստ պայմանների յենթարկվելիս կարող է փշանալ կամ նշանակալի չափով վորակը դցել: Ամեն մի գրենայի պէտք է լավ լմանա, վոր վորակյալ գրենայի վորակական ցուցանիշները կերակրման վրա անգրադառնում են միայն այն ժամանակ, յերբ գրենան պահպանում և իր բոլոր վորակական ցուցանիշները մինչև արթնացումը:

Հիշելով այդ կանոնները՝ անհրաժեշտ է նշել, վոր արտադրական շենքերի և ձմեռանոցի բնույթը՝ նրանց կահավորումը, աշխատանքի և արտադրութեան կազմակերպումը մեծ չափով անդրադառնում են գրենայի վորակի վրա:

2. ԳՐԵՆԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՏԱՐԲԵՐ ՏՆԽՆԻԿԱԿԱՆ

ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գրեն-գործարանի ամբողջ աշխատանքը բաժանվում է հինգ սլոքների:

Յեղացու օերամի կերակրումն ժամանակագրաբար.—Այս ժամանակաշրջանն սկսվում է գրենայի բաշխման նախապատրաստական աշխատանքով և ավարտվում է բոժոժների հասունացումով: Հայաստանի պայմաններում այդ պարոցն ավարտվում է մայիսի վերջերին կամ հունիսի սկզբներին: Հիշյալ ժամանակաշրջանում կատարվում են կերի ֆոնդի և շերտամասերի հաշվառումն ու նախապատրաստումը, ինկուբատորիաների ընտրութիւնը, վորդերի կենդանացումը, նրանց խնամքը, բոժոժ հալածքը և տեղափոխելը գրեն-գործարան:

Պաշխիվանածի ժամանակագրացն. — Արտադրության այս ժամանակաշրջանում աշխատանքներն ամբողջութեամբ շրջանից անդամոթիվում են գրեն-գործարանն: Հիշյալ ժամանակաշրջանում գրեն-գործարանում կատարվում են մի շարք բավականին բարդ աշխատանքներ, ժողովից մի քանիսը հանդիսանում են հումուր-լի նկատմամբ ամենապատասխանատու աշխատանքները: Այստեղ աշխատանքը մեծ մասամբ տարվում է մոշ թե գրենայի, այլ հումուրլի — բոժոժի վերամշակման ուղղությամբ: Հիշյալ ժամանակաշրջանում գործարանում աշխատանքի տարրեր պրոցեսներն ընթանում են հետևյալ հերթականությամբ՝ բոժոժի պարտիաների ընդունումը, պարտիաների ընտրությունն արտաքին նշաններով (1-ին խոտանում), նմուշների խնդրացիան և հաճոյակի նախնական զննությունը (2-րդ խոտանում), բոժոժի մասսայական սեկեցիան՝ բոժոժի տեղավորումը պաշխիվանածի գործիքներում, թիթեաներ հավաքելը, թիթեաների դուգավորումը և բաժանումը, եղ թիթեաների մեկուսացումը քսակներում և ցտակներ շարելը:

Ընդունվող միկրոսկոպային ֆնուրյան ժամանակագրացն. — Հիշյալ աշխատանքը Հայաստանի պայմաններում սկսվում է ռգստոս ամսւմ և նայած գործարանի բեռնվածութեանը, միկրոսկոպիստների և բանուժի քանակին՝ ավարտվում է նոյեմբերի կեսերին, բայց մոշ ուղ գեկտեմբերի մեկից: Աշխատանքի այդ պրոցեսն ունի լաբորատորիական բնույթ. բացի գրանից, ալեկի պլանավորված է ընթանում, զան մեացյալ պրոցեսները:

Ընդհանուր միկրոսկոպային զննության ժամանակ բոլոր աշխատանքներն ի մի բերելով՝ ժողովում և այս կամ այն պարտիայի վերականգնողական ջանքերը: Հիշյալ ժամանակաշրջանում աշխատանքները դասավորվում են հետևյալ կարգով՝ անվտնջների տեսակավորումը (ֆիզիոլոգիական և արտադրական խոտանում), ընդհանուր միկրոսկոպային զննության և կոնարլի համար պրեպարատներ պատրաստելը, միկրոսկոպային զննություն և կոնարլ:

Գեմտյի վերամշակումը — այն է՝ գրենայի քամհարումը, լվացումը, չորացումը և ծրարումը (упаковка):

Գեմում մեղր պանպանիլու ժամանակագրացն. — Այս աշխատանքի ամենավերջին և ամենայնքալ պրոցեսն է: Սկսվում է գեկտեմբեր ամսւմ և ավարտվում է գարնանը՝ գրենան ինդուրատորիա անդամոթիվով: Այս ժամանակաշրջանը տարբեր պրոցեսներ չունի. ամբողջ աշխատանքը գրենան նորմալ պայմաններում պահպանելն է:

Դժն-գործարանի ցեղացու շերամի բազան հանդիսանում են մեկ կամ մի քանի շրջաններ, վորոնք գործարանին մասա-կարարում են հումուլթ-բոժոժ:

Վորպեպի գործարանը ցեղացու շրջանները լավ ապաստարկի և բոժոժներն արագ կերպով գործարան տեղադրելի, անհրաժեշտ և, վոր ցեղացու բոժոժի շրջանը գործարանին մոտ լինի Գործարանի կողմից ապաստարկող շրջաններ շառավիղը պետք և լինի վաճ ափելի 25 կիլոմետրից. այն և այն պայմանով, վոր շրջանը գործարանի հետ կապված լինի հարմար ճանապարհներով: Այն պեպքում, յորը շրջանը չունի հարմար ճանապարհներ և գործարանից կտրված և բնական արգելքներով— լեռներով և այլն, այդ պեպքում նույնիսկ 25 կիլոմետրը շատ և: Ամենանպատակահարմարն այն և, վոր գործարանը լինի ցեղացու բազայի կենտրոնում, ի հարկե, յեթե դրան արգելք չի հանդիսանում բանումի պակասը:

Ցեղացու շրջանը համաճարակային հիվանդություններից պաշտպանելու նպատակով ցանկալի յե ցեղացու շերամի կերակ-րումները կադմակերպել արդյունաբերական կերակրումներից հեռու վայրերում: Այստեղ անհրաժեշտ և շեղ, վոր Մեղրու շրջանը կտրելի յե որինակելի շերամապահական ցեղացու շրջան համա-րել վաճ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ Միության համար: Մեղրու շրջանն այլ շերամապահական շրջանների հետ համեմատելով՝ շափաղանց հարմար ձևով կտրված և բարձր լեռնաշղթա-ներով: Բացի այդ՝ նույն շրջանի տարբեր շերամապահական դյուզեր իրենց հերթին իրարից կտրված են բովանդանին բարձր լեռներով: Այսպիսով հիշյալ բնական պարիսպներն արգելք են հանդիսանում այլ շրջաններից համաճարակային հիվանդու-թյունների մուտք գործելուն:

Ցեղացու շերամապահական շրջանը պետք և ապահովի գոր-ծարանի հումուլթի ամբողջ պահանջը. այդ իսկ պատճառով ցեղացու շերամապահական բազայի ընտրությունը կատարելա-պետք և հաշվի առնել կերի ֆոնդը— թիկնու տերերի պաշարը, խնամվելիք գրենայի քանակը, շենքերի հարմարությունը և շե-րամապահների վորակը:

Յեղաացու շերամապահական շրջանը պետք է ունենա ևս անհրաժեշտ մի պայման։ Գործարանի աշխատանքները կանոնավոր ընթանալու համար նրա հոսմույթի—բոժոժի մատակարարումը պետք է կատարել այնպես, վեր բոժոժը միաժամանակ մուտք չգործի գործարան և վերջինս կարճ ժամանակում չմանրարևոնվի մեծ քանակությամբ բոժոժով։

Մեծածախանակ բոժոժի կուտակումը գործարանում առաջ է բերում մի շարք բացասական հետևանքներ, վերն անդրադառնում և դրենայի վորակի վրա։ Այդ բացասական հետևանքներից խուսափելու համար բոժոժը պետք է գործարան բերվի նախորդ մշակված պլանային կարգով. ուրիշ խոսքով՝ բոժոժի ընդունման ժամկետները պետք է յերկարաձգվեն։ Հիշյալ պայմանի կատարումը սերտորեն կախված է գործարանի յենթակա շրջանների կլիմայական պայմաններից։

Յեղաացու շերամապահական շրջանը կազմակերպելուց առաջ պետք է սկսումնասիրել նրա գյուղերի կլիմայական պայմանները, և յեթե տվյալ շրջանն ունենում է այնպիսի շերամապահական գյուղեր, վորոնցից մի մասը դասավորված է դաշտային, մի մասը նախալեռնային, մի մասն էլ լեռնային դաշինքում, այդ դեպքում տարբեր կլիմայական դոտի ունեցող գյուղերում գրենան տարբեր ժամանակներում կենդանացնելով՝ կարելի չե առանց խնամքի զնա հասցնելու, յերկարացնել բոժոժի ընդունումը գործարան։

Անհրաժեշտ ենք գտնում նշել, վոր գրենայի արթնացման ժամկետները հիշյալ ձևով դասավորելու տեսակետից Հայաստանի գրեն-գործարաններն ունեն չափազանց բարենպաստ պայմաններ։ Գործարանների մեծ մասն ունի տարբեր կլիմայական պայմաններով գյուղեր, վորի շնորհիվ հնարավոր է գրենայի ինկուբացիան բավականին յերկարացնել։ Այս տեսակետից բավականին հաջող են դասավորված Մեղրու շրջանի շերամապահական գյուղերը։ Վերջիններս գտնվում են տարբեր բարձրության վրա, այդ պատճառով էլ բոժոժի ընդունումը տևում է գրեթե ամբողջ մեկ ամիս։

Նպատակ ունենալով ցեղացու շերամապահական շրջաններից ստանալ ամենավորակյալ բոժոժներ, վորը հանդիսանում է գրենա ստանալու հոսմույթը, ցեղացու շրջաններում խնամվում է բացառապես ցեղացու կամ ռեպրոդուկցիոն (վերարտադրական) գրենա։

Յեղացու շրջաններում պետք է բազմացնել միայն մի ցեղի վորդ. իսկ այն դեպքում, յերբ գործարանի ուլանի մեջ մտնում է մի քանի ցեղի դրենա պատրաստելը, այդ դեպքում պետք է սահմանափակվել ամենաշատը յերկու ցեղով:

Յեղացու շրջանում պետք է խնամել միայն այն ցեղի վորդերը, վորոնք համապատասխանում են շրջանի բոլոր պայմաններին և տալիս են ամենալավ արդյունքը:

4. ՅԵՂԱՑՈՒ ՇԵՐԱՄԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ

Յեղացու շերամի խնամքը պետք է հանձնարարել վորձառու և բարեխիղճ շերամապահներին, վորոնք պետք է կատարեն շերամի խնամքի բոլոր գոհանոցները: Խնամքն սկսելուց առաջ գործարանն իր հրահանգիչների միջոցով պետք է տանի նախապատրաստական աշխատանք, այն է՝ ընտրել առավել հարմար շենքեր, ստուգել խնամքի պարագաների դրությունը, կատարել շենքերի մաքրումը և ավտահանումը, ստուգել շերամապահների կերի ֆոնդի պաշարը և վորդերը բաշխել ըստ իր ունեցած կերի ֆոնդի: Գրենագործարանը պետք է խիստ հսկողություն սահմանի, վոր շրջանում կողմնակի կերպով պատրաստված գրենայի վորդեր չխնամվեն:

Մեզ մոտ, ԽՍՀՄ-ի համարյա բոլոր շրջաններում շերամապահներին տրվում են արթնացած վիճակում վորդեր: Յեղացու շրջաններում գրենան շերամապահներին արթնացած վիճակում բաշխելը պետք է պարտադիր լինի:

Յեղացու շերամի կերակրումը պետք է գործարանի մշտական հսկողության տակ լինի: Կերակրման սպասարկումը պետք է այնպես լինի, վոր հրահանգիչը հնարավորություն ունենա տուջին չորս հասակներում հաճախել շերամատուն, յուրաքանչյուր հասակում առնվազը 2 անգամ, իսկ հինգերորդ հասակում՝ առնվազը 3 անգամ, վորից մեկ անգամի անպայման բոժոժ հյուսելու ժամանակ, վորովհետև վերջին հասակում հետաքննող վորդերի մեջ շատ ավելի հեշտ է վորդել այս կամ այն հիվանդության ներկայությունը: Ամեն մի հաճախման ժամանակ հրահանգիչը հատուկ քարտերում պետք է գրանցի խնամքի դրությունը՝ նշելով խնամքի բոլոր դրական և բացասական կողմերը:

Շերամապահը, վորը կերակրում է ցեղացու շերամը, պարտավոր է կատարել հրահանգիչի բոլոր ցուցումները: Հրահանգիչը

կերակրման վորակը մնանատելին՝ պետք է նկատի ունենա խնամ-
քի սկզբից մինչև բոժոժ հյուսելու ժամանակվա բոլոր գրանցու-
մերը: Վերջին հաճախման ժամանակ հրահանգվել պետք է հայտ-
նի շերամապանին բոժոժ հալածելու ժամանակի մասին: Ինչպես
արդեն նախընթաց դուրսերից ևլ դիտենք, բոժոժը ժամանակին
հալածելը նրա վորակի պահպանման հիմնական պայմաններից
մեկն է: Այս պայմանն առավել նշանակալի յն ցնդացու բոժոժի
դեպքում, վորովհետև գործարանում գլխավորապես պետք է գործ
ունենանք բոժոժի միջի թիթեռի հետ. նույնիսկ ամենավաղը
անփութությունը կարող է ֆնտսել հարսնյակին, հետևապես
և թիթեռին: Վորպես կանոն՝ անհրաժեշտ է ընդունել, վոր սեր-
մացվի հատկացված պարտիայի բոժոժները պետք է հալածել
կամ բոժոժ հյուսելու սկզբի սրվանից հալված 12-րդ ուրը և կամ
վերջին վորդերի բոժոժ հյուսելուց հետո՝ իներորդ սրը: Բոժոժ-
ները հիշյալ ժամանակում հալածելիս կարելի յն միանգամայն
վստահ լինել, վոր բոլոր վորդերն արդեն ձևափոխված են հարս-
նյակի, և վերջինիս խիտիային պայանն այնքան է ամրացած,
վոր թիթեռ չարժուկներից հարսնյակը չի ֆնտսվի:

Շերամապանը սերմացու բոժոժները հալածելիս՝ այդպիսի-
ները պետք է բարակ շերտով փռի և բոժոժը լրիվ հալածելուց
հետո՝ անմիջապես անդափոխի գործարան: Բոժոժների հետ միա-
տին անհրաժեշտ է ներկայացնել փվյալ պարտիայի ընդթափը:
Ամեն մի շերամապան պետք է լավ իմանա, վոր բոժոժի մեջ
գտնվում է կենդանի հարսնյակ, վորը դառնալու յն թիթեռ և տա-
լու յն ցնդացու նյութը—գրենան:

Դրեն-գործարանին հարկավոր է վոչ թե բոժոժի մեղաց-
ապառյանը, այլ թիթեռը, վորը թուլանում է, յնթե բոժոժի
հետ վարվում ենք անզգուշ: Այդ իսկ պատճառով բարեխիղճ և
պարտաճանաչ ցնդացու շերամ խնամող շերամապանը պետք է
բոժոժը հալածելու և տեղափոխելու ժամանակ առավել ուշադիր
վերաբերմունք ցույց տա:

Դրեն-գործարանի անմիջական պարտականությունն է շե-
րամապանների մեջ տանել լայն բացատրական ալխատանք՝ բո-
ժոժը հալածելու և գործարան տեղափոխելու մասին: Շերամա-
պաններին վերավորակավորելու համար անհրաժեշտ է, վոր դը-
ծարանը ձմեռվա ամիսներին շերամապանների մեջ անցկացնի
զբույցներ՝ շերամապանության բոլոր պրոցեսների մասին:

Գրեն-դործարանը պարտադրոք և հատուկ աշխարհություն դարձնել տարալի վրա: Ամենալավ տարան համարվում է վոչ ալիքան մեծ՝ 40 սանտիմ տրամագիծ ունեցող կլոր կողովը: Բո-
ժոժը կողովով տեղափոխելիս ողք հնդուկթյամբ և անցնում ըս-
ժոժներին, վորոնք հասնում են դործարան՝ առանց փնտալելու:

Բոժոժը պետք և տեղափոխել ողվա ավելի հով ժամերին: Բոժոժի տեղափոխումն ալիքան պետք և կառավարել, վոր գործա-
րան հասնեն առավոտյան ժամի 5-ից 11-ը:

Բոժոժի ընդունումը գրենայի արտադրության մեջ ամենա-
պատասխանատու մոմենտներից մեկն է հանդիսանում:

Աշխատանքներում խուճապ և անկանոնություն, չառաջա-
նալու համար, անհրաժեշտ է բոժոժի ընդունմանը ձևանարկե-
լուց առաջ՝ մի շարք նախապատրաստական աշխատանքներ կա-
ռարել, այն է՝ նախորդ նախապատրաստել և կարիքի դեպքում
վերանորոգել բոժոժի ընդունման հետ կապ ունեցող ամբողջ ին-
վենտարը, պահեստները, հավաքագրել փորձառու կշռողներ և
պահեստի բանվորներ: Պետք և նախորդ աշխատանքը կազմա-
կերպել ալիքան, վոր ընդունման ժամանակ բոժոժ կշռելու պրո-
ցեսում ընդհատումներ չառաջանան: Նույնը կարող և տեղի ունե-
նալ դարակներին և ընդհանրապես ընդունման ինվենտարի պա-
կաս լինելու հետևանքով: Բոժոժը գործարան հասնելուց հետո՝
անհրաժեշտ է խելոյն տարաններից դուրս բերել և նրանց պի-
տանիությունը վորոշելուց հետո անմիջապես տեղափոխել պա-
հեստ:

Վերևում արդեն հիշված է այն մասին, վոր յեթե բոժոժը
կարճ ժամանակում և մեծ քանակությամբ գործարան մտցվի,
գրանից առավանգում են մի շարք բացասական հետևանքներ: Ան-
հրաժեշտ են գտնում կրկին անգամ նշել, վոր անպլանային կարգով
բոժոժ ընդունելու դեպքում գործարանների բոժոժի պահեստնե-
րը, պապիրոնաժի սրահը չափազանց ծանրաբեռնվում են, և մեծ
քանակությամբ թիթեռներ են դուրս գալիս, վորոնց հավաքելու
համար կարճ ժամանակամիջոցում պահանջվում է մեծ քանակու-
թյամբ բանուժ և պապիրոնաժի ինվենտար:

Նման գրություն ստեղծվելիս՝ աշխատանքի ռադիոնալ կազմա-
կերպումը չափազանց դժվարանում է. հնարավոր չի լինում բոժոժի
և թիթեռների սեղևկեղան վորակով կատարել, ժամանակին մեկու-

տացնել թիթեռները. առաջանում և գրենայի կորուստ, մեծ քանակությամբ չրեզմեալորված գրենա, իրար են խառնվում անբեր բոժոժի և գրենայի պարտիաները և այլն:

Ընդհանրապես գործարանում նման խառը դրությունը տեղում և մի քանի որ, բայց այդ կարճ ժամանակը չափազանց կրիտիկական և, վերից առաջանում են անուղղելի սխալներ, ինչնում և գրենայի յեղևյթն ու վորակը, վորը, անտարակույս, անդրադառնում և և՛ գրենայի ինքնարժեքի վրա:

Գրենան պլանային ձևով արթնացնելիս գործարանը փրկվում և հիշյալ կրիտիկական մոմենտից, հետևաբար և անտեղի կորուստներից: Այս բաղորից հարց և ծագում, թե միաժամանակ թնչ քանակությամբ բոժոժ կարելի չե ընդունել, վորպեսզի գործարանը փրկվի հիշյալ գրությունից:

Գործարանում աշխատանքները հաջող տանելու համար հումուլթի (բոժոժի) մատակարարումը պետք և կատարել այնպես, վոր 1) գործարան բերվին միաժամանակ հասունացած բոժոժներ և 2) բոժոժի ընդունումն առանց ընդհատումների անել վոչ պակաս 25—30 որից: Այդ յերկու պայմանները հնարավոր և սանդեկ այն ժամանակ, յերբ գրենայի ինկուբացիան տարվում և հերթականությամբ, ըստ շրջանների կլիմայական պայմանների:

Այն բոժոժները, վորոնք անցել են բոլոր ընարություններից, խոտանումից, տեսակավորումից և արդեն տեղավորված են պապիլոնաժի գործիքներում, համարվում են արտագրությանը հանձնված բոժոժներ: Բոժոժի ընդունելու գործը պլանավորելիս՝ պետք և զեկավարվել գործարանի արդիքնապլանով նախատեսված չափանիշներով:

6. ԲՈԺՈՑԻ ՊԱՐՏԻԱՆԵՐԻ ՎՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Բոժոժի պարտիաների վորակի գնահատումն ոկսվում և կերակրման պրոցեսից:

Պարտիաների վորակի գնահատումը բավականին բարդ աշխատանք և և գրենայորից պահանջում և ունենալ մեծ փորձառություն՝ բացի ընդհանուր դիտելիքներից:

Գործարանում պարտիաների վորակի ճիշտ գնահատումից և կախված պատրաստված գրենայի վորակը: Այլ կերպ ասած՝ բոժոժի ընարությունը կազմում և հիմնական պրոցեսներից մեկը, վորից և կախված և գրենայի վորակը, յեղևյթը և ինքնարժեքը:

Բոժոժի վորակի դնանառումը և նրա պիտանիությունը զբենայի արտադրության համար՝ պետք է վորոշել հետևյալ ցուցանիշներով.

1. կերակրման ընթացքում հրահանգչի կատարած գրառ-
յութներով.

2. բոժոժներն արտաքուստ դիտելով—մորֆոլոգիական նշան-
ներով.

3. նմուշների միջոցով հարսնյակների դեղնացավով և ֆլա-
շերիով վարակված լինելը կամ չլինելն ստուգելով.

4. հարսնյակի և թիթեռի նախնական ճննությամբ՝ պե-
րինայի և այլ հիվանդությունների նկատմամբ.

Ստուգման տեխնիկան տարբեր յնքերներում կատարվում
և տարբեր ձևով. Մեզ մոտ՝ ամբողջ ՅՄՀՄ-ում ստուգումը կա-
տարվում է մի ընդհանուր ձևով.

Այս կամ այն պարտիայի վորակը վորոշելու համար նախ և
առաջ շերտաապահից պետք է պահանջել հրահանգչի կողմից
լրացված տվյալ պարտիայի բնութագրերը (քտորը), վորի միջո-
ցով դրենյորը ծանոթանում է վորդերի կերակրման և խնամքի
հետ:

Այն դեպքում, յերբ կերակրումը կատարված է անհամա-
պատասխան պայմաններում, պետք է նման պարտիան հանձնել
խեղճման, հակառակ դեպքում, այսինքն՝ յերբ տվյալ պարտիայի
բերքատվությունն ու կերակրումները յեղել են բարենպաստ,
նրանց նկատմամբ պետք է կատարել հետազոտ աշխատանքները.
Սկզբում անհրաժեշտ է վորոշել պարտիայի վորակը՝ արտաքուստ
դիտելով, ջրափնելով և հոտոտելով: Լավ պարտիան պետք է ունե-
նա նորմալ և մեծությամբ տվյալ ցիդին համապատասխանող բո-
ժոժներ:

Այն պարտիաներում, վորոնց մեջ խնամքի կամ բոժոժ հյու-
սելու ժամանակ առաջացել են հիվանդություններ (ֆլաշերի կամ
դեղնացավ), նկատվում են բժավոր բոժոժներ (սև չխար), լինում
են մոհացած և քայքայված վորդեր կամ հարսնյակներ, զբենա-
ժի համար չեն ընդունվում:

Ֆլաշերիով վարակված պարտիայի բոժոժներից գալիս է
առախորժ և այդ հիվանդությանն առանձնահատուկ հոտ: Փոր-
ձառու զբենյորն այդ հոտով հնչությամբ կարող է վորոշել վոր-
դերի ֆլաշերիով հիվանդացած լինելը: Հիշյալ ձևերով պարտիայի
վորակի վորոշելը կոչվում է պարտիայի առաջին զննմանում:

Բոժոժներին այդ առաջին ասուղումը կատարելուց հետո, յուրաքանչյուր պարտիայից պետք է վերցնել 200 բոժոժ և դնել ինկուբատորիայում՝ հարսնյակի հասունացումն արագացնելու նպատակով, իսկ ամբողջ պարտիան տեղավորել պահեստում — ավելի ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում:

Նմուշներն ավելի բարձր ջերմաստիճանի մեջ պահելու նպատակն է՝ մինչև պարտիայի հասունանալը արհեստականորեն հասունացնել նմուշները, վերպեսդի միկրոսկոպային քննության և արտաքին նշանների միջոցով վերոշենք նրանց պերրինա, ֆլաշերի և դեղնացավ հիվանդություններից վարակված լինելու տուգուր:

Ինկուբատորիայում ջերմաստիճանը պետք է հասցնել 30—32° Ց ի, իսկ պահեստում, ուր դրնվում են բոժոժները, ջերմաստիճանը տարվա այդ յեղանակին լինում է 22—24°: Ինկուբատորիայի և պահեստի ջերմաստիճաններն տարբերությունը լինելով մոտավորապես 8—10°, ինկուբատորիայում տեղավորված նմուշները պահեստում յեղած բոժոժներից մոտ 5 քաղվելի շատ հասունանալով՝ գրենյորին հնարավորություն են տալիս մինչև թիթեռների դուրս գալը խեղդել այն պարտիաները, վերոնք վարակված են հիվանդությամբ:

Հարսնյակների միկրոսկոպային քննությանը պետք է ևնայնաբից այն ժամանակ, յերբ վերջիններև աչքերը սևացած են: Հարսնյակի աչքերի սևանալը նշան է, վոր նա հասունացած է և մի քանի օրից ձևափոխվելու յն թիթեռի: Չհասունացած հարսնյակներին միկրոսկոպային քննության չեն յնթարկում, վորովհետև չհասունացած հարսնյակներում պերրինայի մարմինների ճանաչումն ավելի դժվոր է, և հարսնյակների հիվանդ լինելը վորոշելու համար կարճ է զգացվում դիտել ավելի շատ միկրոսկոպային դաշտեր: Միկրոսկոպային քննության յնթարկելու համար յուրաքանչյուր հարսնյակ առանձին առանձին պետք է տրորել համապատասխան սանդերում:

Պարտիայի վերակի ավելի ճիշտ գնահատումը տալու համար՝ նմուշները պետք է վերցնել վոչ թե միայն պարտիայի մի տեղից, այլ տարբեր տեղերից:

Պարտիայի նկատմամբ բոլոր ասուղումները կատարելուց հետո, հնարավոր է վորոշել գրենաժի համար նրա պիտանի կամ անպետք լինելը:

Բոժոժի լավ պարտիան պետք է ունենա հետևյալ ցուցանիշները՝

1. կերակրման դրության մասին շրջանային հրահանգչի գնահատականը պետք է լինի լավ.

2. պարտիաների մնացած բոլոր վորակական ցուցանիշները պետք է համապատասխան լինեն տեխնիկական հրահանգով սահմանված ցուցանիշներին:

Վորակական ցուցանիշները պարզելուց հետո, գրենաժի պիտանի պարտիաները տեղափոխում են բոժոժի պահեստը, իսկ խոտանված պարտիաներն ինկույն հանձնվում են խեղդման:

Բոժոժներն ընդունելուց հետո անհրաժեշտ է պահեստում պահել առանձին կահավորված դարակներով, վորոնց վրա բարակ շերտով փռում են բոժոժը: Բոժոժները լավ պահելու համար պահեստում պետք է լինի վորոշ շերմատիճան և խոնավություն, լավ ողափոխություն և հարմար կառուցված դարակներ: Բոժոժի պահպանման ամենապատշաճ շերմատիճանը համարվում է 18—23° Ց.:

Վորովհետև հարմարակները հասունացած ժամանակամիջոցում մեծ ջանակությամբ շուր են դոշորշիացնում, այդ պատճառով պահեստը պետք է լինի չոր և ողապա, հնարավորության դեպքում ցանկալի յե ունենալ վնտիլատոր:

Վորպեսզի հարմարակներն անհրաժեշտ չափով ող ստանան և միաժամանակ չվնասվեն, պետք է մեկ ջառակուսի մետք տարածության վրա տեղավորել վոչ ավելի քան 10 կիլոգրամ բոժոժ:

Նպատակահարմար է, վոր բոժոժի պահպանման պահեստը մոտ լինի թե ընդունման և թե տեսակավորման շենքին. ցանկալի յե մանավանդ, վոր այդ պահեստը լինի հիշյալ շենքերի տակի նկուղում:

20000 տուփ գրենա պատրաստող գործարանի բոժոժի պահեստը պետք է ունենա առնվազն 150—170 ջառակուսի մետր տարածություն: Պահեստի բարձրությունը պետք է լինի 3 մետր: Հիշյալ տարածությամբ շենք ունենալու դեպքում կարելի յե միաժամանակ տեղավորել 3500—3800 կիլոգրամ բոժոժ: Պահեստը պետք է դառնի հյուսիսային կամ հյուսիս-արևելյան կողմում: Պահեստի նման ողղության դեպքում ներսում բարձր շերմություն չի առաջանում:

Բոժոժի պահեստի համար նպատակահարմար է առանձնաց-

Նեկ վոչ թե մեկ, այլ յերկու սրահ: Վերջիններից մեկը պետք է լինի 60 քառակուսի մետրի սահմաններում: Այդ սրահում պետք է ջերմաստիճանի իջեցման համար ստեղծել համապատասխան հարմարություններ: Դա հնարավորություն է տալիս ջերմության մի քանի աստիճան ավելի ցածր պայմաններ ստեղծելով (բայց վոչ ցածր 16⁰-ից) դանդաղեցնել թիթեռների դուրս գալը, հակառակ դեպքում շոգ և մեծ քանակությամբ բոժոժ ստացած որևէ թիթեռների դուրս գալը մասսայական ընդլայնվելիք և կղզեմիջավայրի աշխատանքները դժբախտում:

7. ԲՈԺՈՑԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ

Արագդրությունը հատկացված բոժոժները, նախքան պապիլոնատի ցեխին հանձնելը, պետք է յնթարկել տեսակավորման:

Բոժոժի բամբակն անհավասար և կտրտված մետաքսաթելն է: Մի քանի ցեղեր (տալիելապես չինականները) առանձնապես հարուստ են լինում բամբակով: Վերջինիս քանակը բացի տեսակների հատկություն լինելուց՝ մեծ կապ ունի նաև ցալի ձևից ու նրա դասավորությունից: Բոժոժ հյուսելու համար անհարմար ցալեր դնելիս բամբակն անհամեմատ շատ է լինում: Բոժոժները օգտելուց հետո չնայած շերտապարը բամբակը հավաքում է, բայց այնուամենայնիվ ելի բավականին բամբակ է մնում, իսկ չափը չմեղքելու դեպքում չափազանց դժվարացնում է ինչպես թիթեռի՝ բոժոժից դուրս գալը, այնպես էլ նրա շարժվելը: Պատահում են դեպքեր, յերբ թիթեռները դուրս գալիս փաթավելով բամբակին՝ մահանում են: Բացի վերոհիշյալից, բամբակը ճորտրելում և բոժոժի խկական ձևը, նրա կառուցվածքը և բոժոժը պապիլոնատի ինվինտարի մեջ լցնելիս արդենք և հանդիսանում բոժոժները հավասարապես դասավորելում:

Նախքան բոժոժների տեսակավորումը, անհրաժեշտ է անպայման ազատել բոժոժները բամբակից: Այդ աշխատանքը կարելի է հանձնարարել պահուս վորակով բանվորներին, վորտե՛նտե առանձնապես բարդ աշխատանք է: Սակայն դրա վրա բավականին բանուժ է զարծադրվում, վորտե՛հետե մեկ բանվոր որակա՛ն կարող է բամբակից մաքրել վոչ ավելի, քան 50 կիլոգրամ բոժոժ: Բանվորական մեծ ուժ չգործադրելու նպատակով, հիշյալ պրոցեսը զարծարաններում պետք է կատարել հատուկ մե-

քանաների միջոցով, վորոն քնշվում են сдоросдиральная машина •
 Հիշյալ մեքենան ներկայումս պատրաստվում է Թիֆլիսի մեխա-
 նիկական գործարանում և գործադրվում է Միուլյան բոլոր
 գրեն-գործարաններում։ Աշխատեցնում են ձեռքով կամ ելեկտրո-
 կան ուժով։ Այդ մեքենան ունի շատ հասարակ կառուցվածք։
 Մեքենայի վրա աշխատում են յերկու բանվոր՝ որակյա մաքրե-
 լով 400—500 կիլոգրամ բոժոժ։ Այսպիսից պարզ յերևում է, վոր
 մեքենան գործադրելիս 500 կիլո բոժոժ բամբակից մաքրելու
 գործում մինչև 5 բանվորի խնայողություն է լինում։ Ամբողջ
 20000 տուփ գրենոս պատրաստելու համար անհրաժեշտ բոժոժի
 բամբակը մեքենայի միջոցով մաքրելիս կատարվի մինչև 100 բան-
 վորակա օրվա խնայողություն։ Բոժոժներ մաքրելուց հետո նույն
 օրահում պետք է կատարել բոժոժների տեսակավորումը։ Հիշյալ
 գլխում մենք նկատագրում ենք միայն արդյունաբերական գրե-
 նայի պատրաստման տեսակավորումը, վորը տարվում է ավելի
 վերակյալ բանվորների միջոցով։ Գրենայի արդյունաբերության
 մեջ անհրաժեշտ պայմաններից մեկը կազմում է բոժոժների տե-
 սակավորումը։ Տեսակավորումը մասսայական ընտրություն է
 (մասսայական սելեկցիա), վորի նպատակն է ընտրել այնպիսի
 բոժոժներ, վորոնք հենց առաջին սերնդում կարող են տալ ձևով,
 կառուցվածքով անպակաս բոժոժներ, վորոնցից անհամեմատ անո-
 բակ և քիչ մեծաքանակ է ստացվում։

Պարտիայի տեսակավորման ժամանակ անջատում են բնա-
 վոր, թույլ հյուսված, ճզմված, տվյալ ցնդի դուլինն անհամա-
 պատասխան, տձև, զույգ, շատ մեծ և կամ շարժվող, ատլասա-
 յին և բամբակոտ բոժոժները։ Հիշյալ բոժոժները մի մասը հենց
 առաջին սերնդում կարող է թուլացնել ցնդը, իսկ մի մասն էլ
 կարող է ժառանգաբար անցնել հաջորդ սերնդին։

Պրոֆեսոր Պյարկոմյե իր «Курс практического шелко-
 водства» ձեռնարկում գրում է. «Չափազանց մեծ և փոքր բո-
 ժոժներն առաջին իսկ սերնդում կարող են պարտիայի անհա-
 վասարության աղբյուր դառնալ, իսկ կերպասային և խորը գո-
 տիկավոր բոժոժներն անհրաժեշտ է տեսակավորել և գրենածից հա-
 նել այն պատճառով, վոր հիշյալ բոժոժներն առաջին իսկ սե-
 րնդում տալիս են զգալի չափով կերպասային և խորը գո-
 տիկներով բոժոժներ»։ Իսկ ինչ վերաբերում է զույգ բոժոժներին,
 դրանք գրենածից հանվում են վոչ միայն այն պատճառով, վոր
 վորոշ թեքում ունեն հետևյալ սերնդում զույգ բոժոժներ տա-
 լու, այլև այն պատճառով, վոր նախ հյուսելու ժամանակ վոր-
 ցերը յեղել են վատ պայմաններում, յերկրորդ՝ հաստ պատյան
 ունենալու հետևանքով բոժոժի միջի հարսնյակը տերացիայի

տեսակետից վատ պայմաններում և գտնվում, ավելի քիչ ոչ են ստացել և յերբորդ՝ ձևակերպված թիթեռները հաճախ հնարավոր-թյուն չեն ունենում դուրս գալու դույշ բոժոժից և յեթև նույնիսկ դուրս են գալիս, չափազանց թուլացած են լինում. վերջապես դույշ բոժոժից յերբեք հնարավորութուն չի լինում պարզել բո-ժոժի ձևը և նրա կառուցվածքը:

Պարտիան տեսակավորման յենթարկելուց հետո, դրենաժին հասկացված բոժոժները պետք և լինեն ձևով ճիշտ, գույնը և մե-ծութունը պետք և համապատասխանի տվյալ ցեղի նորմալ բո-ժոժներին, ամուր, միատեսակ, լավ կառուցվածք պետք և ունե-նան: Նման բոժոժները պետք և տեղավորել պատվիրանածի ին-վենտարի մեջ և հասկացնել արտադրությանը: Վորոշ գործա-րաններում, նախքան արտադրության հանձնելը, տեսակավորում են ըստ սևելի: Վերջինս մեծ մասամբ կատարում են հիբրիդ գրե-նա տատրաստելիս, վորի մասին կխոսենք հետևյալ գլուխներում:

Բոժոժի տեսակավորման համար ոգտադրվում են տարբեր կառուցվածք ունեցող մեքենաներ: Միության գործարաններում առավելապես տարածված և տեսակավորման կոնվեյերը: Վերջինս իրենից ներկայացնում և յերկար մի շրջանակ, վորի միջի յեր-կու տատաակների վրա տեղացած և սև գույնի բավականին հաստ կտորի կտորի յերկու ծայրերն իրար կարված, ձգված են տատաակների վրա: Պտուտակները պտտվելիս՝ կտորը շարժվում և, վորի յերկու կողմերում կանգնած բանվորները տեսակավորում են կոնվեյերի վրա գտնված և նրա հետ դանդաղ շարժվող բո-ժոժները: Կոնվեյերի մոտը դնում են կողմնակի կամ աբեղներ, վորոնցից յուրաքանչյուրի մեջ բանվորները լցնում են խոտանի տարբեր տեսակները: Գրենածի պիտանի բոժոժները կոնվեյերի վրա ավելի արագ շարժելով՝ Թափվում են ծայրում տեղավոր-ված արկղի մեջ:

Արտադրությունն ավելի ճիշտ կազմակերպելու նպատակով՝ կոնվեյերին անմիջականորեն կցված և բոժոժի բամբակ հավա-քող մեքենան, Բամբակը հավաքելուց հետո, բոժոժներն ուղղակի Թափվում են կոնվեյերի վրա: Հիշյալ կոնվեյերի գործադրման պիպքում որական վեց բանվոր կարող են տեսակավորել մինչև 360 կիլո բոժոժ: Կան և այլ տեսակավորման մեքենաներ՝ տար-բեր կառուցվածքով, բայց դրանք բոլորն ևլ կառուցված են բո-ժոժները ձևաքով տեսակավորելու սկզբունքի վրա: Ինչպես ար-գենն ոտված և, բոժոժի տեսակավորմանը պետք և մասնակցեն

առավել վերակյալ բանվորներ, վորոնք լավ նախաշում են խոտանի բույր ձևերը և տեսակները:

Տեսակավորված բոժոժները պապիլոնաժի գործիքների մեջ լցնելուց հետո պետք է տեղափոխել պապիլոնաժի սրահը: Գրենայի արդյունաբերությանը հասկացված բոժոժները հանձնում են պապիլոնաժի ցեխը, այսինքն՝ արտադրությանը, իսկ խոտան բոժոժներն ուղարկում են խեղդելու:

Որտան բոժոժները բաժանվում են յերկու խմբի. 1) բոժոժային (ստան, 2) սելեկցիոն խոտան:

Առաջին խմբի մեջ են մտնում՝ զուլդ, խուլ, բծավոր, տձև, կերպասային, ճզմված, սև չխար, սպիտակ չխար, իսկ յերկրորդ խմբի մեջ՝ ավյալ ցեղի համար վոչ բնորոշ ձևով, գույնով, հյուսվածքով, խորը գոտիկավոր, թույլ և չափազանց խոշոր կամ մանր բոժոժները:

8. ՊԱՊԻԼՈՆԱԺ

Պապիլոնաժը ֆրանսիական papillon լատից է: Պապիլոնաժը թիթեռների հետ կառարված աշխատանքի հանրագումարն է (թիթեռների հավաքելը, դուգավորումը, անջատումը և մեկուսացումը):

Գրենաժի հասկացված բոժոժները տեղավորելու համար մեծ մասամբ դործադրում են կոյկաներ և վանդակներ: Առաջինն իրենից ներկայացնում է բավականին յերկար և լայն արկղ (մոտավորապես $1,2 \times 0,8$ մետր), վերի կողերի բարձրությունը լինում է մինչև 10 սմ և անկյուններին սմբացնում են 20 սմ բարձրությամբ վոտներ: Արկղի հատակը պատրաստում են ծակոտ են բարակ տախտակից կամ ռեզինդուկից:

Հիշյալ արկղների մեջ բոժոժը լինում է բավականին բարակ շերտով, վոչ ավելի քան 5 սանտիմետր հաստությամբ:

Կոյկաները մինչև 10 հարկով դասավորվում են իրար վրա, վորոնց բարձրությունը լինում է մոտ 20 սանտիմետր: Դարակների ոգտագործման դեպքում դուքս յեկած թիթեռները հավաքելը բավականին դժվար է հետևյալ պատճառներով.

Թիթեռների հավաքման ժամանակ տնրաժեշտ է հերթադասությամբ իջեցնել դարակները: Սկզբում իջեցնում են ամենավերևում գտնված դարակը, վորը, թիթեռները հավաքելուց հե-

տո, դրվում է այլ տեղ: Ապա իշխեցնում են հետևյալ դարակը և թիթեռները հավաքելուց հետո՝ դնում առաջինի վրա, և այսպես շարունակ: Բացի դրանից՝ դարակների վրայից թիթեռները հավաքելիս, վերջիններս իրենց վրաներով կպչում են բոժոժներին և այսպիսով բավականին խանգարում են աշխատանքը:

Դրանից խույս տալու համար մի շարք դործարաններում ոգտադործում են ծակոտկեն թղթեր: Յերբ թիթեռները ծակերից բարձրանում են թղթի վրա, մարդիկ թիթեռները թղթերի հետ միասին տեղափոխում են:

Բացի այդ բացասական հատկությունից, դարակներն անհամեմատ շատ տեղ են դրավում:

Ավելի մեծ դործադրութուն ունեն պտպիլոնափի վանդակները: Դրանք կազմված են յերկու 120×60 սանտիմետր շրջանակներից, վորոնց ներքևի կողմից ամրացված են կախիչներ: Շրջանակների վրա ամուր ձգված են մետաղյա ցանցերը: Շրջանակները փակված լինելու դեպքում ցանցերի միջև ընկած տարածութունը պետք է լինի 4—5 սանտիմետր: Վերևից այդ դատարկ տարածութունը լցնում են բոժոժով: Շրջանակի վրա ամրացած ցանցը պետք է վռչ այնքան նեղ լինի, վոր թիթեռը չկարողանա արանքներից դուրս գալ և վռչ այնքան լայն, վոր բոժոժներն ընկնեն: Դրանք մոտ յերկու սանտիմետր տրամագիծ պետք է ունենան: Վանդակները կախում են հորիզոնական և զուգահեռ դասավորված ձողերի վրա, վորոնց յերկարութունը 2—4 մետր է: Յուրաքանչյուր զուգահեռ ձողի վրա կախում են յերկու հարկով զույգ վանդակները կամ այլ կերպ առած՝ 4 վանդակ:

Թիթեռները դուրս են գալիս շրջանակի յերկու կողմերում ամրացված ցանցի անցքներից, վորտեղ նրանք մնում են մինչև հավաքելը: Թիթեռներ հավաքելը կատարվում է շատ բարեք և ճիշտ: Վանդակի բոժոժները կարելի չե լցնել բավականին արագությամբ: Մի բանվոր մեկ որում կարող է լցնել մինչև 600 կլոգրամ բոժոժ: Բոժոժի լցնելը հնչատացնելու համար ոգտադործում են վանդակի յերկարությամբ մետաղյա ձաղար:

Դրեն-դործարաններից մի մասում մինչև վերջին փամանակներս դործադրվում են այսպես կոչված շարաններ: Բոժոժներն ուղղակի թելի վրա շարելով՝ կախում էյին պտպիլոնափի սրահում՝ ձողերի վրա: Շարաններն ունենում էյին մոտավորապես մեկ մետր յերկարութուն: Շարված բոժոժի միջից թիթեռները շատ հեշտ էյին դուրս գալիս, առանց արգելքի և լքիվ:

Շարանի դեպքում բոժոժներն անհամեմատ լավ պայմաններում են յին դառնում, բայց այս ձևը բավականին շատ բանուժ և պահանջում է Մի բանդոր 8 ժամվա ընթացքում կարող և շարել 16—18, կիրգրամ բոժոժ: Բայց վերոհիշյալից՝ շարանների վրայից թիթեռներ հավաքելը բավականին դժվար և, վերոհիշյալ շարանները շարվում են, հետևաբար թիթեռները հավաքելու ժամանակ անհրաժեշտ և լինում բռնել շարանները: Բայց դրանից՝ բոժոժ շարելու ժամանակ ասեղով ծակում և վնասում են հարսնակին:

Ինչ որպիսի յե վեր լինեն պատկերները գործիքները, նրանք պետք և համապատասխան են հետևյալ պայմաններին.

1. պետք և ունենան պարզ կառուցվածք, լինեն թեթև և հման.

2. չպետք և մեծ տարածություն պահել.

3. թիթեռները հեշտությամբ նկատվեն.

4. թիթեռները հավաքելու համար լինեն հարմար.

5. հարմար լինեն բոժոժները հեշտ աւարադ լցնելու համար:

Զուգավորված թիթեռներն տեսակավորման համար գործադրում են ֆաներկայից կամ հաստ խավաքարից (կարտոն) պատրաստված 50×40 սմ մեծությամբ մատուցարաններ կամ ջրջանակներ, վորոնց վրա ամրացված և կտոր (ռեկինգուկ): Շերջանակներն ունեն վորոնք, վորոնց շերտիվ հնարավոր և լինում դարսել իրար վրա մի քանի հարկ:

Բայց այս ձևը ևս ունի իր բացասական կողմերը. նախ՝ հնարավոր չի լինում նկատել բաժանված թիթեռները և, յերկրորդ՝ անվորձ բանվորների կողմից վերցված անպետք թիթեռներն անտեսանելի յնն դառնում անխաբատանալին:

Հայաստանում մեծ մասամբ այդ նպատակի համար գործադրում են յին սովորական սավանները, վոր ամրացնում են յին պատկերներ սրահի բոլոր պատերին: Սրանց վրա զույգ-զույգ տեղավորում են յին թիթեռները: Վերջիններն այդ ձևով դասավորելիս՝ բոլոր անպետքները հեշտությամբ նկատվում են և հնարավոր և լինում դրանք հեռացնել: Բայց սա ունի իր բացասական կողմերը. անհամեմատ մեծ բանուժ և պահանջում և շատ անհեշտ և գրավում: Զուգավորման համար սավանների գործադրումն աստիճանաբար վերացվում և:

Թիթեռները հավաքելու համար գործադրում են հատակը

Ֆաներկայով կամ Ռեվենդուկով ամրացված վրձքը շրջանակներու:

Կան գործարաններ, վորտեղ դուրս յնկած թիթեռները չեն հաժաքում ու տեղավորում զուգավորման պարագաների վրա, այլ թողնում են պապիլոնաթի ինվենտարի վրա, այնուհետև դուգավորված եգեթին անջատում են և մեկուսացնում: Այս դեպքում գործարանն ազատվում է յերկու բաժանանի մեծ բանուժ պահանջող պրոցեսից, այն և՛ թիթեռները հաժաքելուց, զուգավորելուց և զուգավորված թիթեռներն անջատելուց:

Բայց հիշալ ձևն ունի և իր բացասական կողմերը, վորոնք հիմնականում հետևյալն են.

1. Ինչպես ներքևում կտեսնենք, բոժոժներից թիթեռների դուրս դալը միաժամանակ չի կոտորվում, այլ տևում է մի քանի ժամ. այդ իսկ պատճառով մեկուսացման ժամանակ բոլոր այն թիթեռները, վորոնք ավելի շուտ են դուրս յնկել բոժոժներից, սկսում են ձու գնել, իսկ մնացած մասը, վոր անհամեմատ ուշ է դուրս դալիս և վորի հետևանքով զուգավորման պրոցեսը կարճ է լինում և լրիվ չի բեղմնավորվում, վորավհետև սկսվում է մեկուսացման պրոցեսը: Այդ դեպքում ստացվում է գլավի քանակությամբ չբեղմնավորված գրենա:

2. զուգավորման ժամանակ թիթեռներն անհանգիստ են լինում, վորովհետև ազատ արու թիթեռները միշտ շրջում են և խանգարում զուգավորվածներին:

3. եգեթից մի մասը չի բեղմնավորվում:

4. թիթեռներն անկանոն դասավորելու հետևանքով, անկանոն թիթեռներն տաանձնացնելը դժվարանում է:

5. թիթեռները ծակ բոժոժները չափազանց կեղտոտելով՝ մասամբ գցում են նրանց վորակը:

Այստեղից պարզ յերևում է, վոր թիթեռների զուգավորման համար անհրաժեշտ է ունենալ առանձին պարագաներ և բացի այդ, զուգավորումը պետք է կատարել այնպիսի տեղում, վոր տեխնիկավարները պապիլոնաթի սրահում շրջելիս տեսնեն թիթեռները և տան բանվորներին անհրաժեշտ ցուցումներ:

Թիթեռների զուգավորումն ավարտելուց հետո եզ թիթեռները պետք է տեղավորել մեկուսացման քսակների մեջ (ցելլուլ), վորոնք մեծ մասամբ պատրաստվում են կիսապերգամենաթյան թղթից՝ 10×11 սանտիմետր մեծությամբ: Ողբ քսակի մեջն անցնելու համար՝ քսակի յերկու կողմերից պատրաստում են մանր անցքեր: (Կպլուն ցեղի գրենա պատրաստելիս կաքելի յե թղթյա

քաակներին փախարինել մատառից ալատրաստած քաակներով, վորովհետև կայրոյ ցեղերի համար մատառի քաակներն ունեն մի շարք առաջնութիւններ: Այն տեղերում, ուր կան մեծ քանակութեամբ ըզնայներ և մորթիկներ միջատներ, նման քաակներէ գործադրումը հնարավոր չէ, վորովհետև ծակելով և ժտնելով քաակի մեջ՝ ուտում են թիթիկներ և թն դրնան):

Կան գործարաններ, վորտեղ թղթյա քաակները ալատրաստում են բաժակի ձևով: Նման քաակների բերանն ամրացնելու համար կան հատուկ կառուցվածք ունեցող մեքենաներ, այսպէս կոչված «լիկտորիոզա»: Վերջին ժամանակներս Դուքայիսի շերամապահական կայանի դիրեկտոր ընկեր Թեմիզաձեան կառուցել է հատուկ արկղ. քաակներով թիթեռներն այնտեղ դնելուց հետո բոլոր քաակների բերանները միանգամից փակում են, վորից հետո արկղը մեկուսացված քաակներով տեղափոխում են պահպանման համար: Ներկայումս մի շարք գործարաններում փորձեր են կատարում պարզելու տվյալ արկղների գործադրման նպատակահարմարութիւնը:

Մեծ մասամբ թիթեռներով մեկուսացված քաակները շարում են վուշե կամ № 10 թելով և կախում են ձողերի վրա: Նման ձևն ունի մի շարք առաջնութիւններ այն տեսակեակից, վոր շարված քաակները չեն ճգմվում, ամեն կողմից ողի հետ չփվում են: Բացի այն, վոր գրենայի շնչառութեան համար նպատակաւոր պայմաններ են ստեղծվում, թիթեռն ել շուտ է չորանում: Բայց հիշյալ ձևի գործադրումը շատ բանուժ է պահանջում: Մի բանվոր չորս ժամով ընթացքում կարող է շարել մինչև 3000 թիթեռ:

Յեւրուները կարելի չէ պահպանել նույնպէս ցանցերի, կողովների և հորիզոնաբար ձգված սալանների մեջ: Բայց վերջին ձևի գործադրման բացասական կողմն այն է, վոր նախ քաակների բերանները բացվելով՝ կարող են գրենայի կորուստ առաջանալ և բացի այդ՝ մանավանդ կողովներում և ցանցում քաակները չգմվելով՝ տեսողվում են հաստ շերտ, և դժվարանում է գրենայի շնչառութիւնը:

Թիթեռները բոժոժից դուրս են գալիս՝ վորդը բոժոժ էլուսելուց 14—18 օր հետո: Տարբեր ցեղերում հարմայակից թիթեռ ձևափոխվելու ժամանակամիջոցը տարբեր է լինում: Թիթեռ դուրս գալու ժամանակամիջոցը նույնպէս կախված է բոժոժ պահելու տեղի շերմաստիճանից: Ճանաչելով շերմաստիճանում թիթեռներն անհամեմատ ուշ են դուրս գալիս: Յուրաքանչյուր պարտիայի բո-

ժոժներինց թիթեռների դուրս գալը տեսւմ ե 5—8 որս Դա սերտորեն կապված ե վորդերի բոժոժ հյուսելու ժամկետների հետ։ Վերջան ձգձգվում ե հյուսելու ժամանակամիջոցը, այնքան ել յնրկարում ե նրանցինց թիթեռների դուրս գալը։ Թիթեռների դուրս գալու տեսողությամբ նույնպես կարելի յն վորոշել պարտիայի վորակը։

Թիթեռների դուրս գալու նախորդակին բոժոժներից լսվում ե խորը աղմուկ։ Հիշյալ աղմուկից ե առանձին բոժոժների շարժվելուց փորձառու գրինյորը կարող ե վորոշել թիթեռների դուրս գալու ժամանակը։ Շատ տեսակի ցեղերինց թիթեռները դուրս են գալիս առավոտյան մոտավորապես ժամի 5—10-ը։

Թիթեռներ հավաքելու աշխատանքը պետք ե կազմակերպել այնպես, վոր այդ ժամանակամիջոցում բոլոր թիթեռները հավաքված լինեն, այլապես ձու կդնեն հենց պապիլոնաժի դրծիքներում։ Թիթեռների հիշյալ ժամում դուրս գալը չափազանց հեշտացնում ե աշխատանքի կազմակերպումը, վորովհետե նրանց հավաքելու աշխատանքն ավարտելուց հետո՝ բանվորները կարող են անցնել այլ աշխատանքի, այն ե՝ հետևել թիթեռների դուրս գալումանը, ե կատարել նրանց մեկուսացումը։ Անհրաժեշտ ե նշել, վոր չափազանց տաք որերին թիթեռների մի մասը խառնում ե բոժոժներից դուրս գալու կարող, ե յներեմն դուրս ե գալիս նույնիսկ կեսորին, ժամի 2—3-ին։ Այդ թիթեռները պետք ե դուրս գալին հաջորդ առավոտյան։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ ե թիթեռների դուրս գալն ավարտելուց հետո՝ մի քանի անգամ սառւզել, հավաքել նոր դուրս յեկած թիթեռները ե միացնել իրենց պարտիային։

Ինչպես վերը հիշեցինք, բոլոր ցեղերի թիթեռները նշված ժամկետին չեն դուրս գալիս ամբողջ որվա ընթացքում, սակայն մեծ մասամբ դուրս են գալիս առավոտյան։ Հիշյալ ցեղերի թիթեռները պետք ե հավաքել ամբողջ որը. այդ պատճառով աշխատանքի կազմակերպումն ել այլ ձևով ե կատարվում։ Բանվորներին կարիք ե զգույշում բաժանելու մի քանի կտտեզորիաների։ Նրանցինց մի մասն ջաճողը որը պետք ե հավաքել թիթեռները, մյուսները հետևեն ե հսկեն դուրսգալումանը, մի մասն ել կտտորի թիթեռների մեկուսացումը։

Ընդհանրապես առավոտյան արու թիթեռներն եղերինց ավելի շատ են դուրս գալիս։ Այս հանգամանքը նկատվում ե բոլոր ցեղերում։ Սրա պատճառը վոչ միայն հարսնյակների ավելի ուշ

Թիթեռի ձևավորվելն է, այլ և եզ Թիթեռի փորելի ավելի մեծածափալ լինելը։ Եզը դժվարանում է արագությամբ դուրս գալ բոժոժի նեղ անցքից։

Այս, վորպես ընդհանուր կարգ՝ տեղի յն ունենում բոլոր ցեղերում, յուրաքանչյուր պարտիայում, ինչպիսի պայմաններումն էլ խնամված և պահպանված լինեն բոժոժները։

Դրենաժի արտադրության մեջ հիշված յերկու առանձնահատկություններն ունեն կարևոր նշանակություն, և այդ առանձնահատկություններն անհրաժեշտ է հաշվի առնել։

Վորպեսզի ուշ դուրս յեկած եզ Թիթեռներն առանց արվի չննան, առավոտյան ոգտագործված արու Թիթեռներն մի մասը թողնում են կրկին զուգավորման համար։ Արուներն առաջին զուգավորումից հետո կարող են ոգտագործվել մեկ և նույնիսկ յերկու անգամ։ Բայց անհրաժեշտ է, վոր յերկրորդ զուգավորումից առաջ արուն մի վորոշ ժամանակ հանգստանա։

Վերջին որերում դուրս յեկած եզ Թիթեռներն արուներով ապահովելու համար, մասնաշարար դուրս յեկած Թիթեռների արուներից մի մասը թողնում են եզերի համար։ Զուգավորելու համար արուները կարելի յե պահել 2—3 որ։ Դա չի անգրագործում գրենայի բեղմնավորման վրա։

Արու Թիթեռները պետք է պահել կիսախավար և հով շենքում՝ տալով 18—19° Ց. Չերմություն։ Հիշյալ պայմաններում արուները ննում են ավելի հանգիստ։

Վորովհետև առավոտներն արուներն ավելի շատ են դուրս գալիս, քան եզերը, այդ պատճառով զուգավորումից ազատ մնացած արուներն եզը փնտռելիս խանգարում են զուգավորվածներին։ Վատ չի լինի՝ մինչև Թիթեռների հավաքվելը՝ առավոտյան շրջել, և յիթե մեծ քանակությամբ արուներ մի տեղում կուսակված լինեն, նրանց մի մասը հավաքել և ոգտագործել միայն կարելի գեպքում։

Այստեղ անհրաժեշտ է նշել, վոր յերկար ժամանակ եզերն առանց արուների թողնելը չի թույլատրվում, վորովհետև 5—8 ժամ հետո, այսինքն՝ կեսօրին մոտ, նրանք կդնեն չբեղմնավորված ձու։

Պատահում են դեպքեր, յերբ վորոշ պարտիաներում, մանավանդ պապիլոնաժի վերջին որերին, ինչպես արդեն հիշված է, արուների քանակն ավելի քիչ է լինում եզերից։ Ակվան խորհուրդ է ապրիտ նման դեպքերում, այսինքն՝ մինչև կեսօր առանց

արուի մնացած նշերը պահել հով շննքում, վորի ջերմաստիճանը պետք է լինի 12—15° Ց. Ըզ թիթեռները հիշյալ պայմաններում ձու չեն ածում, հետևաբար հաջորդ որը նրանց կրկին կարելի չե տեղափոխել պապիլոնաֆի սրահը՝ դուրսավորման համար:

Թիթեռներ հավաքելը պետք է սկսել ժամի 6-ից մոտ ուշ, այն հաշվով, վոր ժամի 10-ին թիթեռներ հավաքելու գործողությունն ավարտված լինի Ի հարկե, այս վերաբերում է այնպիսի ցեղերին, վորոնց թիթեռներն առավոտյան են դուրս գալիս (Բադգազ): Թիթեռները պետք է հավաքել դուշտթյամբ, վորպեսզի նրանք չմնասվեն: Թիթեռը պետք է բռնել բացառապես թևերից՝ բթմատառով և ցուցամատով: Արդեն գուգավորվածները հավաքելիս պետք է բռնել դույզ թիթեռների թևերից միասին՝ առանց իրարից բաժանելու: Նզի թևերը պետք է բռնել ըստ մատով և ցուցամատով, իսկ արուինը նույն ձևով ճկույթով, սեղմելով ճկույթը բութ մատի հիմքին:

Թիթեռներ հավաքելու ժամանակ առանձնացնում են այն աճյունքում թիթեռները, վորոնք յնթադիտ չեն մեկուսացման: Այդ աղետաբեկը պետք է կատարել վորտեղյալ բանվորների միջոցով: Աննորմալ թիթեռներ են համարվում չափադանց ուռած և ծանր փորկիով, կնճառաած թևերով, փորկիկ ու թևերի վրա մոխրակապարազույն բծերով (պերբինա հիվանդության նշան) և փորկիկ սեղմնանների արանքում աչքի ընկնող սև բծերով թիթեռները:

Գրոթ. Գայարկովը փորկիկ սեղմնանների արանքում յեղած բծերը բացատրում է հետևյալ կերպ: Սեղմնանների արանքից յերևում է ստամոքսը, վորն իր մեջ պարունակում է չմարսած թթնու տերև: Այս դեպքում ստամոքսն ստանում է մուգ գույն և լինում է ավելի մեծացած: Առողջ վորդը բոժոժ հյուսելուց առաջ ստամոքսն ամբողջությամբ պետք է դատարկած լինի: Անհրաժեշտ է նույնպես նշել, վոր յնթե վորդերը կերը լրիվ մարսած չեն լինում և բոժոժ հյուսելուց առաջ, աղիքները լրիվ չեն մաքրել, ապա այդպիսի վորդի թիթեռի մեղը թուխ-կարմրավունի փոխարեն լինում է մուգ-մոխրագույն:

Ինչպես հիվանդ, այնպես էլ աճյունքում թիթեռները տարբերելու համար անհրաժեշտ է ունենալ բավականին փորձառություն: Թիթեռները, առանձնապես արուները, հաճախ լինում են թուխ գույնի, և անփորձ բանվորը կարող է թիթեռի բնական գույնը չփոթել հիվանդության բծերի հետ: Բացի վերոհիշյալից, կնճառաած թևերը նույնպես կարող են չփոթեցնել, վորովհետև

ըստժողովրդի նոր դուրս յեկած թիթեռի թևերը թաց լինելու հետևանքով, սկզբում կենտոտած են լինում, բայց շտրանալիս ուղղում են և ստանում իրենց սովորական ձևը: Յերբեմն պատահում է, վոր թիթեռի ներքին թևերի ծալքը բացվելիս ճաքում է, վորի հետև-
վանքով արյունը դուրս գալով թևերի վրա, գոյացնում է սև բծեր: Կարող է, վոր նման բծերը չպետք է ընդունել վորպես հի-
վանդության նշան:

Թիթեռի դուրավորումը, ինչպես արդեն ասել ենք, կատար-
վում է զուգավորման հաստիկ պարագաներում: Զուգավորման
ժամանակ բանվորները պետք է չլինեն և դիմեն դուգավորված
թիթեռները: Բաժանված թիթեռներն իսկույն պետք է վերցնել
և դնել առանձին մատուցարանների վրա և թողնել, վոր նրանք
կրկին դուգավորվեն: Բաժանված թիթեռներն ազատ թողնել չի
կարելի, վորովհետև նրանք չլինով դուգավորվողների շարքը՝
խանգարում են և պատճառ դառնում նրանց ևս բաժանվելու:
Նզերն ել հենց տեղն ու տեղն սկսում են ձու գնել: Զուգավոր-
ման համար ամենանպաստավոր ջերմաստիճանը համարվում է
23—24° Ց.: Ավելի ցածր ջերմաստիճանի մեջ արու թիթեռները
դանդաղաբար են դառնում, դժվարությամբ են դուգավորվում,
վորի հետևանքով մեծ քանակությամբ չբեղմնավորված գրենա-
յն ստացվում: Վարդագլի բոլոր ձվերը բեղմնավորվեն, միանգա-
մայն բավական է հիշյալ ջերմաստիճանի մեջ թողնել կես ժամ:
Բայց վորովհետև ասանյակ հազար թիթեռների դուգավորման
ժամանակ հնարավոր չի լինում վորոշել բոլոր թիթեռների դու-
գավորման ժամկետը, այդ պատճառով գործարաններում ընդուն-
ված է թիթեռները դուգավորված դուրթյան մեջ թողնել 2 ժամ:

Յեթև թիթեռները թողնենք իրենց ցանկությամբ, նրանք
կարող են 5—6 ժամ, յերբեմն նույնիսկ ավելի յերկար մնալ
դուգավորված դուրթյան մեջ: Թիթեռների բաժանման գործ-
ողությունը պետք է կատարել ըստ հերթականության, այսինքն՝
սկսել առաջին հերթին դուգավորված պարտիաներից: Բաժանու-
մը կատարվում է հետևյալ ձևով. ձախ ձևքի ցուցամատով թե-
թև սեղում են եղ թիթեռի փորիկը, այնուհետև ավ ձևքով բըռ-
նելով արու թիթեռի թևերից՝ թեթև ձգում են: Բաժանոթ՝ արու
թիթեռները պետք է գցել ջրով լի ումանի մեջ, այնպես նրանք
չափազանց փողտում են ողը, իսկ կզերն անհրաժեշտ է մեկու-
սացնել քսակների (ցեյուլների) մեջ:

Անփորձ բանվորները թիթեռները բաժանելու ժամանակ

կարող են դառնալ ֆուսաներ հասցնել, բացի այդ, նրանք հաճախ չեն կարողանում զանազանել եզ և արու թիթեռները։ Այդ պատճառով հիշյալ արխատանքը պետք է հանձնարարել բացառապես վերակյալ բանվորներին։ Անշատման արողեսուս հմուտ բանվորները թիթեռների բաժանման գործողությունը կատարում են չափազանց արագ և մեծ ճարակությամբ՝ ընդհուպ չֆուսանելով թիթեռներին։ 5 ժամվա ընթացքում կարելի չե բաժանել 7000 զույգ թիթեռ։

Անհրաժեշտ է հիշել, վոր պետք է մեկուսացնել միայն եզ թիթեռները, իսկ արուները, ինչպես արդեն ասված է, զուգավորումից հետո պետք է վոչնչացնել։ Չուգավորումից հետո արուներն արդեն պեղծակա չեն։ Վորովհետև զուգավորման ժամանակ արվից չեն անցնում պերրինա հիվանդության մարմնիկները, դրա համար էլ միկրոսկոպային ջննության յենթարկվում են միայն եզ թիթեռները։

Բուսի մեջ դրած թիթեռը համարյա իսկույն ձու չե դնում։ Ձու դնելուց առաջ թիթեռներն արտաթորում են հեզուկ, վորը տեղի չե ունենում զուգավորված թիթեռներին անշատելուց անմիջապես հետո։ Այդ հեզուկը չորանալով՝ ստանում է կարմրավուն գույն, դժվար է ժաքրվում և չրջադառը բավականին կեղտոտում է։

Ձու դնելու արդյեսը տևում է 2—8 րո։ Նայած ցեղին՝ թիթեռը կարող է առաջ 400—950 ձու, Տարրեր ցեղի տարրեր՝ և նույնիսկ նույն ցեղի տարրեր թիթեռներ, տարրեր քանակով են ձու դնում։

Թե վորքան է տատանվում տարրեր թիթեռների ածած ձվերի քանակը, կարելի չե յեղրակացնել նախկին Կովկասյան Շերամապահական կայանի կատարած փորձերից (Шавров «Справочная книга русского шелководы»)։

Ցեղերը	Ձրթիանգ	Իսպաղան գեղին	Աւելեական	Մեզինյան
Մեկ անվածքում յեզած ձվերի միջին քանակը	480	500	500	500
Մեկ անվածքում յեզած ձվերի մեծագույն քան.	720	700	800	697

Ազդուստեղից պարզ յերևում է, Վոբ նույն ցեղի թիթեակ մեկ անվանաբար միջին և մաքսիմալ ձվերի քանակի տարբերությունը հասնում է մինչև 300-ի:

Տարբեր տարիներում և պարտիաներում թիթեակ անան ձվերի քանակը նույնպես տատանվում է: Համաձայնաբար այդ կախված է խնամքի պայմաններից:

Մեկ կիլոգրամ բոժոժից ստացվող գրենայի յելույթը վորոշելու համար հաճախ կարելի է զգացվում իմանալ մեկ թիթեակ միջին հաշվով անան ձվերի քանակը:

Դրա համար 10 տարբեր պարտիաներից պետք է վերցնել 50-ական քանակ՝ 4 որվա թիթեակներով և կռել անան ձվերի քանակը, — յուրաքանչյուր պարտիան առանձին-առանձին 10 պարտիաների գրենայի քաղը դուրսարելով և բաժանելով 10-ի, պարզվում է 50 թիթեակ սված գրենայի միջին քաղը: Յեթե Բազդադի ցեղում այդպիսին կազմում է 22 գրամ, նշանակում է՝ կարելի չէ սպասել, Վոբ մեկ կիլոգրամ բոժոժից կստացվի 2,9—3,0 տոկոս գրենա: Պարզ է, Վոբ գրենան կռելուց առաջ պետք է քամալարման յանժարելը:

Թիթեակների մեկուսացման աշխատանքների ավարտումով վերջանում են և՛ պապիլոնաթի աշխատանքները:

9. ԱՄՎԱԾՔԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ

Նախքան միկրոսկոպային քննության անմիջական աշխատանքներին անցնելը, անհրաժեշտ է յանժարել անստակաժորման, Վոբը տարվում է հատուկ ցեխում, վորպես առանձին աքտադրական պրոցես: Անվանաբար անստակաժորման նպատակն է՝

ա) ստուգել և պարզել, թե վորքան նորմալ են ընթացել պապիլոնաթի աշխատանքները, հաշվի առնել բոլոր թերությունները և չկրկնել այդպիսիները հաջորդ տարում:

բ) կատարել անվանաբար ընտրություն, արտադրությունից հանել բոլոր այն դեֆեկտավոր անվանաբար, Վոբ յանժարել և քննության և վերամշակման:

գ) սահմանել առանձին պարտիաների վորակական ցուցանիշը՝ սոպրակների քանակն ըստ բոժոժի քաղի, խոտանի տեղի և այլն:

Անվանաբար տեսակավորման տեխնիկան առանձին բարդություններ չունի, բայց բանձորները պետք է տիրապետեն տե-

ստեղծութեան անխնդիր, ունենալով զազապար առողջ և խոտան անվամբի մասին, ցուցարարին աւագիր և խնայող վերաբերմունք զնպի անվամբը, վերապիտի գրեհայի կորուստ անդիշունենալ:

Տեսակաւորումը պետք և կատարել հասուէլ սեղաններէ վրահամ կոչկաների մեջ, վորոնց շուրջը բանվորները նստելով՝ տեսակաւորում են անվամբներն ըստ պարտիաների: Անվամբն ունենում և յերկու տեսակ խոտան՝ արտադրական և ֆիզիոլոգիական: Առաջին խմբի մեջ մտնում են այն խոտանները, վորոնք գոյացել են արտադրութեան մեջ՝ անկախակերպ աշխատանքի և տնտեսաւ պայմանների հետեան ծով: Այդ խմբին են պատկանում չբեղմնավորված անվամբները, դատարկ ցանկներ, արունքով ցանկներ, առանց թիթեռի, բայց գրեհայով ցանկներ և ընդհակառակը, փաստաւորների կողմից փաստած անվամբներ: Ֆիզիոլոգիական խմբի մեջ մտնում են՝ արտաքինից դեֆեկտավոր թիթեռների անվամբները քիչ քանակութեամբ գրեհա, արթնացած վորդերով կիսարեղմնավորվածները:

Յուրաքանչյուր խոտանի տեսակը պետք և հաշվի առնել առանձին և գրանցել տեսակաւորման ցեխի մասայնում ըստ պարտիաների, միաժամանակ ցույց տալով առողջ անվամբի քանակը: Բոլոր տեսակի խոտան անվամբները պետք և վոչնչացնել:

10. ՄԻԿՐՈՍԿՈՊԱԿԱՆ ԳՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Միկրոսկոպային քննութեանն սկսվում և այն ժամանակ, յորը ցելլուլներէ մեջ թիթեռներն ամբողջովին չորացած են լինում, այսինքն՝ պայտիւնածից 20—30 սր հետո:

Վորոշ գրեհ-գործարաններում պայտիւնածից հետո մեխանիկորեն հայտարարում են մեկ ամսվա ընդմիջում (արձակուրդ), այսինչ ամսվա դեպքում առանձին պարտիաների նկատմամբ սահմանված 20—30 սր ընդմիջումը տնում և ժող 2 ամիս, վորոն անգործառնում և գրեհայի վերամշակման պրոցեսներէ լվրա, ձգձգում և սահմանված ժամկետը և այդպիսով նախ՝ միկրոսկոպային քննութեան պրոցեսում տաշանում և վորոշ շտապեցուցիչ արտադրութեան և յերկրորդ՝ հնարավոր չի լինում մինչև գրեհայի ձմեռուկ ավարտել բոլոր արտադրական պրոցեսները:

Չպետք և մոռանալ, վոր գրեհան ձմեռան տմիսներին պետք և պահել հանգիստ, նրա հետ չկատարել վոչ մի գործողութեան:

Այդ բոլորը դալիս են մեղասերու, վոր պապիւնաժից հետո չպետք է մեխանիկորեն սահմանել մեկ ամսով ընդմիջում:

Թիթեռները չորացման, սաղմի ձևավորման համար պահանջվող ժամանակամիջոցը մենք ապահոված կլինենք, յեթե ունենանք 10—12 որ ընդմիջում, վորից հետո կարելի չե սկսել միկրոսկոպային քննութիւն այն պարախաներից, վորոնք տնցել են պապիւնաժ առաջին հերթին:

Միկրոսկոպային քննութիւն պրոցեսը, համեմատած գրենաժի բալոր պրոցեսների հետ, ամէլի յերկարատես:

Նայած բոժոժի միկրոման ժամկետներին և պապիւնաժի աշխատանքների ավարտմանը՝ միկրոսկոպային քննութիւնն սկսվում է հուլիսի վերջերից կամ ոգոստոսի սկզբներից և տևում է մինչև դեկտեմբերի առաջին կեսը:


Այսատանքներն այնպես պետք է պլանավորել, վոր մինչև դեկտայի ձմեռումը գրենաժի բոլոր պրոցեսներն ավարտված լինեն:

Միկրոսկոպային քննութիւն նպատակն է՝ կատարել ամփածօք ընտրութիւն և հիվանդ ամփածօք զտել առողջներից:

Քննութիւն պրոցեսում պետք է պաշտպանել ցեղաւար գրենաժի սկզբը, այն է՝ քննել յուրաքանչյուր քսակի մէջ գտնված Թիթեռը (նայած պապիւնաժում մեկուսացման աստիճանին):

Այդ մեթոդը համարվում է ամենաճիշտը և նպատակահարմարը, վոր սահմանված եր դեռ 1865—1870 թվերին Պաստյորի կողմից, և դրա ընտրելով էր, վոր շերտապահութիւնը փրկվեց ու դուրս յեկավ այն ճշմարտից, վոր տիրում էր Ֆրանսիայում և այլ յերկրներում XVIII—XIX դարերում:

Բացի այդ հիմնական և ճիշտ քննութիւն ձևից մինչև 1933



Ճ. 36. Թիթեռների մասնաշաղկապ միկրոսկոպային քննութիւնը

թիվը գոյութիւն ունեցին մի քանի ձևեր, վորոնց դեպքում միկրոսկոպային ցննութիւն պրոցեսում թույլատրում ենին պրեպարատի խտացում:

Պետք է շեշտել, վոր բոլոր խտացման ձևերն ունեն իրենց բացասական կողմերը, վորովհետև խտացնելով պրեպարատը՝ թույլ վարակվածներն աննկատելի կերպով կարող են վրէպել միկրոսկոպիսաների տեսողութիւնից և հաջորդ տարվա կերպերում ներքին պրոցեսում կվարակեն առողջ վորդերը, հետևապէս պետք է խուսափել ամեն տեսակի խտացման ձևերից:

Միկրոսկոպային ցննութիւն պրոցեսները 6 են.

ա) անվաճեցների տեսակավորումը (նախապատրաստական պրոցես).

բ) պրեպարատի պատրաստումը.

գ) միկրոսկոպային ցննութիւն.

դ) միկրոսկոպային ցննութիւն կոնարոլը.

Առաջին պրոցեսի և նրա նպատակի մասին համառոտ կերպով հիշեցինք վերևում:

Պրեպարատը պետք է պատրաստել հետևյալ ձևով. — Բակներն անվաճի տեսակավորման ցեխից, հատուկ արկղներէ մեջ դասաստվորված ըստ պարտիոնների՝ տեղադրութիւն են պրեպարատի պատրաստման ցեխը: Բանջորները առպրակներից դուռը թույլ մը հանում են թիթեղը, վորպէսզի գրենան չլիսովի. դուռն անշատում են մարմնից և թողնում առպրակի մեջ, իսկ մարմինը դրում են հալանդի մեջ: Այնուհետև քսակը հալանդի հետ միասին հաննվում և յերկրորդ խմբի բանջորներին, վորոնք հալանդի մեջ 2—3 կաթիլ մաքուր ջուր կաթնցնելով՝ ակում են թիթեղի մարմինը հալանդի կոթով տրորել ալմաս, վոր ստացվի հեղուկ: Այդ աշխատանքով պրեպարատը համարվում և պատրաստ^{*)}:

Թիթեղը տրորելու համար կան 3 սիստեմի հատուկ մեքենաներ՝ Պրադելլա, Գիլլյարդի և յապոնական:

Առաջին յերկու սիստեմի մեքենաներն (իտալական) այժմ գործադրվում են մեր գրեն-գործարաններում, իսկ յապոնական մեքենան իր բազմութիւն և ցածր արտադրողականութիւն պատճառով մեր գործարաններում չի գործադրվում, ուստի գրա վրա կանգ առնել ավելորդ ենք համարում:

Տրորող Պրադելլա և Գիլլյարդի մեքենաներն իրենց կառուց-

*) Նկարագրած ձեռ վերաբերում է ձեռքի աշխատանքին:

վաճառող համարյա վաճառող չեն տարբերվում միմյանցից, բացառությամբ այն բանի, մեր Գիլյարդի մատուցաբանն ունի 10 հավանք, մերոնք ամբողջապես կլրաձև են, իսկ Գրադելլան ունի 18 հավանք, մերոնց վերին մասը քառակուսաձև է, իսկ միջին մասը՝ կլոր:

Մատուցաբանները ցանկների համար հավանքների տակ ունեն ըջիշներ: Տրորումը կատարվում է ամբողջ մատուցաբանով, 10—18 հավանքով միաժամանակ. մեքենան այնպես է ձեռքով կամ էլեկտրական ուժով:

Կատուցվածքի և արտադրողականության տեսակետից Գրադելլան շերտաձևացում է Գիլյարդի մեքենայից:

Այդ մեքենաները նպատակահարմար է ոգտագործել միայն համեմատաբար մաքուր (0°/0 հիվանդություն ունեցող) պարտիաների համար:

Ձեռքով կամ մեքենայով տրորելուց հետո, պատրաստի պրեսպորտաներն այդ ցեխից անցնում են միկրոսկոպային քննության ցեխը, մորտեղ միկրոսկոպիստները քննության են յնթարկում:

Միկրոսկոպիստը 4—5 հավանքից առանձին-առանձին կաթիլ է վերցնում և նույնությամբ ցույց է առաքելապես աստանձին ծածկող ապակով և դրսում միկրոսկոպով: Հիվանդություն նկատվելու դեպքում այդ պրեսպորտան իրեն պատկանող ասպրակի և դրենայի հետ միասին աստանձնացվում է, իսկ ասպրակները մատուցաբանով հանձնվում են այսպես կոչված ասպրին կոնտրոլին, մերը կատարում է սկզբնական ստուգում, տեղում դնում և միկրոսկոպիստի սխալը, տալիս է ցուցումներ: Այնուհետև ասպրին ասպրակները հավաքում են արկղների մեջ, իսկ մատուցաբանը վերադարձնում պրեսպորտի ցեխը, մորտեղ վերջինս յնթարկվում է լվացման և դարձյալ մտնում է շրջանառության մեջ: Լվացումը կատարվում է 1—2 բանվորի միջոցով, հատուկ վաննայի մեջ հոսող ջրում: Լվանալը չափազանց հեշտանում է, յեթե այդ պրոցեսը ևս յնթարկված է մեքենայացման:

Միկրոսկոպային քննության պրոցեսում անհրաժեշտ է աստանձնացնել 1—3 ասպիկ լվացող (նայած միկրոսկոպիստների թվին), մերոնք հավաքում են միկրոսկոպիստներից գործածված ասպիկները, լվանում են մաքուր ջրի մեջ, չորացնում և ապա հանձնում ոգտագործման:

Վերջածան եւ հստակ լինեն միկրոսկոպիստները և առանձին կոնտրոլները, այնուամենայնիվ նրանք կարող են բաց թողնել հիվանդ պրեպարատներ, մանավանդ վոր 6—7 ժամ անընդհատ զննելով՝ նրանց անսպասելիորեն հոգնում և Բացի այդ՝ հիվանդ պրեպարատները կարող են անցնել նույնպես բանվորների կողմից թույլ աված սխալներով, այն է՝ տալրակները մեկը մյուսին խառնելը, թիթեռի մարմինը կորցնելը, հալմանգների և ապակիների ամամասքութունը և այլն։ Հետևապես կարիք և զգացվում զերշնակաւ կոնտրոլի։ Սյո այսպես կոչված՝ գլխի կոնտրոլն է, վոր տարվում է առանձին ցխում։

Դննությունից հետո միկրոսկոպային ցխին առողջ տալրակները համաձայն է կոնտրոլի ցխի հալմատարին։ Վերջինս ըստ պարտիայի և ըստ միկրոսկոպիստի աշխատանքի՝ հերթականութամբ համաձայն է զննության։

Կոնտրոլն ունենում է 3 խումբ ըստ վոր։ Առաջին խումբը զրննան առպրակներից դատարկում և թիթեռյա խոր ավանների մեջ և գլուխների հետ մեկտեղ համաձայն է յերկրորդ ըրիպակին։ Վերջինս գլուխները վերցնում է ավանից, զցում և հալմանգների մեջ և տրորում, մինչև վոր պրեպարատը պատրաստ է լինում։ Վերջին խումբը պատրաստ պրեպարատներն իրենց պատկանող ավաններով համաձայն է կոնտրոլին, վորը և կատարում է զննությունը։

Աշխատանքի տեխնիկան կոնտրոլում նույնն է, ինչ վոր միկրոսկոպային զննության մեջ, բացառութամբ մի քանի պրոցեսներ, այն է՝

ա) կոնտրոլում զննվում են գլուխները խառցման ձևով, այսինքն՝ մեկ պրեպարատի մեջ թույլատրվում է զննելու 5—10 թիթեռի գլուխ, և դա պարզ է, թե ինչու։ Վորովհետև յեթե կոնտրոլում եւ խառցման ձև չմացվի, այդ կնշանակի՝ յերկրորդ անգամ միլիոնավոր թիթեռներ յնթարկել զննության, վորը թե տեխնիկապես և թե անտեսապես անհնարին և անպատահալումար է, մանավանդ, վոր մարմինը յնթարկված է զննության թե միկրոսկոպիստի և թե կոնտրոլի կողմից։

բ) գլխի կոնտրոլը զրն-գործարանում հաշվվում է վերջին ընտրության ձևը, հետևապես այստեղ պետք է պահպանել ավելի խիստ կարգապահություն, մաքրություն և զգուշություն։ Այդ

համապատասխան լինելը և զենում գործադրանքների վարչութիւն և տեխնիկականութիւն տալով՝ ապահովելու կոնտրոլի ցեխը վերակայալ, հաստ կոնտրոլորներով և բանվորներով:

Դիւիս կոնտրոլից հետո առողջ գլխնան պաշտօնաներով օտմ-հարման և յենթարկվում, կշռվում և ապա հանձնվում և պահես-տը՝ մինչև լվանալը:

Աշխատանքի կազմակերպման և արտադրութիւն պլանա-վորման համար անհրաժեշտ և գիտնալ մեքենաների, կոնտրո-լորների, միկրոսկոպիստների և առանձին խմբի բանվորների արտադրողականութիւն նորմաները, ուստի կարևոր ենք համա-րում՝ այստեղ զուլց տալ գոյութիւն ունեցող միտվորների ար-տադրողականութիւնը Աշխատանքի հաշվառման ձևը առանձին բարդութիւններ չունի. յուրաքանչյուր պարտիան բոլոր պրո-ցեսներում կրում և իր համարը:

Միկրոսկոպիստներին, կոնտրոլորներին յուրաքանչյուր պարտիայի համար գուրս են գրվում հատուկ քաղտեր, վորոնցով հնարավոր և սահմանել թի՝ վերջինների և թի սպասարկող պե-տնայի աշխատանքի արտադրողականութիւնը: Հարկավոր և ար-տադրութիւն ժեշ մտցնել պայմանական, այսպէս կոչված ար-տադրական ժարկաներ՝ տարբեր գույնով (յուրաքանչյուր պրո-ցեսի համար) կամ համարներով:

Հաշվառումը կատարվում և հետևյալ ձևով.

ա) անվտնջների տեսակավորումը՝ ցեխում հաշվելով տու-բակները քանակը.

բ) պրեսուրատի պարտաստման ցեխի բանվորների աշխա-տանքը հաշվի յե առնվում՝ վերջիններիս համար սահմանված պայմանական համարներով, վորոնք անցնում են մատուցարան-ների հետ միկրոսկոպիստին քննութիւն ցեխը և կուտակվում են միկրոսկոպիստի մոտ.

գ) միկրոսկոպիստների աշխատանքը հաշվի յե առնվում իրենց մոտ կուտակված համարներով (պրեսուրատի ցեխից) և վերջնականապէս կոնտրոլի ցեխի տվյալներով՝ ըստ պարտիա-նների.

դ) ասպէի լվացողները արտադրողականութիւնը հաշվա-սար և այն միկրոսկոպիստների արտադրողականութիւնը, վորոնց նշանք կցված են և սպասարկում են.

ե) կոնտրոլորի արտադրողականութիւնը հաշվի յե առնը-վում ցեխի հաշվետարի կողմից՝ համբելով տուբակները հատուկ

արկղներով՝ մինչ ջննության հանձնելը, իսկ կոնսորիին սպասարկող պերսոնալի աշխատանքը սահմանվում է նույն ձևով, ինչպես միկրոսկոպային ջննության ընթացքում (պայմանական համարներով):

Գոյություն ունեն հետևյալ արտադրողականության միավորները՝

1. անվաճք տեսակավորող բանվորը	8 ժամում 3000—4000	տոպրակ
2. Թիթեռի մարմինը հանելը և հավանգ գցելը 1 Թիթեռից	» » 1000— 1500	պրեսպրատ
3. Տրորող (ձեռքով)	» » 500— 600	»
4. » (մեքենայով)	» » 18000—20000	»
5. հավանդներ լվացող (ձեռք.)	» » 2000— 2400	»
6. » » (մեքենայացված ձևով)	» » 25000—30000	»
7. միկրոսկոպիստ 7 ժամյա	բանվոր. որ 1000— 1200	»
8. կոնսորիոր	» » » 600— 800	»
9. տոպրակներից զրեմա դատարկողներ 8 ժամում	2500—3000	տոպրակ
10. արորդներ՝ կոնսորի. » »	350— 400	պրեսպրատ
11. հավանգ լվացողներ » »	700— 800	հաստ

Նկատելի ունենալով գոյություն ունեցող արտադրողականության միավորները, Հադիազանց հեշտ է սահմանել, թե ինչքան ըստույգ է տեխպերսոնալ և տարանջվում, վեր միկրոսկոպային ջննությունն ավարտվի սահմանված ժամկետում:

12. ԳՐԵՆԱՅԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ

Գրենայի արտադրության չորրորդ պրոցեսը նրա վերամշակումն է: Միկրոսկոպային ջննությունից հետո, զրեմ-գործարանի արտադրանքը դեռ չի կարելի համարել վերականգնված գրենա:

Միկրոսկոպային ջննությունից հետո զրեման պետք է տոպրակներից դատարկել (այն դեպքում, յերբ դատարկումը չի կատարված կոնսորի հետ զուգընթաց), ջամհարել, լվանալ, չորացնել և այլն:

Գրենաան տոպրակներէից պէտք և դատարկել կոնսուլի ըն-
թացքում կամ ավելաւ պարտիայի քննութիւններց անմիջապէս հե-
տոյ Այդ աշխատանքը թեպէտ չափազանց հեշտ է, բայց պահան-
ջում և դժուարութիւն և խնայողաբար վերաբերմունք. հակառակ
վեպքում, կարող և տեղի ունենալ գրենայի կորուստ, տարբեր
պարտիաների խառնում, տոպրակների մեջ վորոշ չափով կարող
և մնալ գրենա և այլն:

Կոնսուլից հետո գրենան պարտիաներով պէտք և հանձնել
քամհարման, վորտեղ գրենան մաքրվում և վորուց, կեդտից,
թիթեռի թեփուկներէից և մնացորդներէից, նույնպէս և վորոշ չա-
փով չրեղմնավորված և չորացած գրենայից: Պամհարումը կա-
տարվում և ձեռքով՝ մաղի և սկուտեղների (պողնոցների) ոգնու-
թյամբ, կամ քամհարման հատուկ մեքենայի միջոցով, վորը կոչ-
վում և քամհար մեքենա՝ Գրադելլյան սխտեմիս Այդ մեքենայի
միջոցով քամհարումը կատարվում և հետաւթյամբ և առանձին
դժվարութիւն կամ բարդութիւն չի պահանջում:

Պամհարումից հետո գրենան 300-ական գրամ լցնում են հա-
տուկ մաււայից պատրաստած տոպրակների մեջ, կամ հատուկ
շրջանակներում դարձված գարակների վրա, ապա տեղափոխում
են գրենայի պահեստը՝ մինչև լվանալը:

Գրենայի լվացումն սկսում են այն ժամանակ, յերբ պա-
հեստի ջերմութիւնը 12—14° Ց. և, այսինքն՝ նոյնմըր ամսով
կիսից: Գրենան պէտք և լվանալ այնպիսի ջրում, վորի ջերմու-
թիւնը պէտք և հաճապ լինի պահեստի ջերմատեմանին, կամ
մի քանի տատնանով ցածր, սակայն վաշ պակաս 7—8° Ց-ից:
Գրենան պէտք և լվանալ գոնի կամ թոսերի մեջ: Լվանալու
ժամանակ գրենան մաքրվում և չրեղմնավորված և չորացած ձվի-
րից, վորուց, կեդտից և թիթեռի չորացած մնացորդից, վորը
կպած և լինում գրենայից, Լվացած գրենան մնում և ջրի տակը
(գրենայի տեսակաբար կշիռը հաճապ և 1,08, այսինքն՝ ծանր
և ջրից, իսկ մնացած մասերը մնում են ջրի յերեսը: Այդպիսով
գրենան մաքրվում և:

Ենթե գրենան պահված և բնական կամ արհեստականորեն
առաջացած խոնավ պայմաններում, այդ դեպքում չրեղմնա-
վորված ձվերն ընդունելով իրենց մեջ խոնավութիւն, ջրի յերե-
սը չեն բարձրանում, և գրենայի մեջ մնում են չրեղմնավորված
ձվեր: Մի քանի հնդահաններ, վորպիսպի չրեղմնավորված ձվերը
գրենայից անջատեն, ջրի մեջ խառնում են քիչ քանակությամբ

ադ, վորը վորոշ չափով կտատացնում է շուրը և այդ պատճառով չրհզմնավորված և չորացած ձվերը հեղուկացմբ դուրս են գալիս շրի յերեսը և շրի հետ միասին թափվում են:

Հայմեապատերեստի Վաղբավտրի գործարանի (Մեղրու շրջան) փարձը (յերկար տարիներ զբնան լվացել և աղաջրում) ցույց տվից, վոր աղաջրով հունդ լվանալը բացասական ազդեցություն չունի զբնայի վորակի վրա:

Լվացված զբնան բարակ շերտով փռում են դարակներին վրա, 12—14⁰ ջերմության պայմաններում չորացնելու նպատակով: Զորացումը կատարվում է չափազանց կարճ ժամանակամիջոցում, յերկրորդ սըը հնարավոր է հաժաճել փռած սերմերն ու տեղափոխել նորից զբնայի պահեստ:

Վերևում նկարագրած ձևով զբնայի վերամշակումը վերաբերում է վոչ կաշոյ ձու զնոց ցեղերին: Կաշոց ցեղերի (ասկոլին, չինական որոն, սֆերիկոն և այլն) նկատմամբ վերամշակումը տարվում է այլ կերպ: Վերջինների վերամշակումը կատարվում է հետևյալ ձևով: Քամհորման աշխատանքներն այս դեպքում չեն հասարվում: Լվանալուց առաջ անհրաժեշտ է ցելլուլներից առանձնացնել և մաքրել զբնան, վորը կպած է նրանց: Այդ աշխատանքը կատարվում է հատակ յեղյալ բոլոր դարակներին միջոցով: Ժնչ մաքրելը ցելլուլները պետք է թրջել ջրում, ապա թողնել թաց զբության մեջ՝ 5—10 րոպե, վորպեսզի կաշուն նյութը, վորով կպած է զբնան ցելլուլներին, լիչ փափկի, վորից հետո հնարավոր է հեշտությամբ մաքրել զբնան ցելլուլներից: Մաքրելուց հետո զբնան պետք է լվանալ այնպես, ինչպես չկաշոց ցեղերը:

13. ԳՐԵՆԱՅԻ ՆՐԱՐՈՒՄԸ (ՈՒՊԱԿՈՎԱՍ)

Համապատասխան գլխում (միկրոսկոպային քննություն) չեշտված էր, վոր զբնայի վերամշակման բոլոր պրոցեսները պետք է ավարտված լինեն մինչև ձմեռումը:

Վերամշակման վերջին պրոցեսը զբնայի նրարումն (ուպակովհան) և՛ կշռումը, ապրակներ լցնելը, ապրակները բերան կարելը և կնքելը, աուփերի մեջ դառավորելը և վերջիններիս բանգերով կաշնելը: Այդ պրոցեսներն առանձին բարդություններ չունեն, տեխնիկան հասարակ է, ուստի կարելի չենք զգուշացնելու կանգ առնել նրանց վրա:

Ծրարութեան սկսվում է գրեհայի լվանալուց մի քանի ու հետո այն հաշվով, վոր ավարտված լինի մինչև դեկտեմբերի մեկը և վոչ ուշ, քան դեկտեմբերի 15-ը:

Գրեհայի քաշի միավորը համարվում է 25 գրամանոց առօրը, նայած թե վոր շրջաններում կամ հանրապետութայններում և բաղնիքում, աղյուս գործարանի արտադրանքը և ինչ պահանջ և գրված գործարանին: Տուփերը կարող են լինել նաև 5 — 10 — 20 գրամանոց: Տուփերը պիտի պատրաստել $14 \times 11 \times 2 = 308$ խոր. սմ մեծությամբ, վորոնք յերկու յերեռից պետք է ունենան ծակափեր՝ աղաղիկութայն համար: Նույն նպատակի համար առօրիկի ներքևի չորս տնկյուններում ամրացնում են ստվարաթղթից վռտակներ: Տուփերի յերեռը ծակվում է հատուկ պատրաստված հաղիկափերով, վորի վրա նշված են տեղեկանքներ՝ համարապետութայն, գործարանի, հնդի ցեղի, վորակի մասին, զբոսապահութայն և գրեհայի արտադրութայն մի քանի նկարներով:

Տուփերը լցնելուց հետո պետկոնարայի կողմից սահմանված բանդերովը գոտիաձև կազմվում է տուփի հատութայնը ցույց տվող մակերեսի վրա դրսի կողմից: Այդ նշան է. վոր աղյուս պարտիայի գրեհան կամ տուփը յենթարկված է պետական կոնտրոլի, և գրեհան կարելի չէ՝ վաճառել սահմանված նարյադ-պատվերով և գներով: Ծրարութից հետո գրեհան տուփերով անդամալուծվում է ձմեռանոց, ուր և պահվում է համապատասխան պայմաններում՝ մինչև արթնացումը և բաշխումը:

14. ԳՐԵՆԱՅԻ ՊԵՏԻԿԱՆ ԿՈՆՏՐՈՒԼ

Պետական կոնտրոլը Միութայն բոլոր հանրապետութայններում կատարվում է հանրապետական հողօդկոմիտեներին կից կազմակերպված գրեհափ տեսչութայն կողմից, համաձայն միութենական հրահանգի:

Գրեհայի վերաձուլումից և ծրարումից հետո պետտեսչութայն կողմից յուրաքանչյուր պարտիայից վերցնում են նմուշներ, յենթարկում են ինկուբացիայի և քննելով արթնացած վորդերը՝ վերջնականապես վորոշում են՝ աղյուս պարտիայի վորակը՝ հիմանդութայն (պերրինա) տեսակետից, վորից հետո տուղի պարտիաները թույլատրում [են] բաշխել, իսկ վարակված գրեհան յենթարկվում է վոչնչացման:

Բացի գրենա պատրաստելուց և արտադրելուց՝ անհրաժեշտ և բարելավել շերամի ցեղերի կազմը, բարձրացնել վերջիններիս թե՛ տնտեսական և թե՛ արտադրական հատկութիւնները: Այդ նպատակին հասնելու համար շերամի վորդը պետք և սելեկցիայի յենթարկել:

Սելեկցիայով պետք և զբաղվեն և զբաղվում են գրեն-գործարանների ցեղացու գրենա պատրաստող ցեղերը: Վերջիններս պետք և ապահոված լինեն համապատասխան կանադորումով, գուլջով, արտադրական շենքերով, շերամատնով, կերի բազայով և պատրաստված կադրերով՝ սելեկցիոներներով:

Այդ պայմանները պետք և համապատասխան լինեն ցեղի արտադրական պլանին, նայած թե՛ վորքան անպրոգուկցիոն և ցեղացու սերմ և պատրաստում ավել ցեղը:

Անդրկովկասյան Շերամապահական Խնտիտուտի կողմից մշակված և վերադաս մարմինների կողմից հաստատված հրահանգի համաձայն՝ գրենայի արտադրութան 20.000 տուփի պլան ունեցող գործարանի ցեղացու գրենայի պատրաստման ցեղը պետք և կազմակերպել սելեկցիոն աշխատանքներ՝ կերակրելով յուրաքանչյուր տարի 100 հաս սելեկցիայի յենթարկված անվածք, վորոնց կերակրումներից նա կստանա համապատասխան քանակութամբ անպրոգուկցիոն գրենա, իսկ վերջինս կերակրելով, հաջորդ տարում կապահովի գործարանի արտադրական պլանը հում նյութով՝ բոժոժով:

Տարեցտարի ընտրութան միջոցով բարելավելով անպրոգուկցիոն գրենան՝ հնարավոր և բարելավել ցեղացու գրենայի վորակը, իսկ վերջինիս շորհիվ բարելավվում և նաև արտադրական գրենայի վորակը:

Վորպեսզի ցեղացու գրենայի ցեղն ստանա անդրնական 100 անվածքն ուռալին տարում, պետք և վերջնել 400 անվածք և վերջինից խիստ ընտրութիւն կատարել՝ կերակրման համար առանձնացնելով 100 անվածք:

Անվածքի ընտրութիւնը պետք և կատարել հետևյալ ցուցանիշներով՝ ձվերի կենսունակութամբ (վորդվում և արտաքինից), նրանց կենսունակութիւնը արթնացումից հետո և վորդերի կենսունակութիւնը բերքահավաքից հետո:

Խնկուբացիայից տոալ բոլոր 400 անվածքի ձվերը յենթարկ-

վում են հաշվառման, սահմանվում և արտաքին տեսքով կենսա-
տունակ ձվերի քանակը, վորը արտահայտվում և հետևյալ տո-
կոսային հարաբերությամբ.

$$\left(\frac{x \times 100}{y} \right) \left\{ \frac{x - \text{առողջ ձվերի թիվը}}{y - \text{ընդհանուր ձվերի թիվը}} \right\}$$

Ընդհանուր քանակից (400 անվանքից)՝ այդ ցուցանիշների
հիման վրա, շարքից հանվում և 100 այնպիսի անվանք, վորոնք
ավել են միանգամայն առողջ ձու։ Այս դուրս են հանվում ևս
100 անվանք, վորոնց առողջ ձվերի քանակը յեղել և ամենաքիչ
քանակություն։ Մնացած 200 անվանքը յինթարկվում և ինկու-
բացիայի և արթնացումից հետո վորոշվում և չարթնացած ձվերի
առկուրդ՝ հետևյալ ֆորմուլայով.

$$\frac{N \times 100}{M} \left\{ \frac{N - \text{դուրս չեկած ձվերի թիվը անվանքում}}{M - \text{ինկուբացիայում դրված ձվերի քանակը}} \right\}$$

Այդ հաշվառումից հետո շարքից դուրս և հանվում 100 ան-
վանք նրանցից, վորոնց մեջ չարթնացած ձվերի քանակը յեղել
և ավելի բարձր։

Այսպիսով 400 անվանքից ընտրում, առանձնացնում են 100
անվանք ու կերակրում ըստ առանձին անվանքների՝ հատուկ
դարակների վրա (յուրաքանչյուր անվանքին անհրաժեշտ և հաա-
կացնել առանձին եռաժերկա)։

Կերակրումը կատարվում և մեկ շնչում՝ հավասար պայ-
մաններում։ Կերակրման ընթացքում սահմանվում և խիստ հըս-
կողությաւն, և յեթե նկատվում են հիվանդ, անհավասար, հետա-
մնաց վորդերով անվանքներ, վերջիններս շարքից դուրս են հան-
վում։ Բոժոժ հյուսելուց հետո՝ բոժոժները մաքրվում են վերևի
բամբակից, հիվանդները զտվում են, իսկ առողջները հաշվի յեն
առնվում ու կշռվում։

Յուրաքանչյուր անվանքի բոժոժները բաժանվում են 3
կարգի, այն և՛ I ու II կարգի և խոտան։

Այդ հաշվառումից հետո յուրաքանչյուր անվանքի համար
սահմանվում են հետևյալ հատկանիշները՝

1) վորդերի կենսունակության տոկոսը հետևյալ ֆորմու-
լայով.

$$\frac{K \times 100}{Z} \quad K \text{ առողջ բոժոժների թիվը.} \\ Z \text{ կերակրման հատկացված վորդերի քանակը.}$$

2) խոտանի տոկոսը.

3) բոժոժի միջին քաշը $\frac{V}{K} = K -$ առողջ բոժոժների քաշը
 $K -$ բոժոժների քաշակը:


Բոլոր ընտրություններից հետո 100 անվաճքից (ընտանիքից) առանձնացնում ենք 30 բարձր ցուցանիշներով ընտանիք, վորոնց հետ առավում է հաջորդ առավա սելեկցիան: Յուրաքանչյուր ընտանիքից առանձնացվում է ընդամենը 40 ընտիր բոժոժ (20 արու, 20 եգ) կամ 30 ընտանիքից՝ 600 արու և 600 եգ, վորոնք թիթեռների կենսունակության խտանումից և միկրոսկոպային քննությունից հետո, հաջորդ առավա գորնանը կտան վաջ պակաս 600 անվաճք, վորի վրա կրկնվում է նկարագրված ձևով հաջորդ առավա սելեկցիան:

Թիթեռների դուզավորումը կատարվում է այնպես, վոր մեկ ընտանիքի արուները դուզավորված լինեն մյուս ընտանիքի եգերի հետ:

Մնացած 70 անվաճքից ստացված բոժոժները յնթարկվում են տեսակավորման, անջատվում են լավերը և հասկացվում են ուսիրողակցիոն գրենայի պատրաստմանը, վորից կստացվի 40—50 առվի վորակյալ գրենա:

Բնադրուկցիոն գրենան խիտ ձևով քննելուց և վերամշակելուց հետո հաջորդ առումը բաշխում են հմուտ շերամագահների, վորի բոժոժներից պատրաստում են ցնդացու գրենան՝ 1000 առվի սահմաններում:

Այսպիսով գրենայի արտադրությունը գրենա-գործարաններում կատարվում է հետևյալ սխեմայով:



ձեռք է՝ վերստի դիմացկուն են զանազան պատահարների կամ հիվանդությունների դեմ:

Թե վերջապես կարևոր նշանակություն ունեն հիբրիդները Յապոնիայում, յերևում է հետևյալ աղյուսակից:

Գրենայի բաղնալո՞ւ Յապոնիայում ըստ տարիների, տոկոսներով (համեմատման և տվյալները վերաբերում են արտադրական գրենային):

Տարի	Գրենան կերակրումներ		Ամսան-աշնան կերակրումներ		Բոլոր սեզոններում	
	Հիբրիդներ	Այլ թերեր	Հիբրիդներ	Այլ թերեր	Հիբրիդներ	Այլ թերեր
1934	98,6	1,4	72,3	27,7	83,5	16,5
1925	99,1	0,9	78,9	21,8	85,4	14,6
1926	99,4	0,6	79,6	20,4	87,3	12,7
1927	99,8	0,2	85,0	15,0	90,6	9,4
1928	99,6	0,4	90,3	9,7	93,7	6,3

Այս աղյուսակից յերևում է, զոր Յապոնիայում այլ ցեղերը հետադեմ կորցնում են իրենց արտադրական նշանակությունը, իսկ հիբրիդների անսակարգոր կլին արագորեն աճում է:

17. ՀԻԲՐԻԴՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Դեպիտո կողմեր. — 1. Արթնացած գրենայի տոկոսն աճելի բարձր է հիբրիդների մեջ, քան մաքուր ցեղերի.

2. կերակրման տեղում յուրանն աճելի կարճ է.

3. վարդերի քաղի անցողություն տակոսն աճելի բարձր է.

4. վարդիկներ հիբրիդների դիմադրությունը զանազան հիվանդությունների հանդեպ աճելի բարձր է, ուստի վարդերի կոքոսաը կերակրման պրոցեսում աճելի քիչ է լինում.

5. մալվափոխությունը, բոժոժ հյուսելը, թիթեաների դուրս գալը, գրենայի արթնացումը կատարվում է միաժամանակ, մասնաշաղկապներին.

6. բերքառությունը մեկ միավոր կերից աճելի բարձր է.

7. խոտանի տակոսն աճելի ցածր է.

8. բոժոժները ձևով, մեծությամբ աճելի համասար են.

9. մետաքսի քանակը խաչաձևման համար վերցրած յերկու մաքուր ցեղերի մետաքսից բարձր է.

10. մետաքսի յեւույթը բարձր է. թելն ավելի փայլուն է և ամուր.

Քաղցառակամ կողմեր.—1. Առաջին սերնդի մեջ կուտակված լավ հատկութիւնները յերկրորդ սերնդում ճեղքվում են, այդ պատճառով յուրաքանչյուր տարի շրջանառութեան մեջ են մըտնում միմիայն տուալին սերնդի հիբրիդները.

2. գրենայի քանակի տեսակետից ավել ձկների խաչաձևման ժամանակ անհրաժեշտ է լինում վերցնել ավելի քիչ գրենա ավող ցեղի արուները: Այս դեպքում գուղաղորդած թիթեռներէից ստացվում է ավելի քիչ գրենա, քան կստացվեր ավելի շատ գրենա ավող մաքուր ցեղից.

3. բոժոժի զուլգների քանակը հիբրիդներում ավելի շատ է լինում.

4. մետաքսի կլառքանակը (տիար) ավելի բարձր է սովորականից:

Այսպիսով տեսնում ենք, վոր հիբրիդների գրական կողմերն ավելի շատ են, քան բացատկանը, մանավանդ, վոր վերջիններս հնարավոր է վերացնել: Պետք է շեշտել, վոր բացասական կողմերից մեկն էլ հանդիսանում է այն, վոր հիբրիդների գրենաժն ավելի բարձր է, պահանջում է հատուկ կահավորում, ինչպես և այլ հարմարութիւններ:

Վերջին տարիներս հիբրիդները մացված են նաև մեր շեքամաշտակութեան մեջ, մանավանդ ավելի խոնավ և լեռնային շրջաններում: Յեղել են փորձեր նույնպէս Հայաստանում, վորոնք ավել են գրական արդյունքներ, բայց վորովհետև Հայաստանը Գամարվում է շերամաշտակտն ցեղացու շրջան, այդ իսկ պատճառով հիբրիդները Հայաստանում գործնական նշանակութեան չունեն:

ԳԼՈՒԽ Գ-ԻԴ

ԳՐԵՆԱՍԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Շերամապահության ադրոստիկանները կոմպլեքսում հարևոր նշանակություն ունի գրենայի նորմալ պահպանումը: Մակայն բավական էն տրտադրության բոլոր պրոցեսներն ձեռք բերան ցելյուլյար գրենատի սկզբունքի պահպանումը, այն է՝ պատրաստել տաղչ, կենսոսակ գրենա: Շերամապահության գլխավոր խնդիրներից մեկն էլ այն է, Վոր մեկ միտվոր կերակրվող գրենայից ստացվի բարձր բերքատվությամբ, անտեսապես առավել վորակական հատկություններ ունեցող հում նյութ—բոթո: Այդ նպատակի համար վոչ միայն անհրաժեշտ է պատրաստել տաղչ, կենսոսակ գրենա, այլև նրա պահպանման համար ստեղծել նորմալ պայմաններ, վորպեսզի ապահովենք գրենայի և սպասվելիք վորդերի կենսոսակությունը: Գրենայի նորմալ պայմաններում պահպանելու անհրաժեշտությունը բղխում է հետևյալ հանգամանքներից.

ա) գրենան, ինչպես նաև բոլոր կենդանի որդանիդները շնչում են՝ ընդունելով ոդից թթվածին, Վորն անհրաժեշտ է ներանց շնչառության պրոցեսների համար և արտաշնչում են անթթած թթվ: Վորը գոյանում է որդանիդի մեջ որդանական նյութերի քայքայումից՝ թթվածնի աղդեցության հետևանքով:

բ) գրենայի մեջ տալերե ժամանակամիջոցներում և տալերե թափով կատարվում են բարդ ֆիզիոլոգիական պրոցեսներ. հետևաբար յուրաքանչյուր ֆիզիոլոգիական պրոցեսի նորմալ ընթացքի համար պահանջվում են տալերե պայմաններ.

գ) գրենայի աննորմալ պահպանումը, աստատվող պայմանները բացասական աղդեցություն են թողնում վարդերի կենսոսակության վրա: Վորդերը յենթարկվում են զանազան հիվանդությունների.

դ) անցյալում ջերամը վորպես վայրի կենդանի, ընտելացնելու հետևանքով, վորոշ չափով նրա գիմացկունությունը պա-

կատել են Բնության մեջ կատարվող ընտրության պրոցեսում
կենսաուսակությունն ունեն զույլ բոլոր որգանիզմները: Փոխարինե-
լով ընտելան ընտրությունն արհեստակառույ մեք նպատակն ե
յուրաքանչյուր ձվիկից ստանալ բոժոժ, իսկ դրա համար անհրա-
ժեշտ ե ստեղծել նորմալ պայմաններ գրենայի պահպանման հա-
մար:

Նկատի ունենալով գրենայի մեջ կատարվող ֆիզիոլոգիա-
կան պրոցեսները՝ կարող ենք գրենայի կյանքը բաժանել յերեք
շրջանի, այն ե՝

ա) աճաւն-աշնան շրջոն (եւաիվացիա), վորը տևում ե
ձաւն գնելու ըտպից ժինչն այն ժամանակ, յերբ գրենայի շըն-
չաւությունը հասնում ե մինիմումի:

բ) ձմաւն շրջան՝ սկսած աճաւն-աշնան շրջանի վերջից,
մինչն գրենայի դարնան շրջանը:

գ) դարնան շրջան, յերբ սկսվում ե վորդի ձեւավորումը ե
վերջանում ե մինչն վորդերի դուրս գալը: Այս շրջանում գրե-
նայի շնչառության պրոցեսներն ավելի բարդ են ընթանում:

Հստ առանձին շրջանների՝ գրենայի պահպանման գործում
մեք նպատակն ե գրենան պահպանել ընտրյան մոտ պայման-
ներում, աճաւն ավելի բարձր, իսկ ձմեւը՝ ցածր աստիճանում:

Գրենայի աճաւն-աշնան շրջանն սկսվում ե թիթեռները
ցեյուկների (քաղնների) մեջ գցելուց հետո:

Թիթեռները յերեք սրվա ընթացքում ածում են ամբողջ
ածվածքը (մեկ թիթեռից ստացված գրենան):

Թիթեռները ջսակ գցելը համարվում ե պապիլոնաժի վեր-
ջին պրոցեսը, վորից հետո ածվածքները պետք ե պահպանել նոր-
մալ պայմաններում: Այդ շրջանում կարեոր նշանակութուն
ունի թիթեռները կենսաուսակության տևողությունը: առողջ
թիթեռներն ապրում են 10—12 որ, հիվանդ թիթեռները մահա-
նում են առաջին իսկ որերը, բոժոժից դուրս գալուց հետո:

Առանձին անհատների կյանքի տևողությունը հասնում ե
մինչն 21—30 որ: Թիթեռները կյանքի տարեր տևողությունը
կախված ե այն բանից, թե նրանք լինչպիսի պայմաններում են
պահվում, բացի այդ՝ նաև առողջությունից, ցիզից ե ժաւանգա-
կաւությունից: Համենայն դեպս թիթեռի վաղաժամ մահը գրե-
նայի վորակական ցուցանիշի միավորն ե համարվում:

Վերսոնը գտնում ե, վոր Շլավ հնդաւոնն ամեն որ պեաք ե

առուգի ցեյրուհները և առանց խղճալու առանձնացնի ու վռնելաց-
նի այն անվաճճները, վերոնց թիթեռները մահաճում են 7—8
բրից առաջ: Ակվան խորհուրդ չի տալիս կիրառել այդ ձևի
ընտրությունը, մանավանդ արտադրական գրենայի նկատմամբ,
ուր մեծ աշխատանք և պահանջվում ընտրության համար և բա-
ցի այդ՝ թիթեռի վաղաժամ մահը կարող և տեղի ունենալ դա-
նազան պատճառներից. որինակ՝ վատ ողափոխությունից, խտու-
թյունից, պատահական վնասվածքներից և այլն:

Մեր կարծիքով Ակվայի տեսակետն ավելի ճիշտ և, այդ
պատճառով գրենաժի պրակտիկայում արտադրական գրենայի
նկատմամբ այդպիսի ընտրությունը հնարավոր չէ և չի կիրառ-
վում. նման ձևի ընտրությունը հնարավոր և անհրաժեշտ և սեղ-
բողակցիտն գրենայի նկատմամբ:

Մինչև միկրոսկոպային քննությունը, ցեյրուհների պահպա-
նումն այն և, վոր ցեյրուհները պահպանելու շնչքերը պետք և
լինեն չոր, արևից պաշտպանված, բավականին ընդարձակ և
ուռննան ողափոխության անցքեր:

Թե վերջան կարևոր նշանակություն ունի ողափոխու-
թյունը և վերջան արագ և ընթանում շնչառությունը գրենայի
առաջին շրջանում, ներքևում ցույց ենք տալիս պրոֆ. Պայաբկո-
վի ավյալները, (վերցված Ակվայից), վոր մեր կողմից լրացնում
ենք տվյալներով՝ 20,000-ի տույլ-գրենայի համար:

Ժամանակամիջոցը որե- րով մու գնելուց հետո	Ածխածխի զադի արտաշնչումը		Մահություն
	100 գր գրե- նայի համար	500 կգ գրե- նայի համար	
1. մի օրում	0,2382 գր	1191 կգ	
2. „ „	0,3108 „	1551,5 „	100 գր կենդանի
3. „ „	0,7862 „	1431,0 „	մարդու քաշից մեկ
4. „ „	0,1797 „	899,5 „	որում արտաշնչված
5. „ „	0,1456 „	728 „	ածխածխի զադի
6. „ „	0,1288 „	691 „	քաշը հավասար և
10. „ „	0,1101 „	550,5 „	1,2960 գրամի
14. „ „	0,1018 „	506,5 „	
16. „ „	0,0799 „	399,5 „	

Յեթն այդ քաղին ավելացնենք մոտ 1.200.000 թիթհակ
արտաշնչած անխաթթու գաղի քանակը, որպեսզի էլինի, թե վո-
քան կարևոր նշանակություն ունի որպիսիությունը ցելյուլոսե-
րի համար:

Յոնավ, խիտ պայմաններում պահված անվաճների մեջ
թիթհակները մահանալուց հետո նրանց մեջ առաջանում են մեծ
քանակությամբ փոխքում առաջացնող բակտերիաներ, վորոնք
միկրոսկոպի տակ նման են կոկերի և այլ հիվանդություններին
բացիլներին: Դրանով անխանիկորեն բարձրանում է անվաճների
խոտանի տոկոսը:

Որպիսիությունը ընթացքում անհրաժեշտ է խուսափել մի-
ջանցուկ փոխառ: Վերջինիս շնորհիվ շինքում առաջանում է փո-
շի, վոր ցելյուլոսերի մեջ կարող է մտնել պերրինայի մարմ-
նիկներ:

Որպիսիությունը անհրաժեշտ է նաև թիթհակների չորաց-
ման պրոցեսին արագացնելու համար, հակառակ դեպքում թիթհա-
կները փոխանակ չորանալու, խոնավ պայմաններում կարող են
քայքայվել:

Գործը և առաջնակարգ դեր է խաղում ջերմության առ-
տինանը գրեհայի ետիվացիայի շրջանում, այն է՝ բարձր ջեր-
մության ադուցություն տակ (50°-ից բարձր) գրեհայի մեջ չո-
րացած ձվերի տոկոսը բարձրանում է, իսկ յերկար տնտգություն-
նից յերեք ամսվա ընթացքում—ըստ Վերստեի—գրեհայի սաղմը
թառամում և կորցնում է զարգացման կենսունակությունը:

Համբարդի կարծիքով, յեթե գրեհայի մեջ նկատվում են սե-
կամ սե-գորչադույն ձվեր, այդ նշան է, վոր գրեհան ամառվա
ընթացքում յնթարկվել է բարձր ջերմության:

Դրեհան ամառնալան շրջանում պետք է պահպանել հե-
տևյալ պայմաններում: Անվաճների առաջին շրջանում ջեր-
մությունը պահպանել $+22 + 25^\circ$ և տարող ամառվա ընթաց-
քում թողնել նույն ջերմության մեջ կամ մինչև $+27^\circ$, իսկ
հետագային նոյն ջերմության շրջանում պետք է հասցնել
 $+12$ -ից մինչև $+15^\circ$ Ծ-ի, իսկ վառալուց հետո չպետք է $+12^\circ$
Ծ-ից բարձր լինի և մինչև ձմեռում չպետք է իջնի $+5^\circ$
կամ $+10^\circ$ Ծ-ից:

Յոնավության նորմալ չափն ետիվացիայի շրջանում ըն-
դունված է $50-60\%$:

Նպատակահարմար է գրեհ-գործարաններում ունենալ հո-

տուէլ շինքներ՝ ցեյուաւները պահելու համար, վորոնք պետք և աւանանաքված լինեն այլ շինքերից:

Ինչպէս գրենայի պահպանման ընդր շրջաններում, այնպէս ևլ ցեյուաւներէ նկատմամբ պետք և սահմանել խիստ հսկողություն, կատարել շինմության և խոնավության գրանցումները, մեռնաբերել անհրաժեշտ միջոցներ՝ նորմալ պայմաններում գրեշտն պահպանելու համար:

ԳՐԵՆԱՅԻ ՁՄԵՌՈՒՄԸ

Ինչպէս վերը էիշխերիք, գրենան պետք և պահպանել բնական պայմաններում. ուստի մտնովտ ընթացքում պետք և պահպանել ալիւլի ցածր շերտաստիճանում: Փորձերը ցույց են ալիւլ, վոր գրենայի պահպանման ուղղմալ շերտությունը միւսան ամիսներին հաճախ և +3° մինչև +5° Ց.: Յերկարատե մահուան ունի իր բացասական ազդեցությունը:

Կվյատի տվյալներէ համաձայն՝ յիթե գրենան պահվում և 0° շերտության մեջ, յոթ ամսովտ ընթացքում սաղմը վոշնշանում և 25—75%—ալ:

Վերջին հանգամանքը թելադրում և միւսան ամիսներում, վորը հաճախ և 90—100 սրի, սահմանել վորոշուկի սեժիմ: Հայաստանի պայմաններում գրենայի մահուամը կարելի յե սկսել գեղտեմբերէ կիսից կամ վերջերից: Ձմեռանոցներում գրենան պետք և պահպանել տուխիցի մեջ կամ բարակ շերտով՝ հատուկ դարակներում. այս մկով նորմալ ոգափոխությունն ապահով կլինի:

Կարևոր նշանակություն ունի նաև խոնավության աստիճանը. բարձր խոնավության ժամանակ գրենայի կեղևի ծակոտիները կարող են ծածկվել բարբոսով, վորը կլանգարի գրենայի շնչառությունը:

Վստ և աղքատ նաև չափազանց ցածր խոնավությունը. ցածր խոնավության դեպքում գրենան կորցնում և մեծ քանակությամբ ջրային մասսա. գրենան չորանում և, կամ ինչպէս ասում են հնգահանները, «գրենան այրված և»:

Վորպեսզի գրենայի մահուամը նորմալ լինի, անհրաժեշտ և այն պահել 55—75% խոնավության պայմաններում:


Չնայած վոր միւսան ամիսներին գրենայի շնչառությունն ալիւլի գանգաղ և կատարվում, քան նրա տաղին որերին կամ

ինկուբացիայի ընթացքում, այնուամենայնիվ այդ շրջանում նորմալ սպառնալիքները նույնպես կարելի է: Ձմեռանոցները, նայած դրենայի քանակին՝ պետք է ունենան համապատասխան ձավալ: Պրոֆ. Պայարկովի տվյալներով յուրաքանչյուր 200 տուփ դրենայի համար պետք է ունենալ մեկ խոր. մետր ող, հետևապես ձմեռանոցները կառուցելիս, նկատի պետք է ունենալ այդ հանդամանքը:

Ձմեռանոցները կառուցելիս կամ կահավորելիս պետք է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, վեր ջերմության և խոնավության օրոշակները ձմռան ամիսներին տեղի չունենան:

Գարնան սկզբներին (ինկուբացիայի մոտ շրջանում) ձմեռանոցի առախնանը հետզհետե պետք է շարժափնել վոչ ավել 8°—12°, վերից հետո դրենան տեղափոխել ինկուբատորիաները:

Գրենայի պահպանման վերջին շրջանի մոտին՝ գարնան ամիսներին, ավելի ճիշտ ինկուբացիայի շրջանում, մանրամասն խոսվեց Գրենայի ինկուբացիա գլխում:



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՂ

Նախաբան	3
-------------------	---

ԳԼՈՒԽ 1-ԻՆ

1. Շերամապահության նշանակութիւնը ժող. տնտեսության մեջ	7
2. Շերամապահության պատմութիւնը	9
3. Շերամի տեղը կենդանաբանության մեջ	17

ԳԼՈՒԽ 2-ԲԴ

Շերամի վորդի անատոմիան յեվ ֆիզիոլոգիան

1. Վորդի արտաքին տեսքը	21
2. Մաշկը	24
3. Սննդառության արդան	26
4. Մաշկիկյան անոթներ	27
5. Շնչառության աղարատը	28
6. Արյան շրջանառութիւն	31
7. Մետաքսի դեղձեր	33
8. Վորդի սեռական գործարանները	35
9. Հարպային մարմիններ	36
10. Մկաններ	36
11. Նյարդային սխառն	37
12. Հարմարակ	39
13. Թիթիս	42
14. Թիթիսի սեռական գործարանները	46
15. Թիթիսի կյանքն ու մահը	52

Գրեմա

1. Գրենայի կառուցվածքը	54
2. Արհեստական ձևով գրենան ժամանակից շուտ արթնաց- նելու միջոցները	58
3. Գրենայի շնչառությունը	61
4. Մազմի զարգացումը գարնանը	61

ԳԼՈՒԽ 4-ԻՂ

Գրեմայի ինկուբացիան

1. Գրենայի արթնացման ձևերն ու նշանակությունը	65
2. Ինկուբացիայի կազմակերպումը, գրենայի արթնացումը և զորդի բաշխման տեխնիկան	66

ԳԼՈՒԽ 5-ԻՂ

Շերամի կերակրումը

1. Շերամատաներ	79
2. Շերամատան կոհալմանը	81
3. Շերամատան մաքրելն ու արտահանումը	85
4. Ախտահանումը հեղուկ ֆորմալինի միջոցով	85
5. Ախտահանումը ծծմբազառով	86
6. Ախտահանումը քլորով	86
7. Պարտիաներ հալոտարեցնելը	87
8. Վորդերի համար անհրաժեշտ տաքանակությունը	88
9. Կերի նորման և սննդառությունը	89
10. Վորդի հառակները	90
11. Տերիի հալաքելն ու խնամքը	97
12. Վորդերի խնամքը մաշկափոխություն ժամանակ	99
13. Շերամատան խոնավություն չտալը և վերաբերված	100
14. Վորդերի ցախ բարձրանալը, ըստո՞՛հ հյուսելը, հալաքելն ու տեղափոխելը	100

ԳԼՈՒԽ 6-ԻՂ

Հիվանդություններ

1. Գերբեռն	104
2. Ֆլաշերի	111

3. Զախլոստ	115
4. Դեղնացավ	116
5. Մուսկարդինա	121

ԳԼՈՒԽ 7-ԲԴ

Բոժոժի վերամեակումը յեւ ճիւմսլոգիան

1. Բոժոժի խեղդելն ու շարացնելը	124
2. Բոժոժի և մետաքսի տեխնոլոգիան	130

ԳԼՈՒԽ 8-ԲԴ


Գրեցած

1. Դրենտօի նշանակութիւնը շերամադահության մէջ	137
2. Դրենտօի արտադրութիւնն մէջ տարբեր տեխնիկական պարագաների հետևողականութիւնը	139
3. Դրեն-գործարանի ցեղացու բաղալի կազմակերպումը	141
4. Յեղացու չկրամի կերակրումը	143
5. Բոժոժի ընդունումը	145
6. Բոժոժի պարտիաների վարակի գնահատումը	146
7. Բոժոժի տեսակավորումը	150
8. Պաշխլոնած	153
9. Անվածքի տեսակավորումը	163
10. Միկրոսկոպային քննութիւն	164
11. Միկրոսկոպային քննութիւն կոնտրոլը	168
12. Դրենայի վերամշակումը	170
13. Դրենայի ծրարումը (ուղակովկա)	172
14. Դրենայի պետական կոնտրոլը	173
15. Ռեպրոդուկցիոն և ցեղացու դրենայի պատրաստումը	174
16. Հիբրիդները	177
17. Հիբրիդների ընդհանուր բնութագիրը	178

ԳԼՈՒԽ 9-ԲԴ

Գրեցողի պատկանումը	180
Գրեցողի ձևաւումը	184





Եմբագիր՝ Ե. Գալստյան
Տեղ. խմբ.՝ Լ. Մալքոնյան
Քեզի խմբ.՝ Եղ. Ալլահվերդյան
Մշակույթի՝ Ա. Հասագործյան
Եվ և. Այվազյան

Փշովիտի լիպուր Մ—484, հրատ. № 374
Պատվեր № 606, տիրած 4000
Հանձնվել և տպագրուիթյան 29/IX 35թ.
Մատուցված և տպագրուիթ. 29/XI 35թ.

Փշուկհրատի տպարան, Յերեվան,
Նաղրանդյան 11.

Վերջում	Վերջերի	Ներթ- վից	Տպագրված է	Գեղարվեստ
3	6-րդ տող		գործի 4913 հազարը Մի- ջին Ասիայում, 4843 հա- զարն՝ Անգղիականում	գործի 4910 հազարը Մի- ջին Ասիայում, 4932 հա- զարն՝ Անգղիականում
18		2-րդ տող	1918 թիվը	1928 թիվը
19		1-ին 4-րդ սյուն.	108600	109000
		5-րդ սյուն.		10
22	2-րդ տող		վաղահաման հաշվերով	վաղի մոլորի հաշվերով
22	10-րդ տող		Ամեն հայտնի բները	համան հայտնի բները
28	9-րդ տող		աբա-գրոգ	արաբագրոգ
31		2-րդ տող	մարմնի խոռոչ	մարմնի մեջ
32		17-րդ տող	60—65-ի	60—65-ի
34		6-րդ տող	հիշատ	հիշատ
35		6-րդ տող	արվի	արուի
36	13-րդ տող	7-րդ տող	կոր մասով	կույր մասով
70	4-րդ տող		340 ծ	340 ծ
71		16-րդ տող	համաման	համաման
75		1-ին տող	գուրս յեկած է	գուրս յեկած է
77	18-րդ տող		նշման մեկ	նշման մեկ
111	9-րդ տող		մասնագրաբար անցումը միասնական զինացվում է	մասնագրաբար անցումը հետզհետե զինացվում է
133	16-րդ տող		2,32	0,32
135		10-րդ տող	800—850	800—1200
140	15-րդ տող		գործընկերում	առջագործներում
156		14-րդ տող	անկանոն թիթեաներ	անարմուլ թիթեաներ
157		14-րդ տող	յնքեք հազար թիթեա	յնքեք հազար ցառկ
158		11-12-րդ տող	ինչպես վերը հիշեցինք, բուր ցեղերի թիթեա- ները նշված ժամկետին չեն գուրս գալիս ամբողջ	ինչպես վերը հիշեցինք, բուր ցեղերի թիթեաները նշված ժամկետին գուրս գալիս, ցայս կան

Վերջին համար	Վերջին համար	Ներքին վերջ	Տպագրված է	Գեղարվեստ և Լեզու
			որովա ընթացքում, սա- կայն մեծ մասամբ դուրս են գալիս առավելագույն	չինական վարչական, վո- րոնց թիվերները դուրս են գալիս ամբողջ որովա ընթացքում, սակայն մեծ մասամբ դուրս են գալիս առավելագույն
160	Յ-րդ տարի		4-ից վեր ունի	7-ից վեր ունի
172		17-րդ տարի	յեղջյուղյա գաղաղակներ	յեղջյուղյա գաղաղակներ
179	Ծ-րդ տարի		Բվյալ ձևեր	Բվյալ թվեր
182	Աղյուս- տակում			1-ին որոշ, 2-րդ որոշ է այլն

ԳԱՍ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0008012

4176 3 П.

ЦЕНА

11
19083



РУКОВОДСТВО
ПО
ШЕЛКОВОДСТВУ И ГРЕНАЖУ

БЕЛХХОСГИЗ

ЗРНИЛЪ

1985