

619

ՊՏՈՒԿԱՅ Է 1991 Ք.

ԲՐՈՒՅԵԼՅՈՁ

8564

A $\frac{1}{2539}$

ИГНАЛЬНИЙ
СЕМЛЯР



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՈՅՈՐԴԱԿԱՆ ՊԱՆԾԱԿԱՆ ԲՈՒԹՅԱՆ ԲԻՍԵԼՅԱՆ

ՅԵՐԵՎԱՆ

1939

619:616.929.1 2564

F-99

F. 99. 99. 99. 99.

ԲՐՈՒՑԵԼՅՈՁ

Բրուցելյոզը պատկանում է ազդաբնակութ յանը գեոևս քիչ հայտնի հիվանդությունների թվին: Մինչև վերջին ժամանակներս այդ հիվանդությունը պատահուեր գլխավորապես Մալթա կղզում և Միջերկրական ծովի մոտ մի քանի վայրերում, այդ պատճառով եւ կոչվում եր մալթիական կամ Միջերկրական ծովի տենդ: Միայն վերջին 10—20 տարվա ընթացքում բրուցելյոզով հիվանդանալու դեպքերն սկսեցին անսպասելիորեն յերեվալ յերկրագնդի տարրեր տեղերում:

Բրուցելյոզը վարակիչ հիվանդություն է, վորով հիվանդանում են և մարդիկ և անասունները: Այդպիսի հիվանդություններին են պատկանում խլնախտը (сальмонелла), դարազը և սիրիբախտը: Բրուցելյոզով, ինչպես նաև հիշված հիվանդություններով, մարդիկ վարակվում են ընտանի կենդանիներից:

Բրուցելյոզն առաջանում է հատուկ միկրոբից, «բրուցելլա» կոչված մանրագույն

կենդանի եյակից, վարք նկատելի յի
միայն մանրագիտակի (պատկերը 1000 և
ավելի անգամ մեծացնող գործիք) տակ:
Մանրագիտակի տակ բրուցելլան յերեւում
և ինչպես փոքրիկ կարճ ցուպիկ: Մեծ քա-
նակությամբ բրուցելլաներ կարող են գտնը
վել բրուցելյոզով հիվանդ կենդանիների
մեղի մեջ, աղբի մեջ, նրանց մաշկի վրա,
նրանց կաթի մեջ:

ՎԱՐԱԿՈՒՄԸ

Մարդ բրուցելյոզով վարակվում և կեն-
դանիներից. այդ հիվանդությունը շատ
հազվադէպ դեպքերում և մարդուց մար-
դուն անցնում, բայց կենդանիների վարա-
կումը մարդուց հնարավոր և:

Բրուցելլաները մարդկանց մարմնի մեջ
են թափանցում բերանի, շրթունքների,
աչքերի և քթի լորձաթաղանթի միջոցով,
քերծվածքների, չանդովածքների յեվ նույն-
իսկ մաշկի մանրագույն ձեղքերի միջոցով:
Անասուններին խնամող մարդը վարակվում
է, յեթե բրուցելյոզով հիվանդ կենդանի-
նի հետ շփվելուց հետո, առանց ձեռները
լվանալու ծխում և, ձեռք տալիս շրթունք-
ներին, աչքերին, քթին:

Անասնաբուժական աշխատողները վարակվում են բրուցելյոզային կենդանիների ծնելուց հետո ընկերքը ձեռքով անջատելու ժամանակ:

Վարակվում են նաև բրուցելյոզով հիվանդ կենդանիների, մանավանդ ալժերի ու լոշխարների հում կաթը, յուղը և բրինձան իրրելով ուտելիք դործածելիս:

Հատկապես շատ բրուցելյոզային միկրոբներ են արտադրում կենդանիները վիժման ժամանակ, քանի Վոր հսկայական քանակությամբ բրուցելլաներ են պարունակվում դցած պտղի, թաղանթի, ընկերքի և մերձպտղային ջրերի մեջ:

Քանի Վոր բրուցելյոզով հիվանդ կենդանիների վիժումները տեղի յեն սունենում սովորաբար դառնանք, մարդկանց վարակվելու մեծ մասը կատարվում և դառնանք և ամռան սկզբին:

ԻՆՋՊԵՍ Ե ԸՆԹԱՆՈՒՄ ԲՐՈՒՑԵ- ԼՅՈԶԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏ

Բրուցելյոզն ամենից առաջ ընտանի կենդանիների հիվանդություն է: Նա ախտահարում և լոշխարներին, ալժերին, խոշոր յեղջուրավոր անասուններին, խոզե-

րին: Բրուցելյոզով կարող են հիվանդանալով նաև ձիերը, ուղտերը, շներն ու ընտանի թռչունները: Բայց վոչ բոլոր բրուցելյոզային կենդանիները միանման վտանգավոր են մարդու համար: Մարդիկ ամենից ավելի հեշտությամբ վարակվում են վոչխարներից ու այծերից, քան խոշոր յեղջուրավոր անասուններից կամ խոզերից:

Բրուցելյոզը խոշոր վնաս է հասցնում սոցիալիստական անասնապահությանը, վորովհետև կենդանիների վիժումներ և առաջացնում: Բացի դրանից, բրուցելյոզային կենդանիների կաթնատվությունը պակասում է և վոչ կենսունակ սերունդ է ծնվում: Սակայն բրուցելյոզը կենդանիների մոտ հաճախ միանգամայն դադանի յե ընթանում է նրան կարելի չե ճանաչել միայն հատուկ անասնաբուժական հետազոտությունների օգնությամբ:

Բրուցելյոզը կենդանիների մոտ, ըստ յերևիսւթին, անբուժելի չե և հիվանդ կենդանիներն իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում վարակ են տարածում իրենց շուրջը:

ԲՐՈՒՑԵԼՅՈԶԸ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄՈՏ

Բրուցելյոզը մարդկանց մոտ միշտ միա-

տեսակի յերեւման դալիս: Ամենից հաճախ,
վարակվելուց 1—2 շաբաթ անց մարդ ըս-
կըսում և տենդել: Հիվանդը թուլանում և,
ստիպված և լինում պառկել: Նա տաքու-
թյուն և տալիս, քրտնում և, գլխացավեր
ու ընդհանուր թուլություն և ունենում:
Հաճախ ուռչում են հոդերը: Ուրիշ դեպքե-
րում հիվանդները գանգատվում են տան-
ջալից ցավերից մարմնի վորեւ մասում—
գոտկատեղում, ուսին, վոտին կամ ձեռքին:
Տղամարդկանց մոտ յերբեմն ամորձիների
լորրոքում և լինում:

Մի քանի դեպքերում հիվանդությունն
արտաքինով գրեթե չի յերեւում, վարակ-
ված մարդն իրեն առողջ և համարում:

Հաճախ բրուցելյոզով հիվանդանալը մա-
լարիայի, ունիմատիզմի կամ ուրիշ հիվան-
դությունների տեղ են ընդռնում:

Բրուցելյոզը վորոշել հնարավոր և միայն
հետազոտությունների ոգնությամբ, վո-
րոնք կատարվում են հատուկ լաբորատո-
րիաներում:

Բրուցելյոզը մարդկանց մոտ տեւում և
սովորաբար 2—3 ամիս, բայց կարող և
ձգձգվել եւ ավելի յերկար: Շատ անգամ ա-
ռողջանալուց հետո վորոշ ժամանակ անց,
բրուցելյոզը հիշեցնել և տալիս իրեն մեկ

Թեթեւ ջալերով մարմնի վորեւ մասում,
մեկ հադերից վորեւ մեկի ուռուցքով ու
հիվանդոտությամբ:

Մահացության դեպքերը բրուցելյոյից
հազվադէպու են, բայց աշխատունակության
ալելի կամ պակաս յերկարատեւ իջեցում
կամ կորուստ՝ բաւականին հաճախ են կատ
վում:

ԲՐՈՏՑԵԼՅՈՋԻՑ ՆԱԽԱՊԱՀՊԱ- ՆԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Բրուցելյոյի դեմ հիմնական պայքարը
տանում են անասնարուժական կաղմակեր-
պությունները, առանձնացնելով ու մեկու-
սացնելով հիվանդ անասուններին: Բացի
դրանից, ԽՍՀՄ ում գոյություն ունի
մի որենք, վորն արգելում է բրուցելյո-
յով հիվանդ անասուն ունեցող տնտեսու-
թյուններում գործածել հում կաթ, արտա-
հանել այն և նրանից հում մթերքներ՝
բրինձա, յուղ և այլն պատրաստել: Բրու-
ցելյոյզային կենդանիների կաթը կես ժամի
չափ պետք է տաքացնել 70 աստիճանում
(պաստերիզացիա), իսկ այնտեղ, վորտեղ դրա
համար հատուկ գործիքներ չկան, պետք է
յեռացնել, նրա մեջ գտնված միկրոբներին

վոչնչացնելու համար: Բրուցելյոզային կեն-
դանինների միսը կարելի չէ դործածել կե-
րակրի մեջ, միայն լավ յեփելուց հետո:
Միսը բաժանելուց հետո հարկավոր է ուշա-
դիր կերպով լվանալ ձեռները:

Բրուցելյոզով հիվանդ անասունն ունեցող
տնտեսություններում նախազգուշական մի-
ջոցների վերաբերյալ որենքի խիստ պահ-
պանումը չափազանց կարեւոր է: Դրա հա-
մար անհրաժեշտ է, վորպեսզի ինքը՝ ազ-
գարնակությունն ոգնի հողային ու անաս-
նարուժական մարմիններին պահպանելու
առողջ տնտեսությունները, բրուցելյոզի
վարակը նրանցում մուտք դործելուց: Յե-
թե, որինակ, անասունները վիժում են,
հարկավոր է այդ մասին հայտնել շրջանա-
յին հողբաժնին հետազոտություն կատա-
րելու համար: Վիժումից հետո հարկավոր է
կենդանուն անմիջապես առանձնացնել,
ախտահանել վիժման տեղը և այնուհետև
վարվել ըստ անասնաբուժերի ցուցումների:

Ազգաբնակությունն ոգնության պետք
է գնա նաև բրուցելյոզի դեմ պայքար տա-
նող բժշկական հիմնարկներին: Յեթե մարդ-
կանց մոտ հիվանդացումներ են յերեվացել,
վորոնք նման են բրուցելյոզին, ապա հար-

կալթր և այդ մասին հայտնել շրջանային առաջինին կամ բժշկական տեղամասին:

Բրուցելյոզով հիվանդ, կամ այդ հիվանդությունը տարած մարդը վտանգավոր չե իր ընտանիքի և շրջապատողների համար, լեթե նա հետևվում և մաքրությանը: Ամենից առաջ անհրաժեշտ և մաքուր պահել արտաքնոցը, վորովհետև բրուցելյոզով հիվանդների կղանքը և մեղը վարակիչ են:

Հարկավոր և ժամանակ առ ժամանակ արտաքնոցներին քլորակիր կամ չհանդած կիր, ծայրահեղ դեպքում հող լցնել: Արտաքնոցից դալով, հիվանդը պետք և ուշադիր կերպով լվանա ձեռքերը սապոնով ու խոզանակով:

Նախադրուշական խիստ միջոցներ պահպանել պարտավոր և բրուցելյոզով հիվանդ անատուններին, մանավանդ այժերին ու վոչխարներին խնամող աշխատակիցը:

Վորպեսզի թե ինքը չվարակվի և թե շրջապատողներին չվարակի, անհրաժեշտ և անասուններին խնամելու ամբողջ աշխատանքը կատարել հատուկ հագուստով: Հատուկ հագուստը պետք և թողնել աշխատանքի տեղում և նրանով տուն չգնալ: Չի կարելի առանց ձեռնոցների ձեռք տալ կենդանիներին, գոմաղբին և շրջապատող

առաքեալներին: Կթողները յուրաքանչիւր
կենդանւն կթելուց հետո պետք է լվանան
ձեռքերը:

Անհրաժեշտ է անասնաբաւոյն ունենալ
լվացարան, սապոն, սրբիչ, ինչպես նաև
անոթ ախտահանիչ (վարակաղերժող) լու-
ծույթով ըստ անասնաբուժական անձնա-
կազմի ցուցումի:

Անասնաբաւից հեռանալուց առաջ հար-
կավոր է դոմադրից ու ցեխից մաքրել կո-
շիկները, թրջել այն ախտահանիչ լուծույ-
թով կամ կուպր քսել և ձեռքերը լվանալ
ջրով, սապոնով ու խոզանակով:

Զի կարելի թույլ տալ, վոր կողմնակի
մարդիկ, մանավանդ յերեխաներ մօտենն
հիվանդ կենդանիների համար յեղած շեն-
քը: Հարկավոր է նաև կենդանիներին
բնակելի շենքեր տանել:

Խնամողների համար վտանգավոր է
հանդստանալ ու քնել հիվանդ կենդանինե-
րի շենքում, կարելի չէ վարակվել: Հատուկ
զգուշություն պետք է պահպանել ձագ
ծնելու և հորթ բերելու ժամանակ:

Վիժման դեպքում, ձեռքերով չկաշելով
պաղին, պետք է դնել այն ամուր (մետա-
ղե) արկղի մեջ և ուղարկել անասնաբուժա-

(33)

434

կան լաբորատորիա, կամ այրել, կամ թե
խոփել թաղել գետնի մեջ, իսկ այնտեղ, վոր-
տեղ կատարվել և լիժուժը, ախտահանել

A $\frac{1}{2539}$



Պատվամքագիր՝ բժ. Ս. ՄԿՐՏՅԱՆ

Գլավիտի լիազոր Ե 2222
Պատվեր № 490 Տիրած—3000

Հայկական ԽՍՀ ԺԿԽ-ի Հրատա
«Խ. Հ»-ի Տղարան, Յերևան

ԳԱԱ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0037257